

แฉ 3 สายพันธุ์ บรรพบุรุษนกเงือก ใกล้สูญพันธุ์

"ชนหิน-ปากดำ-หัวหงอก" 3 สายพันธุ์ ใน 13 สายพันธุ์บรรพบุรุษนกเงือกในประเทศไทย ใกล้สูญพันธุ์ เหตุปาลดลงจากการขยายพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน....

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.53 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แลงข่าว "นกเงือกจะสูญพันธุ์หรือไม่ งานวิจัยพันธุ์กรรมนกเงือก จะมีส่วนช่วยอนุรักษ์นกเงือกได้อย่างไร" โดยมี ศ.ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าคณะวิจัยโครงการศึกษา พันธุ์กรรมนกเงือก ร่วมแฉลง

คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า นกเงือกเป็นสัตว์ ที่มีบทบาทโดดเด่นเป็นอย่างมากในระบบนิเวศป่า เนื่องจากเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไม้ และ ทำให้เกิดความหลากหลายในระบบนิเวศป่า ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้ให้การสนับสนุนสนับสนุนงานวิจัย ของ ศ.ดร.พิไล กว่า 15 ล้านบาท โดยนำเทคโนโลยีการศึกษาวิจัยทรัพยากรชีวภาพทั้งในด้าน พันธุ์กรรม นิเวศวิทยา การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาบูรณาการในการศึกษานกเงือกในถิ่นอาศัยหลักที่มีสภาพเป็นผืนป่า และหย่อมป่าทั่วประเทศ จนสามารถสร้างความเข้าใจของสถานภาพและอนาคตของนกเงือกในประเทศไทย ตั้งแต่ระดับพันธุกรรม ประชากร จนกระทั่งถึงระดับระบบนิเวศ

ด้าน ศ.ดร.พิไล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของการศึกษาวิจัยลักษณะทางพันธุกรรมของนกเงือก ทำให้พบว่า ใน 13 สายพันธุ์ในประเทศไทย พบว่า มีนกเงือก 3 ชนิด ถือว่าเป็นนกเงือกที่มีสายพันธุ์เก่าแก่ และเป็นบรรพบุรุษของนกเงือกในปัจจุบัน ได้แก่ นกเงือกคอแดง นกชนหิน และนกเงือกหัวหงอก เหลืออยู่จำนวนไม่มากและใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากพื้นที่ป่าที่ลดลงจากการขยายพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน โดย นกเงือกคอแดง มีมากที่ป่าตะวันตก ส่วนนกเงือกชนหินและหัวหงอก มีมากในป่าภาคใต้ แต่ที่สำคัญ ยังมีนกเงือกอีก 1 ชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ คือ นกเงือกปากย่น ที่มีถิ่นอาศัยที่ป่าบาลาฮาฮา ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการศึกษาจะนำไปเป็นข้อมูลสำคัญที่จะใช้แนวทางในการอนุรักษ์ต่อไป

ศ.ดร.พิไล กล่าวต่อไปว่า แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีประชากรนกเงือกถึง 7 ชนิด คือ นกกก นกเงือกกรามช้าง นกเงือกคอแดง นกเงือกสีน้ำตาล นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว นกเงือกหัวแรด และนกเงือกแก็ก ยังคงมีสถานภาพที่มั่นคง โดยพบประชากรมากกว่า 1,000 ตัวในเขตพื้นที่สำรวจ 3 พื้นที่ ได้แก่ ผืนป่าตะวันตก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าห่วงคือการผสมข้ามสายพันธุ์ ระหว่างนกเงือกหัวแรด กับ นกเงือกกก ซึ่งจะทำให้ได้ลูกนกพันธุ์ผสม ไม่แข็งแรงและจะประชากรนกเงือกลดลงประกอบกับป่าอุทยานแห่งชาติบูโด -สุไหงปาดี มีพื้นที่เล็กลง

ศ.ดร.พิไล กล่าวด้วยว่า ขณะที่สถานการณ์การล่านกเงือก ปัจจุบันถือว่าเบาบางลง แต่ยังมีหลายพื้นที่น่าห่วง เช่น ที่เขาใหญ่ ด้าน จ.ปราจีนบุรี เป็นต้น.

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ โดย ทีมข่าวการศึกษา 22 มกราคม 2553, 16:00 น.

<http://www.thairath.co.th/content/edu/60457>