

10 ม.ค. 2551



รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการนิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์ขิง

ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน

โดย สมพร ขวัญหืด และคณะ

ธันวาคม 2550



รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการนิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์ขิง

ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน

โดย สมพร ขวัญหืด และคณะ

ธันวาคม 2550

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการนิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์จิง

ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน

คณะผู้วิจัย

1. นายสมพร ขวัญหืด เจ้าหน้าที่อุทยาน
2. นายณภัทร กิตติพินังกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สนับสนุนโดย

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพใน
ประเทศไทย (โครงการBRT)

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์จิงในเขตอุทยานแห่งชาติเขานันได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) และอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ธันวาคม 2550 ถึง ธันวาคม 2550 ณ อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะผู้จัดทำรายงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำข้อมูลไปใช้ในการศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในนิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์จิงในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน

คณะผู้จัดทำ

ธันวาคม 2550

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขานัน, คุณอนันต์ เจริญสุข, คุณมานพ แก้วชัด, และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขานัน สำหรับความอุปการคุณ และการช่วยเหลืออย่างยิ่ง โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดย PTT Public Company Limited, the TRF/BIOTEC Special Program for Biodiversity Research and Training grant BRT S_550007, และหน่วยวิจัยระบบซับซ้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์ขิงในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน

ECOLOGY AND DISTRIBUTION OF ZINGIBERACEAE AT KHAO NAN NATIONAL PARK

บทคัดย่อ: การศึกษานิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์ขิงในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2550 ได้ทำการบันทึกข้อมูลทางนิเวศวิทยา เช่น ความหนาแน่น และการกระจายตัวของพืชวงศ์ขิงจำนวน 126 ตัวอย่าง และได้ทำการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมซ้ำในอีก 6 เดือนต่อมา พบว่า ตัวอย่างประมาณหนึ่งในสามเจริญอยู่ในพื้นที่ที่มีร่มเงาประมาณ หกสิบเปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อีกเพียง สี่ชนิดเท่านั้นที่เจริญอยู่ได้ในที่มีแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งวัน พืชวงศ์ขิงทั้งหมดที่ได้ทำการศึกษามีการเพิ่มจำนวนต้นภายในกอ หรือภายในคงเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงย่างเข้าสู่ฤดูฝน ในเดือนมิถุนายน ความหนาแน่นของลำต้นพบว่ายู่ระหว่าง 1 ถึง 46 ต้นต่อตารางเมตรและพื้นที่ทั้งหมดอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 100 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับลักษณะของพืชแต่ละชนิด ขิงเขาหลวง เป็นชนิดที่พบมากที่สุดในหน่วยพิทักษ์คลองกัน และทั้งพื้นที่การศึกษา พืชวงศ์ขิงที่สามารถกินได้เช่น คาหลาปากนกแก้วและขมิ้น ไม่สามารถพบเห็นดอกได้บ่อยนักเนื่องจากชาวบ้านได้เข้าไปตัดดอกอ่อนของคาหลาปากนกแก้วหรือขูดเหง้าของขมิ้นมารับประทานก่อนที่พบดอกบาน ดังนั้นแผนงานการอนุรักษ์พืชวงศ์ขิงในเขตอุทยานแห่งชาติเขานันจึงยังค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัด

Abstract: Ecology, habitat and distribution of Zingiberaceae has been conducted in seven park ranger stations of Khao Nan National Park during January to June 2007. One hundred and twenty six Zingiberaceae individuals were recorded on their ecological data, i.e. abundance and distribution 6 months later. One third of gingers grew in the area that had 60% or more canopy cover. On the other hand, there were four species growing in full sunlight. All gingers increased in the number of leafy shoots in June due to an increasing in the amount of rainfalls. Ginger densities ranged from 1 to 46 leafy shoots/m². We found the areas that covered with gingers ranging from 0.1 and 100 m² depending on habit types. *Zingiber newmanii* I. Theilade & J. Mood had the highest density found at Klong Kan station. Favorite edible gingers, i.e. *Etlingera fulgens* (Ridl.) C. K. Lim, and *Curcuma longa* L. were difficult to find their inflorescences because the villagers collected the inflorescences or rhizome before we found them. The natural resources conservation plan at Khao Nan National Park still has problem that implementers cannot explain the critical point of the number of ginger species to

conserve

them.

1. บทสรุปโครงการ

การศึกษานิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน เป็นการศึกษาสำรวจในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่สำคัญ 5 เส้นทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 111 กิโลเมตร มีการนำข้อมูลทางด้านอนุกรมวิธาน การกระจายพันธุ์ ลักษณะวิสัย และนิเวศวิทยา เพื่อเป็นการประเมินความหนาแน่น และการกระจายตัวภายในเขตพื้นที่อุทยานฯ ช่วงเวลาการออกดอก ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการศึกษาต่อไป รวมทั้งมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรในรอบปี ว่าพืชวงศ์ขิงแต่ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ผลงานวิจัยทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างชนิดในเชิงพื้นที่ ข้อมูลทั้งหมดจะนำมาใช้ในการจัดการทรัพยากรที่มีความหลากหลายในพื้นที่ให้คงไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป

การศึกษานิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์ขิงในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2550 ได้ทำการบันทึกข้อมูลทางนิเวศวิทยา เช่น ความหนาแน่น และการกระจายตัวของพืชวงศ์ขิงจำนวน 126 ตัวอย่าง และได้ทำการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมซ้ำในอีก 6 เดือนต่อมา พบว่า ตัวอย่างประมาณหนึ่งในสามเจริญอยู่ในพื้นที่ที่มีร่มเงาประมาณ หกสิบเปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อีกเพียง สี่ชนิดเท่านั้นที่เจริญอยู่ได้ในที่มีแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งวัน พืชวงศ์ขิงทั้งหมดที่ได้ทำการศึกษามีการเพิ่มจำนวนต้นภายในกอ หรือภายในดงเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงย่างเข้าสู่ฤดูฝน ในเดือนมิถุนายน ความหนาแน่นของลำต้นพบว่ายู่ระหว่าง 1 ถึง 46 ต้นต่อตารางเมตรและพื้นที่ทั้งหมดอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 100 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับลักษณะของพืชแต่ละชนิด ขิงเขาหลวง เป็นชนิดที่พบมากที่สุดในหน่วยพิทักษ์คลองกัน และทั้งพื้นที่การศึกษา พืชวงศ์ขิงที่สามารถกินได้เช่น คาหลาปากนกแก้วและขมิ้น ไม่สามารถพบเห็นดอกได้บ่อยนักเนื่องจากชาวบ้านได้เข้าไปตัดดอกอ่อนของคาหลาปากนกแก้วหรือขูดเหง้าของขมิ้นมารับประทานก่อนที่จะพบดอกบาน ดังนั้นแผนงานการอนุรักษ์พืชวงศ์ขิงในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน จึงยังค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัด

Executive Summary

Zingiberaceae at Khao Nan National Park will be studied on Taxonomy, Distribution, Habitat and Ecology. We estimated flowering time. We studied in 5 main natural trails with a total of 111 kilometers. In addition, we can study the changes in population density and distribution in each population every year. Hopefully, data arising from this work can be used for natural resource management and conservation at Khao Nan National Park and communities around the national park.

Ecology, habitat and distribution of Zingiberaceae has been conducted in seven park ranger stations of Khao Nan National Park during January to June 2007. One hundred and twenty six Zingiberaceae individuals were recorded on their ecological data, i.e. abundance and distribution 6 months later. One third of gingers grew in the area that had 60% or more canopy cover. On the other hand, there were four species growing in full sunlight. All gingers increased in the number of leafy shoots in June due to an increasing in the amount of rainfalls. Ginger densities ranged from 1 to 46 leafy shoots/ m². We found the areas that covered with gingers ranging from 0.1 and 100 m² depending on habit types. *Zingiber newmanii* I. Theilade & J. Mood had the highest density found at Klong Kan station. Favorite edible gingers, i.e. *Etlingera fulgens* (Ridl.) C. K. Lim, and *Curcuma longa* L. were difficult to find their inflorescences because the villagers collected the inflorescences or rhizome before we found them. The natural resources conservation plan at Khao Nan National Park still has problem that implementers cannot explain the critical point of the number of ginger species to conserve them.

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์	1
วิธีการดำเนินงาน	2
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผลการศึกษา	3
ปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนวทางการแก้ไข	15
ภาคผนวก	
ภาคผนวก (ก) ตารางข้อมูล	17
ภาคผนวก (ข) บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน	31
ภาคผนวก (ค) สรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์	32
บทคัดย่อ 12 th BRT Annual Conference. Udonthanee, Thailand. 15 th -18 th October p. 58.	35
บทคัดย่อ 33 rd Congress on Science and Technology of Thailand. Nakhonsithammarat, Thailand. 18 th -20 th October, B6_B0040 p.123.	36
สรุป OUTPUTS ที่ได้รับจากการดำเนินงาน	39

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1

Ecology and Distribution of Zingiberaceae นิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์ขิงเขานัน

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะตัวอย่างพืชวงศ์ขิง	1
ภาพที่ 2-16 การออกดอกของพืชวงศ์ขิงที่พบ ณ อุทยานแห่งชาติเขานัน	4
ภาพที่ 17 กราฟแสดงจำนวนชนิดพืชวงศ์ขิงที่พบในแต่ละประเภท	13
ภาพที่ 18 กราฟแสดงจำนวนตัวอย่างพืชวงศ์ขิงที่พบตามปริมาณแสงที่พืชวงศ์ขิงอาศัยอยู่	13
ภาพ 19 กราฟแสดงจำนวนชนิดพืชวงศ์ขิงที่พบในแต่ละเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	14
ภาพ 20 กราฟแสดงปริมาณตัวอย่างพืชวงศ์ขิงในแต่ละเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	14
ภาพที่ 21 หน้าเว็บเพจรายชื่อ โครงการวิจัย	32
ภาพที่ 22 หน้าเว็บเพจรายงานสรุปผลการวิจัย	32
ภาพที่ 23 หน้าเว็บเพจบริการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ (www.nbids.org)	33
Figure24. Seven study sites for wild gingers at Khao Nan National Park	37
Figure25. Wild ginger flowers and inflorescences at Khao Nan National Park.	38
(a) <i>Alpinia zerumbet</i> , (b) <i>Curcuma rubescens</i> ,	
(c) <i>Etlingera fulgens</i> and (d) <i>Zingiber</i> sp.	

หลักการและเหตุผล

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชพรรณภายในอุทยานแห่งชาติต่างๆ จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับความหลากหลาย(Diversity) ของ พืชเป็นวงศ์ หรือสกุล ด้านอนุกรมวิธาน และการจัดจำแนก (Taxonomy and Identification) เป็นส่วนมาก ซึ่งมีเอกสารรายงานวิจัยออกมาหลายชิ้นในแต่ละปี การศึกษาด้านนิเวศวิทยาและการกระจายตัว จะปรากฏอ้างอิงในเอกสารรายงานต่างๆ อยู่แล้วเมื่อทำการศึกษาทบทวนในสกุลต่างๆ ของพืชวงศ์นี้ (อ้างอิง 1,2,4,5) ทำให้เห็นภาพรวมของการกระจายตัวในระดับประเทศ หรือระดับทวีป (อ้างอิง 3) ซึ่งเป็นมุมมองที่กว้างมากเกินไป ไม่ชัดเจนทั้งทางด้านจำนวน และระยะเวลาการออกดอก จึงไม่สามารถนำมาทำนายการกระจายตัวในระดับท้องถิ่นได้

ในการศึกษาเอกสารเบื้องต้น พบว่ายังไม่มีการศึกษาด้านนิเวศวิทยาและการกระจายตัวในพื้นที่อุทยานอย่างจริงจังมากนัก (อ้างอิง 6) การระบุการกระจายตัว จึงเป็นรูปแบบของพื้นที่ระดับกว้าง เช่น จังหวัด หรือชื่ออุทยานเท่านั้น การศึกษานิเวศวิทยาและการกระจายตัวนี้ จึงเป็นการศึกษาอย่างละเอียดที่สามารถบ่งบอกดัชนีความหนาแน่น นิเวศวิทยาการกระจายตัว และจำนวนที่พบได้ดี และการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประชากรแต่ละชนิด ในปีต่อๆ มา เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบและเป็นข้อมูลในการจัดการทรัพยากรชีวภาพของอุทยานแห่งชาติเขานันต่อไป มากกว่าการรายงานทางอนุกรมวิธานเพียงด้านเดียว



ภาพที่ 1 แสดงลักษณะตัวอย่างพืชวงศ์
จิง

วัตถุประสงค์ของโครงการ (project objectives)

1. เพื่อศึกษาความหลากหลาย ทางด้านจำนวนชนิด และการกระจายตัวของพืชวงศ์จิง ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
2. เพื่อเป็นข้อมูล สำหรับนักท่องเที่ยว ในการศึกษาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

3. เพื่อติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประชากรแต่ละชนิด ในรอบปี และปีต่อไป
4. เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล NBIDS-BRT ที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อจัดทำแนวทางการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยชุมชนในท้องถิ่น

วิธีการดำเนินงาน


1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความหลากหลายของพืชวงศ์จิง ในประเทศไทย
2. ดำรวจพืชวงศ์จิงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขานันทั้งหมด บริเวณโดยรอบที่ทำการอุทยาน และหน่วยพิทักษ์ ข้างละ 5-15 เมตร และแนวน้ำตก-ลำธาร ขึ้นไปจนถึงแหล่งต้นน้ำ (Larsen *et al.*, 1999) ตามแนวเส้นทางเดินป่า 5 เส้นทาง คือ
 - a. เส้นทางที่ 1 จากหน่วยพิทักษ์ป่าคลองกลายไปสิ้นสุดที่สันเขื่อน 34 กิโลเมตร
 - b. เส้นทางที่ 2 จากหน่วยพิทักษ์ป่าคลองท่าหน ไปยอดพันสี และไปที่ห้วยแก้ว (ชน 2) 32 กิโลเมตร
 - c. เส้นทางที่ 3 เริ่มจากที่ทำการอุทยานฯ ไปยังเส้นบัวแดงใหญ่ และไปสิ้นสุดที่จุดชมวิว 13 กิโลเมตร
 - d. เส้นทางที่ 4 จากหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยเลข ไปป่าประ 12 กิโลเมตร
 - e. เส้นทางที่ 5 จากคลองท่าหน ไปสิ้นสุดยัง น้ำตกยอดน้ำ (ชน7) 20 กิโลเมตร
3. ศึกษาจำนวนประชากรอย่างละเอียด เพื่อประเมินความหนาแน่นในรอบปี
4. บันทึกข้อมูลทางนิเวศวิทยา ด้านต่างๆ ลงในแบบบันทึก
5. จัดทำข้อมูลพื้นฐานทั้งในรูปเอกสารบันทึกข้อมูลภาคสนาม NBIDS-BRT ไปสเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Internet (NBIDS-BRT)


ผลการศึกษาและวิจารณ์ผลการศึกษา


จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขานัน พบว่าเส้นทางที่สามารถทำการวิจัยได้ก่อน คือ เส้นทางที่ 1 และ 3 คือ หน่วยพิทักษ์คลองกลาย – สันเขื่อน และอุทยานแห่งชาติเขานัน – บัวแดง (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ ยังได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมจากที่วางแผนงานวิจัยไว้คือ หน่วยพิทักษ์คลองกัน เนื่องจากมีรายงานการพบดอกของพืชวงศ์จิงเบานอยู่ และมีเจ้าหน้าที่พร้อมทำการวิจัยอยู่ประจำหน่วยพิทักษ์อยู่แล้ว จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นจากการสำรวจ บริเวณเส้นทางที่ได้กล่าวข้างต้น สามารถบันทึกข้อมูลของพืชวงศ์จิงได้ทั้งหมด 126 หมายเลข ทำการบันทึกข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัย ความหนาแน่น ความเข้มของแสง พร้อมทั้งถ่ายรูปปลูก ด้วยกล้องดิจิทัล ตามตารางที่ 1


การวิจัย เรื่อง นิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์จิงในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน ในช่วงเดือน มกราคม 2550 ถึง เดือน ธันวาคม 2550 ได้ทำการศึกษาในเส้นทาง 5 เส้นทาง ได้ศึกษาพืชวงศ์จิง 16 ชนิด บันทึกสภาพดิน ภาพถ่ายดอกและต้น ข้อมูลทางนิเวศวิทยา รวมทั้งสิ้น 126 ตัวอย่าง พบว่าพืชวงศ์จิงออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน แสดงผลช่วงเวลาการออกดอกของพืชวงศ์จิงได้ดังกราฟ (ภาพที่ 2-16)

การออกดอกของพืชวงศ์ชิงที่พบ ณ อุทยานแห่งชาติเขานัน









ภาพที่ 6

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Boesenbergia

basispicata K. Larsen

ex Sirirugsa

ชื่อสามัญ: กระชายเขา


หลวง


วันแรกที่พบดอก: 3 Jul


2007


วันสุดท้ายที่พบดอก: 3


Jul 2007

















 Number of Flowering Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov	ภาพที่12 ชื่อวิทยาศาสตร์: <i>Globba pendula</i> Roxb. ชื่อสามัญ: หงส์เหิน วันแรกที่พบดอก: 22 Mar 2007 วันสุดท้ายที่พบดอก: 3 Jul 2007
 Number of Flowering Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov	ภาพที่13 ชื่อวิทยาศาสตร์: <i>Kaempferia pulchra</i> Ridl. ชื่อสามัญ: เปราะป่า วันแรกที่พบดอก: 3 May 2007 วันสุดท้ายที่พบดอก: 13 May 2007

 <table border="1"><thead><tr><th>Date</th><th>Number of Flowering</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jan</td><td>0</td></tr><tr><td>Mar</td><td>2</td></tr><tr><td>May</td><td>9</td></tr><tr><td>Jul</td><td>8</td></tr><tr><td>Sep</td><td>7</td></tr><tr><td>Nov</td><td>3</td></tr></tbody></table>	Date	Number of Flowering	Jan	0	Mar	2	May	9	Jul	8	Sep	7	Nov	3	ภาพที่ 14 ชื่อวิทยาศาสตร์: <i>Zingiber newmanii</i> I. Theilade & J. Mood ชื่อสามัญ: จิงเขาหลวง วันแรกที่พบดอก: 14 Mar 2007 วันสุดท้ายที่พบดอก: 18 May 2007
Date	Number of Flowering														
Jan	0														
Mar	2														
May	9														
Jul	8														
Sep	7														
Nov	3														
 <table border="1"><thead><tr><th>Date</th><th>Number of Flowering</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jan</td><td>0</td></tr><tr><td>Mar</td><td>1</td></tr><tr><td>May</td><td>0</td></tr><tr><td>Jul</td><td>0</td></tr><tr><td>Sep</td><td>0</td></tr><tr><td>Nov</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Date	Number of Flowering	Jan	0	Mar	1	May	0	Jul	0	Sep	0	Nov	0	ภาพที่ 15 ชื่อวิทยาศาสตร์: <i>Zingiber</i> sp.1 ชื่อสามัญ: กระเทียมป่า วันแรกที่พบดอก: 14 Mar 2007 วันสุดท้ายที่พบดอก: 14 May 2007
Date	Number of Flowering														
Jan	0														
Mar	1														
May	0														
Jul	0														
Sep	0														
Nov	0														




จากการสำรวจ พืชวงศ์จิงที่พบมีจำนวนทั้งหมด 16 ชนิด โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท เป็นกอ กลุ่ม 6 ชนิด เป็นคง 6 ชนิด เป็นต้นเดี่ยว 4 (ภาพที่ 17)




ภาพที่ 17 กราฟแสดงจำนวนชนิดพืชวงศ์จิงที่พบในแต่ละประเภท

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจำนวนชนิดของกล้วยไม้ที่พบตามปริมาณแสง พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว กล้วยไม้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณแสงประมาณ 40% และ 60% (ภาพที่ 18)




ภาพที่ 18 กราฟแสดงจำนวนตัวอย่างพืชวงศ์จิงที่พบตามปริมาณแสงที่พืชวงศ์จิงอาศัยอยู่

เมื่อพิจารณาถึงจำนวนชนิดและปริมาณของพืชวงศ์จิงที่พบ ในแต่ละเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (ภาพที่ 19 และภาพที่ 20) พบว่า เส้นทางคลองกัน มีการพบจำนวนชนิดพืชวงศ์จิงน้อยที่สุด 11 ชนิด แต่พบพืชวงศ์จิงในเส้นทางดังกล่าวมากที่สุดโดยรวมทั้งหมดจำนวน 95 ตัวอย่าง



ภาพ 19 กราฟแสดงจำนวนชนิดพืชวงศ์จิงที่พบในแต่ละเส้นทางศึกษาธรรมชาติ



ภาพ 20 กราฟแสดงปริมาณตัวอย่างพืชวงศ์จิงในแต่ละเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนวทางการแก้ไข

1. การสำรวจในช่วงเดือนธันวาคม 2549 ถึงเดือนเมษายน 2550 นั้น จะพบปัญหาเรื่อง พืชวงศ์ขิงไม่มีดอก จึงยากแก่การจำแนกชนิดได้
2. เส้นทางบางเส้น เช่น สันเขื่อน มีระยะทางที่ยาวมากเกินไป ลำบากแก่การเก็บรวบรวมตัวอย่าง และข้อมูล
3. สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ลำบากในการวางแผนเก็บข้อมูล และทำให้คาดการณ์ช่วงระยะเวลาการออกดอกได้ยากขึ้น
4. การจัดจำแนกพืชวงศ์ขิงด้วยใบและลักษณะลำต้นนั้น สามารถทำได้ในบางชนิด (2-3 ชนิด) เท่านั้น สามารถช่วยให้การศึกษาสะดวกขึ้น แต่ไม่มากนัก ในการศึกษาครั้งนี้จึงยังไม่สามารถสรุปลักษณะนิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์ขิงที่แท้จริงในแต่ละชนิดได้ เนื่องจากมีหลายชนิดที่ไม่พบดอกในขณะทำการสำรวจ บางชนิด ยากต่อการเข้าถึง เมื่อเข้าไปแล้วก็ไม่พบดอกจึงไม่สามารถเก็บตัวอย่างลงมาได้ และยังพบเป็นจำนวนน้อยอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

1. Larsen, K. 1996. A preliminary checklist of the Zingiberaceae of Thailand. Thai For. Bull. (Bot.) 24: 35-49.
2. Larsen, K. 2003. The Zingiberaceae in Flora of Thailand. In: Proceedings of the 3rd Symposium on the family Zingiberaceae. 7-12 July 2002. The Hotel Sofitel, Khon Kaen, Thailand.
3. Larsen, K. 2006. Zingiberaceae of Thailand. Queen Sirikit Botanic Garden, Chaing Mai, Thailand.
4. Sirirugsa, P. 2001. Zingiberaceae of Thailand. BRT Research Reports 2001. 63-77.
5. Sirirugsa, P. and C. Maknoi. 2003. Zingiberaceae in Southern Thailand. In: Proceedings of the 3rd Symposium on the family Zingiberaceae. 7-12 July 2002. The Hotel Sofitel, Khon Kaen, Thailand. 6-15.

6. Kittipanangkul, N. 2006. Zingiberaceae Diversity in Khao Luang and Khao Nan National Parks. Walailak University. Thailand.

ลงนาม..... มัลลิกา เจริญสุธาสินี

(ผศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี)

ผู้รับทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ภาคผนวก

(ก) ตารางข้อมูล

ตัวอย่างข้อมูลนิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์จิงเขานับบางส่วนแสดงดังตารางที่ 1 ข้อมูลทั้งหมดแนบมาด้วยไฟล์ Zingiberaceae data.xls

ตารางที่ 1 Ecology and Distribution of Zingiberaceae นิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์จิงเขานับ

N o.	Plant ID	Study Site	Date	Silene	Common Name	Scientific Name	1 ค น ก	1 ค อ ก	habitat detail	collector	2 ประเภท	จำนวนต้น คอก	พื้นที่ กอ	จำนวน ต้นตรง เมตร	พื้นที่ ทั้งหมด	จำนวนต้น คอพื้นที่ 25 ตาราง เมตร	perlight	photoNo
1	1	0	20070 314	คลองกัน1	จิงเขา หลง	Zingiber newmanii I. Thellade & J. Mood	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิ	1	6	0.9			40%	Zingiber newmanii.jpg,
2	2	0	20070 314	คลองกัน1	จิงเขา หลง	Zingiber newmanii I. Thellade & J. Mood	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิ	1	5	2.5			50%	Zingiber newmanii.jpg,
3	3	0	20070 314	คลองกัน1	กระพือ ป่า	Zingiber sp.1	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิ	1	2	0.1			60%	Zingiber sp.jpg,
4	4	0	20070 314	คลองกัน1	กระวาน	Anomum hastilabium Ridl.	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิ	1	1	0.1			50%	Anomum hastilabium.jpg,
5	5	0	20070 314	คลองกัน1	จิงเขา หลง	Zingiber newmanii I. Thellade & J. Mood	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิ	1	5	1.6			60%	Zingiber newmanii.jpg,
6	6	0	20070 314	คลองกัน1	คาหลา ปากนแก	Elingera fulgens (Ridl.) C. K. Lim	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิ	1	3	0.9			30%	Elingera fulgens.jpg,

7	7	0	20070	314	คลองกัน1	กระวาน	Amomum hastilabium Ridl.	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	46	1			60%	noimage.jpg.
8	8	0	20070	314	คลองกัน1	คาหลา ปานนก แก้ว	Elingera fulgens (Ridl.) C. K. Lim	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	5	0.9			40%	Elingera fulgens.jpg.
9	9	0	20070	314	คลองกัน1	ชิงเขา หลวง	Zingiber newmanii l. Theilade & J. Mood	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	5	1.6			30%	Zingiber newmanii.jpg.
10	10	0	20070	314	คลองกัน1	วันสาว หลง	Amomum biflorum Jack	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2			22	10	50%	noimage.jpg.
11	11	0	20070	314	คลองกัน1	กระวาน	Amomum hastilabium Ridl.	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	22	6.4			30%	Amomum hastilabium.jpg
12	12	0	20070	314	คลองกัน1	กระวาน	Amomum hastilabium Ridl.	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	15	2.5			40%	Amomum hastilabium.jpg
13	13	0	20070	314	คลองกัน1	กระวาน	Amomum hastilabium Ridl.	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	3	1.6			50%	Amomum hastilabium.jpg
14	14	0	20070	314	คลองกัน1	ปูดใบสาบ	Elingera subterranea (Holt.) R. M. Smith	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2			4	100	20%	noimage.jpg.
15	15	2	20070	321	คลอง กลาย-สัน เย็น1	กระพือ	Zingiber zerumbet (L.) Smith	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	8	4			60%	Zingiber zerumbet.jpg.
16	16	2	20070	321	คลอง กลาย-สัน เย็น2	กระพือ	Zingiber zerumbet (L.) Smith	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	9	3			40%	Zingiber zerumbet.jpg.

1	7	17	2	20070 321	คลอง กลาย-สัน เขิน3	กระเทียม	Zingiber zerumbet (L.) Smith	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหัด	1	7	6			60%	noimage.jpg,
1	8	18	2	20070 322	คลอง กลาย-สัน เขิน4	กระเทียม ป่า	Zingiber sp.1	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหัด	1	4	0.9			60%	Zingiber sp..jpg,
1	9	19	2	20070 322	คลอง กลาย-สัน เขิน5	หงส์เหิน	Globba pendula Roxb.	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหัด	3				11	40%	Globba pendula.jpg,
2	0	20	2	20070 322	คลอง กลาย-สัน เขิน6	หงส์เหิน	Globba pendula Roxb.	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหัด	3				2	40%	noimage.jpg,
2	1	21	2	20070 322	คลอง กลาย-สัน เขิน7	หงส์เหิน	Globba pendula Roxb.	1	0	0	ต้นไม้	นายสมพร ขวัญหัด	3				4	60%	noimage.jpg,
2	2	22	2	20070 323	น้ำตกขุน ทา(jsp)	ปูด่างคก	Elingera littoralis (Konig) Giseke	1	0	0	พื้นดิน	จารุพงษ์ แสงบุญมี/ เมธวี กนกวงศ์/อมร พันธุ์ ฉิมอัม	2			5	25	60%	Elingera littoralis.jpg,
2	3	23	2	20070 323	น้ำตกขุน ทา(jsp)	เร่ว	Amomum uliginosum Konig Retz.	1	0	0	พื้นดิน	จารุพงษ์ แสงบุญมี/ เมธวี กนกวงศ์/อมร พันธุ์ ฉิมอัม	2			7	30	60%	Amomum Uliginosum.jpg
2	4	24	2	20070 323	น้ำตกขุน ทา(jsp)	เร่ว	Amomum uliginosum Konig Retz.	1	0	0	พื้นดิน	จารุพงษ์ แสงบุญมี/ เมธวี กนกวงศ์/อมร พันธุ์ ฉิมอัม	2			6	20	40%	Amomum Uliginosum.jpg
2	5	25	2	20070 323	น้ำตกขุน ทา(jsp)	เร่ว	Amomum uliginosum Konig Retz.	1	0	0	พื้นดิน	จารุพงษ์ แสงบุญมี/ เมธวี กนกวงศ์/อมร พันธุ์ ฉิมอัม	2			8	25	60%	Amomum Uliginosum.jpg

2	26	2	20070	น้ำตกสูงเนิน	เร็ว	Anomum uliginosum Konig Retz.	1	0	0	พื้นดิน	จรุพงษ์ แสงบุญมี/ เมธวี กนกวงศ์อมร พันธุ์ ฉิมอัม	2				6	10	40%	Amomum Uliginosum.jpg
2	27	2	20070	น้ำตกสูงเนิน	ว่าน						จรุพงษ์ แสงบุญมี/ เมธวี กนกวงศ์อมร พันธุ์ ฉิมอัม								
7					จักรพรรดิ	Eletanopsis curtisii Bak.	1	0	0	พื้นดิน	2					25	10	60%	noimage.jpg,
2	28	2	20070	น้ำตกสูงเนิน		Elingera littoralis (Konig)					จรุพงษ์ แสงบุญมี/ เมธวี กนกวงศ์อมร พันธุ์ ฉิมอัม								Elingera littoralis.jpg,
8					ปลาด่างคก	Giseke	1	0	0	พื้นดิน	2					4	15	60%	
2	29	2	20070	น้ำตกสูงเนิน		Elingera littoralis (Konig)					จรุพงษ์ แสงบุญมี/ เมธวี กนกวงศ์อมร พันธุ์ ฉิมอัม							40%	Elingera littoralis.jpg,
9					ปลาด่างคก	Giseke	1	0	0	พื้นดิน	2					4	10		
3	30	2	20070	น้ำตกสูงเนิน		Elingera littoralis (Konig)					จรุพงษ์ แสงบุญมี/ เมธวี กนกวงศ์อมร พันธุ์ ฉิมอัม							40%	Elingera littoralis.jpg,
3	31	2	20070	น้ำตกสูงเนิน	ปลาด่างคก	Giseke	1	0	0	พื้นดิน	2					5	20		
3	32	0	20070	บัวแดง							จรุพงษ์ แสงบุญมี/ เมธวี กนกวงศ์อมร พันธุ์ ฉิมอัม							60%	Elingera littoralis.jpg,
3	33	0	20070	บัวแดง	กระวาน	Anomum hastilabium Ridl.	1	0	0	พื้นดิน	1	4	0.9					60%	Amomum hastilabium.jpg
3	34	0	20070	บัวแดง	กระวาน	Anomum hastilabium Ridl.					นายนพพร ขวัญหิ							60%	Amomum hastilabium.jpg
3	35	0	20070	บัวแดง	กระวาน	Anomum hastilabium Ridl.	1	0	0	พื้นดิน	2					3	100	60%	Elingera littoralis.jpg,
3	36	0	20070	บัวแดง	กระวาน	Anomum hastilabium Ridl.	1	0	0	พื้นดิน	2					6	150	50%	Amomum

5		408	ใหญ่6															hastilabium.jpg
3		20070	บัวแดง															Amomum
6	36	0	ใหญ่7	เร็ว	Anomum uliginosum Konig Retz.	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหีด	2			3	250		70%	Uliginosum.jpg
3		20070	บัวแดง															Amomum
7	37	0	ใหญ่8	เร็ว	Anomum uliginosum Konig Retz.	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหีด	2			5	200		80%	Uliginosum.jpg
3		20070	บัวแดง															Amomum
8	38	0	ใหญ่9	เร็ว	Anomum uliginosum Konig Retz.	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหีด	2			8	250		60%	Uliginosum.jpg
3		20070	บัวแดง															Amomum
9	39	0	ใหญ่10	เร็ว	Anomum uliginosum Konig Retz.	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหีด	2			5	250		60%	Uliginosum.jpg
4		20070	บัวแดง															Amomum
0	40	0	ใหญ่11	กระวาน	Anomum hastilabium Ridl.	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหีด	1		3	1			60%	hastilabium.jpg
4		20070	บัวแดง															Amomum
1	41	0	ใหญ่2	กระวาน	Anomum hastilabium Ridl.	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหีด	1		3	1			70%	hastilabium.jpg
4		20070	บัวแดง															Amomum
2	42	0	ใหญ่3	กระวาน	Anomum hastilabium Ridl.	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหีด	1		4	0.4			80%	hastilabium.jpg
4		20070	คลอง															Amomum
3	43	0	กลาย-สั้น เข็น2	กระเทียม	Zingiber zerumbet (L.) Smith	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหีด	1		8	0.5			40%	Zingiber zerumbet.jpg

4	4	44	2	20070	จน2ห้วย แก้ว1	จ่าปัติ	Alpinia zerumbet (Pers.) Burr & R. M. Smith	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	25	2				80%	noimage.jpg,
4	4	45	2	20070	จน2ห้วย แก้ว1	จ่าปัติ	Alpinia zerumbet (Pers.) Burr & R. M. Smith	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	25	2				80%	noimage.jpg,
4	4	46	2	20070	จน2ห้วย แก้ว1	จ่าปัติ	Alpinia zerumbet (Pers.) Burr & R. M. Smith	1	1	1	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	22	16				40%	noimage.jpg,
4	4	47	2	20070	จน2ห้วย แก้ว2	เปราะป่า	Kaempferia pulchra Ridl.	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	3					7	20%	noimage.jpg,
4	8	48	2	20070	จน2ห้วย แก้ว3	เปราะป่า	Kaempferia pulchra Ridl.	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	3					7	40%	noimage.jpg,
4	9	49	2	20070	จน2ห้วย แก้ว4	จิงเขา หลวง	Zingiber newmanii I. Theilade & J. Mood	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	4	1				30%	Zingiber newmanii.jpg,
5	0	50	2	20070	จน2ห้วย แก้ว5	เร่ว	Anomum uliginosum Konig Retz.	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2			23	30		40%	Amomum Uliginosum.jpg
5	1	51	2	20070	จน2ห้วย แก้ว6	ปุดคางคก	Elingera littoralis (Konig) Giseke	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2			14	10		60%	Elingera littoralis.jpg,
5	2	52	2	20070	จน2ห้วย แก้ว7	ปุดคางคก	Elingera littoralis (Konig) Giseke	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2			7	100		40%	Elingera littoralis.jpg,
5	3	53	2	20070	จน2ห้วย แก้ว7	ปุดซ้อน ทอง	Elingera pauciflora (Ridl.) R. M. Smith	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2				4	10	60%	Elingera pauciflora.jpg,
5	4	54	2	20070	จน2ห้วย แก้ว7	จิงเขา หลวง	Zingiber newmanii I. Theilade & J. Mood	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	6	1				40%	Zingiber newmanii.jpg,
5	5	55	2	20070	จน2ห้วย แก้ว7	ปุดคางคก	Elingera littoralis (Konig) Giseke	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2				7	40	60%	Elingera littoralis.jpg,
5	5	56	2	20070	จน2ห้วย	หงส์เหิน	Globba pendula Roxb.	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	3					3	70%	Globba

6	68	5	20070	ขน5หัว เลข2	วันสาว หลง	Anomum biflorum Jack	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2				4	8		50%	noimage.jpg
6	69	5	20070	ขน5หัว เลข2	เร่ว	Anomum uliginosum Konig Retz.	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2				8	10		60%	Amomum Uliginosum.jpg
7	70	5	20070	ขน5หัว เลข2	ปูดร้อน ทอง	Elingera pauciflora (Ridl.) R. M. Smith	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2				8	6		70%	Elingera pauciflora.jpg
7	71	5	20070	ขน5หัว เลข2	ปูดร้อน ทอง	Elingera pauciflora (Ridl.) R. M. Smith	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2				5	5		60%	Elingera pauciflora.jpg
7	72	5	20070	ขน5หัว เลข3	กระชาย แดง	Boesenbergia plicata (Ridl.) Holtt.	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	3						5	70%	Boesenbergia plicata.jpg
7	73	5	20070	ขน5หัว เลข3	เร่ว	Anomum uliginosum Konig Retz.	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2				11	25		70%	Amomum Uliginosum.jpg
7	74	5	20070	ขน5หัว เลข4	ปูดร้อน ทอง	Elingera pauciflora (Ridl.) R. M. Smith	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2				7	15		60%	Elingera pauciflora.jpg
7	75	5	20070	ขน5หัว เลข4	กระเทียม	Zingiber zerumbet (L.) Smith	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	1	5					70%	noimage.jpg
7	76	1	20070	กลาย-สั้น เย็น8	วันสาว หลง	Anomum biflorum Jack	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2				5	30		60%	noimage.jpg
7	77	1	20070	กลาย-สั้น เย็น8	วันสาว หลง	Anomum biflorum Jack	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2				7	20		40%	noimage.jpg
7	78	1	20070	กลาย-สั้น	กระชาย แดง	Boesenbergia plicata (Ridl.) Holtt.	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	3						1	60%	Boesenbergia plicata.jpg

8	8	88	3	20070	517	คลองกั้น2	ปุ๋ยคอก	Etilingera pauciflora (Ridl.) R. M. Smith	1	0	1	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	2	1				60%	Etilingera pauciflora.jpg
8	8	89	3	20070	517	คลองกั้น2	หวาน	Anomum biflorum Jack	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2			10	10		60%	noimage.jpg
9	0	90	3	20070	517	คลองกั้น2	จิงเขา	Zingiber newmanii I. Theilade & J. Mood	1	0	1	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	5	2				60%	Zingiber newmanii.jpg
9	1	91	3	20070	517	คลองกั้น2	คาหลา	Etilingera fulgens (Ridl.) C. K. Lim	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	3	1				30%	Etilingera fulgens.jpg
9	2	92	3	20070	518	คลองกั้น2	ข่าปลี	Alpinia zerumbet (Pers.) Burt & R. M. Smith	1	0	1	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	16	1				60%	noimage.jpg
9	3	93	3	20070	518	คลองกั้น2	คาหลา	Etilingera fulgens (Ridl.) C. K. Lim	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	5	1				40%	Etilingera fulgens.jpg
9	4	94	3	20070	518	คลองกั้น2	จิงเขา	Zingiber newmanii I. Theilade & J. Mood	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	1	5	1				30%	Zingiber newmanii.jpg
9	5	95	3	20070	518	คลองกั้น2	หวาน	Anomum biflorum Jack	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2			22	10		50%	noimage.jpg
9	6	96	3	20070	518	คลองกั้น2	กระวาน	Anomum hastilabium Ridl.	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2			15	10		40%	Anomum hastilabium.jpg
9	7	97	3	20070	518	คลองกั้น2	กระวาน	Anomum hastilabium Ridl.	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2			3	10		40%	Anomum hastilabium.jpg
9	8	98	3	20070	518	คลองกั้น2	ปุ๋ยคอก	Etilingera subterranea (Holt.) R. M. Smith	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2			4	1		20%	noimage.jpg
9	9	99	0	20070		บ้านแดง	กระวาน	Anomum hastilabium Ridl.	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิด	2			4	10		60%	Anomum

1	0	8	108	0	20070	519	บัวแดง	กระวาน	Amomum hastilabium Ridl.	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิ	1	4	0.5				80%	Amomum hastilabium.jpg
1	0	9	109	4	20070	703	ขน 4-ท่า ทน-ยอด พันธุ์1	เร่ว	Amomum uliginosum Konig Retz.	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิ	2			12	4		30%	Amomum uliginosum.jpg
1	1	0	110	4	20070	703	ขน 4-ท่า ทน-ยอด พันธุ์1	ปุดคางคก	Eltingera littoralis (Konig) Giseke	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิ	2			7	4		30%	Eltingera littoralis.jpg
1	1	1	111	4	20070	703	ขน 4-ท่า ทน-ยอด พันธุ์2	ว่านสาว หลง	Amomum biflorum Jack	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิ	2			15	4		50%	noimage.jpg
1	1	2	112	4	20070	703	ขน 4-ท่า ทน-ยอด พันธุ์2	ว่าน จักรพรรดิ	Elletariopsis curtisi Bak.	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิ	2			5	5		60%	noimage.jpg
1	1	3	113	4	20070	703	ขน 4-ท่า ทน-ยอด พันธุ์3	ว่าน จักรพรรดิ	Elletariopsis curtisi Bak.	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิ	2			6	10		60%	noimage.jpg
1	1	4	114	4	20070	703	ขน 4-ท่า ทน-ยอด พันธุ์3	ปุดใบลาย	Eltingera subterranea (Holt) R. M. Smith	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิ	2			4	3		30%	noimage.jpg
1	1	5	115	4	20070	703	ขน 4-ท่า ทน-ยอด พันธุ์4	หงส์เหิน	Globba pendula Roxb.	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิ	3					8	40%	Globba pendula.jpg
1	1	1	116	4	20070	703	ขน 4-ท่า ทน-ยอด	จิงเงา หลวง	Zingiber newmanii I. Thellade & J. Mood	1	0	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญหิ	1	9	2				50%	Zingiber newmanii.jpg

2		703	ทน-ยอด พันธุ์9	(Holt.) R. M. Smith															
5																			
1			บน 4-ท่า																
2		20070	ทน-ยอด	Etilingera littoralis (Konig)															Etilingera
6	126	4	พันธุ์10	Giseke	1	1	0	พื้นดิน	นายสมพร ขวัญเกิด	2					24	15	70%		littoralis.jpg.
				ปลูกต่างดก															

(ข) บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน

นิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์ขิง

พืชวงศ์ขิงมักจะพบตามริมน้ำ บางชนิดอาจไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งน้ำแต่อยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ข่าเข่งและหงส์เหินสีขาวดอกใหญ่ ซึ่งพบบนต้นไม้ ในเส้นทางศึกษาคลองกลาย-สันเขื่อน และยังพบพืชในวงศ์ขิงประเภทปูด่างคกในป่าเปิดใหม่หรือเรียกว่า “ป่าพาส” ส่วนพืชชนิดอื่นจะพบในป่าลึกเข้าไปซึ่งยังไม่ถูกสำรวจมากนัก


ก่อนหน้านี้ยังไม่มี การสำรวจวิจัยพืชวงศ์ขิงในอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราชมาก่อน จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้ศึกษานิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานันเป็นการนำข้อมูลทางด้านอนุกรมวิธาน การกระจายพันธุ์ ลักษณะวิสัย และนิเวศวิทยา เพื่อเป็นการประเมินความหนาแน่น และการกระจายตัวภายในเขตพื้นที่อุทยานฯ ช่วงเวลาการออกดอก ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการศึกษาต่อไป

ผลงานวิจัยทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างชนิดในเชิงพื้นที่ ในการสำรวจวิจัยเรื่องนี้ ต้องพบกับความยากลำบากในการเก็บตัวอย่างของแต่ละเส้นทาง เพราะต้องเข้าไปในป่าลึกมากๆ แต่ยังมีแรงบันดาลใจในการทำงานให้สำเร็จ เพราะจะได้พบสิ่งใหม่ๆ ของสภาพป่าที่พบพืชวงศ์นี้ และต้องขอขอบคุณคณะร่วมทำงานที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนทุนวิจัย จากโครงการBRT ปดท.และคณะอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี จากผศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินีและคณะทำงานทุกท่าน และต้องขอขอบคุณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขานัน นายอนันต์ เจริญสุขที่ได้เปิดโอกาสให้ทำงานครั้งนี้สำเร็จด้วยดี เพื่อนำผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดในการวางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการให้ความรู้ที่ถูกต้อง ข้อมูลทั้งหมดจะนำมาใช้ในการจัดการทรัพยากรที่มีความหลากหลายในพื้นที่ให้คงไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป



(ค) สรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลงานจากโครงการไปใช้ประโยชน์

การนำข้อมูลนิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์จิงเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (NBIDS-BRT) นักวิจัยสามารถค้นหาข้อมูล และแสดงผลการศึกษาผ่านเว็บได้ (www.nbids.org)



ภาพที่ 21 หน้าเว็บเพจรายชื่อ โครงการวิจัย



ภาพที่ 22 หน้าเว็บเพจรายงานสรุปผลการวิจัย

(a)

NBIDS :: National Biodiversity Database System - Windows Internet Explorer

http://www.nbids.org/tpg/MapGraph/SEARCH/Map.jsp?id=90&uid=1

บริการค้นหาข้อมูล

โครงการ นิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์ขิงในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน โดย สมพร ขวัญนิต

ชื่อโครงการ: นิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์ขิงในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน

ชื่อจุดศึกษา:

ชื่อสิ่งมีชีวิต (ทั่วไป): เว้นว่างหากไม่ต้องการระบุ

ชื่อวิทยาศาสตร์: เว้นว่างหากไม่ต้องการระบุ

ข้อมูลทั้งหมด 756 รายการ

(b)

TPP - Windows Internet Explorer

http://www.nbids.org/tpg/MapGraph/tpgResult.jsp?ProjectID=90

หน้า 1 จาก 37 หน้า

สิ่งมีชีวิตทั้งหมด 756 รายการ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 >

ลำดับที่	ชื่อจุดศึกษา	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อทั่วไป	วันที่เก็บข้อมูล (yyyymmdd)	ดูรายละเอียด
1	คลองก้น1	ZINGIBERACEAE	 <i>Amomum biflorum</i> Jack	วานลาวทอง	20070314	  
2	คลองก้น1	ZINGIBERACEAE	 <i>Amomum hastilabium</i> Ridl.	กระวาน	20070314	  
3	คลองก้น1	ZINGIBERACEAE	 <i>Amomum hastilabium</i> Ridl.	กระวาน	20070314	  
4	คลองก้น1	ZINGIBERACEAE	 กระวาน (<i>Amomum hastilabium</i> Ridl.)			  
5	คลองก้น1	ZINGIBERACEAE				  
6	คลองก้น1	ZINGIBERACEAE				  
7	คลองก้น1	ZINGIBERACEAE				  
8	คลองก้น1	ZINGIBERACEAE	 <i>Etlingera fulgens</i> (Ridl.) C. K. Lim	ตำลึงใบกลมแก้ว	20070314	  
9	คลองก้น1	ZINGIBERACEAE	 <i>Etlingera subterranea</i> (Holt.) R. M. Smith	ปลูกลาย	20070314	  
10	คลองก้น1	ZINGIBERACEAE	 <i>Zingiber newmanii</i> I. Theilade & J. Mood	ขิงเขาหลวง	20070314	  

http://www.nbids.org/tpg/MapGraph/tpgResult.jsp?ProjectID=90#thumb

(c)

NBIDS :: National Biodiversity Database System - Windows Internet Explorer
<http://www.nbids.org/apply/UpdateData/ShowInfo.jsp?nbid=24009&date=6311&projectId=90>

ข้อมูลจุดศึกษา	
จุดศึกษา	คลองกัน1
ละติจูด (N)	8.78847
ลองจิจูด (E)	99.74463
รหัส	24009
ข้อมูลสิ่งมีชีวิต	
วันที่เก็บข้อมูล (yyyymmdd)	20070314
ชื่อทั่วไป	วานสาวหลง
สปีชีส์	Amomum biflorum Jack
Habitat	ดิน, ดอก
Habitat Detail	พื้นดิน
จำนวนสำเนาต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร	22
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ (ตารางเมตร)	10
ชื่อผู้เก็บข้อมูล	นายสมพร ขวัญดี

← ×

start 2 Messenger 5 Internet Explorer 2 Microsoft Office ... Windows Explorer EN 100% 06:03

ภาพที่ 23 หน้าเว็บเพจบริการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์(www.nbids.org)

การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 11
15-18 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมนวลาลัย จ.อุดรธานี

**Ecology and distribution of Zingiberaceae at
Khao Nan National Park**

S. Kwanheed¹, N. Kittipanangkul^{2,*} and M. Charoensuthasinee²

1Khao Nan National Park, Nakhon Si Thammarat, 2Walailak University,

*Nakhon Si Thammarat, *e-mail: npk9301@gmail.com*

Research on the ecology, habitat and distribution of Zingiberaceae was conducted at seven park ranger stations in Khao Nan National Park during January to June 2007. Ecological data, i.e. abundance and distribution, were recorded every 3 months. Ninety-four individuals were found. One third of the gingers grew in an area that had 60% or more canopy cover. On the other hand, there were four species growing in full sunlight. All gingers increased in the number of leafy shoots in June due to an increase in the amount of rainfall. Ginger densities ranged from 1 to 46 leafy shoots/m². We found the areas covered with gingers ranged from 0.1 to 100 m² depending on their habit. *Zingiber newmanii* I. Theilade & J. Mood had the highest density and was found at Klong Kan station. Inflorescences of favorite edible gingers, i.e., *Etlingera fulgens* (Ridl.) C. K. Lim and *Curcuma longa* L., were difficult to find because villagers collected the inflorescences or rhizomes before we could find them. The natural resources conservation plan at Khao Nan National Park still has the problem that implementers do not know the critical number of ginger species in order to conserve them.

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33

วันที่ 18-20 ตุลาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

นิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์ขิงในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน

ECOLOGY AND DISTRIBUTION OF ZINGIBERACEAE AT KHAO NAN NATIONAL PARK

สมพร ขวัญเห็ด¹, ณภัทร กิตติพินังกุล², มัลลิกา เจริญสุธาสินี² และกฤษณะเดช เจริญสุธาสินี²

Somporn Kwanheed¹, Napat Kittipanangkul², Mullica Jaroensutasinee², and Krisanadej

Jaroensutasinee²

¹ Khao Nan National Park, M. 8, T. Talingchan, Thasala District, Nakhonsithammarat 80160

² School of Science, Walailak University, 222 Thaiburi, Thasala District, Nakhonsithammarat 80161. Email: npk9301@gmail.com, jmullica@gmail.com, krisanadej@gmail.com

บทคัดย่อ: การศึกษานิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์ขิงในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2550 ได้ทำการบันทึกข้อมูลทางนิเวศวิทยา เช่น ความหนาแน่น และการกระจายตัวของพืชวงศ์ขิงจำนวน 94 ตัวอย่าง และได้ทำการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมซ้ำในอีก 3 เดือนต่อมา พบว่า ตัวอย่างประมาณหนึ่งในสามเจริญอยู่ในพื้นที่ที่มีร่มเงาประมาณ หกสิบเปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อีกเพียง สี่ชนิดเท่านั้นที่เจริญอยู่ได้ในพื้นที่ที่มีแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งวัน พืชวงศ์ขิงทั้งหมดที่ได้ทำการศึกษา มีการเพิ่มจำนวนต้นภายในกอ หรือภายในคงเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงย่างเข้าสู่ฤดูฝนในเดือนมิถุนายน ความหนาแน่นของลำต้นพบว่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 46 ต้นต่อตารางเมตรและพื้นที่ทั้งหมดอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 100 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละชนิดพืช ขิงเขาหลวง เป็นชนิดที่พบมากที่สุด ในหน่วยพิทักษ์คลองกัน และทั้งพื้นที่การศึกษา พืชวงศ์ขิงที่สามารถกินได้เช่น คาหลาปากนกแก้วและขมิ้นไม่สามารถพบเห็นดอกได้บ่อยนักเนื่องจากชาวบ้านได้เข้าไปตัดดอกอ่อนของคาหลาปากนกแก้วหรือขูดเหง้าของขมิ้นมารับประทานก่อนที่พบดอกบาน ดังนั้นแผนงานการอนุรักษ์พืชวงศ์ขิงในเขตอุทยานแห่งชาติเขานันจึงยังค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัด

Abstract: Ecology, habitat and distribution of Zingiberaceae has been conducted in seven park ranger stations of Khao Nan National Park during January to June 2007. Ninety four Zingiberaceae individuals were recorded on their ecological data, i.e. abundance and distribution every 3 months. One third of gingers grew in the area that had 60% or more canopy cover. On the other hand, there were four species growing in full sunlight. All gingers increased

in the number of leafy shoots in June due to an increasing in the amount of rainfalls. Ginger densities ranged from 1 to 46 leafy shoots/m². We found the areas that covered with gingers ranging from 0.1 and 100 m² depending on habit types. *Zingiber newmanii* I. Theilade & J. Mood had the highest density found at Klong Kan station. Favorite edible gingers, i.e. *Etlingera fulgens* (Ridl.) C. K. Lim, and *Curcuma longa* L. were difficult to find their inflorescences because the villagers collected the inflorescences or rhizome before we found them. The natural resources conservation plan at Khao Nan National Park still has problem that implementers cannot explain the critical point of the number of ginger species to conserve them.

Introduction: Zingiberaceae is one of the significant components of the herbaceous ground flora of Thailand tropical forests [1]. They mostly grow in damp and humid shady places. They are also found from the lowlands to the highest elevations in secondary and primary forest respectively. Some species can fully expose to the sun. Many species are rare and highly vulnerable to endangerment. This study investigated the number, ecological data, distribution of wild ginger species, and their relative abundance at Khao Nan National Park. The results from this study can use for monitoring and make decision on the natural resources management and support the Biodiversity Convention.

Methodology: We surveyed the number of wild ginger species (Zingiberaceae), and abundance in seven nature trails as followings: Klong Klai, Hui Kaew, Klong Kan, Klong Tha Thon, Hui Lek, Klong Yod Num and Sunanta Waterfall. We classified wild orchids based on Ginger in Thailand [2]. We recorded % canopy cover and habit. We classified their habits into three categories: (1) single clamp, (2) dense and impenetrable clamp, and (3) small single colony. The number of leafy shoots was counted. For single clamp, we counted all leafy shoots in a single clamp. For dense and impenetrable clamp, we counted all leafy shoots/species found in 1 m². For small single colony, we counted all leafy shoots/species found in 25 m². Flowering and seeding time were observed in all gingers. We used Gamin GPS model 76 CSX to locate the coordinates of orchids on each nature trail. Our data on wild orchid species, abundance, and coordinates were entered on the NBIDS-BRT database.




Figure 24. Seven study sites for wild gingers at Khao Nan National Park

2007. We found 26 species wild Zingiberaceae with 3 unidentified species. One third of gingers grew in the area that had 60% or more canopy cover. On the other hand, there were four species growing in full sunlight. All gingers increased in the number of leafy shoots in June due to increasing in the amount of rainfalls. Ginger densities ranged from 1 to 46 leafy shoots/m². We found the areas that covered with gingers ranging from 0.1 and 100 m² depending on habit types.

Zingiber newmanii I. Theilade & J. Mood had a highest density found at Klong Kan station.

Favorite edible gingers, i.e. *Etlingera fulgens* (Ridl.) C. K. Lim, and *Curcuma longa* L. were difficult to find their inflorescences because the villagers collected the inflorescences or rhizome before we found them. The natural resources conservation plan at Khao Nan National Park still has problem that implementer cannot explain the critical point of the number of ginger species to conserve them.






Figure25. Wild ginger flowers and inflorescences at Khao Nan National Park. (a) *Alpinia zerumbet*, (b) *Curcuma rubescens*, (c) *Etlingera fulgens* and (d) *Zingiber* sp.

Acknowledgements: This work was supported in part by PTT Public Company Limited, TRF/Biotec special program for Biodiversity Research Training grant BRT T_550007, and CXKURUE, the Institute of Research and Development, Walailak University. We thank Khao Nan National Park staff for their helpful assistance.

References:

1. P. Sirirugsa and C. Maknoi. Proc. 3 Sym. 7-12 July 2002. The Hotel Sofitel, Khon Kaen, Thailand, 2003, 6-15.
2. K. Larsen and S. S. Larsen. Zingiberaceae of Thailand. Queen Sirikit Botanic Garden, Chaing Mai, Thailand, 2006.

Keywords: Zingiberaceae, Khao Nan National Park, Species diversity, Ecology and distribution
33rd Congress on Science and Technology of Thailand 3

สรุป OUTPUTS ที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ชื่อโครงการวิจัยนิเวศวิทยาและการกระจายตัวของพืชวงศ์ขิงในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน (รหัสโครงการ BRT S_550009)

ตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2550

1. การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ

1.1 ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว (published) จำนวน - เรื่อง ดังนี้

(ระบุชื่อผู้แต่ง (Authors), ชื่อเรื่อง (Title), ชื่อวารสารพร้อม volume และเลขหน้า)

1.2 อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ (in press) จำนวน - เรื่อง ดังนี้

(ระบุชื่อผู้แต่ง (Authors), ชื่อเรื่อง (Title), ชื่อวารสาร)

1.3 อยู่ระหว่างส่งต้นฉบับให้วารสารวิชาการ (submitted) จำนวน - เรื่อง ดังนี้

(ระบุชื่อผู้แต่ง (Authors), ชื่อเรื่อง (Title))

1.4 อยู่ในระหว่างการจัดทำต้นฉบับ (in manuscript) จำนวน - เรื่อง ดังนี้

(ระบุชื่อผู้แต่ง (Authors), ชื่อเรื่อง (Title))

2. การตีพิมพ์ผลงานในรูปแบบ Proceedings/คู่มือ/หนังสือ หรืออื่นๆ (โปรดระบุ) จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. Kwanheed, S., Kittipanangkul, N., & Jaroensutasinee, M. 2007. Ecology and distribution of Zingiberaceae at Khao Nan National Park. 12th BRT Annual Conference. Udonthanee, Thailand. 15th-18th October p.43.
2. Kwanheed, S., Kittipanangkul, N., & Jaroensutasinee, M. 2007. Ecology and distribution of Zingiberaceae at Khao Nan National Park. 33rd Congress on Science and Technology of Thailand. Nakhonsithammarat, Thailand. 18th-20th October, B6_B0038 p. 123.
3. การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน - เรื่อง ดังนี้
4. จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ในโครงการ จำนวน - คน ดังนี้
(ระบุชื่อนักศึกษา, ชื่อวิทยานิพนธ์, ระดับการศึกษา)

ลงนาม.....มัลลิกา เจริญสุธาสินี.....

(ผศ ดร มัลลิกา เจริญสุธาสินี)

ผู้รับทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2550

