

20 พ.ย. 2541

การศึกษาองค์ความรู้เชิงพฤกษศาสตร์ของชุมชนกะเหรี่ยง
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
A Study of Ethnobotanical Knowledge of the Karen
in Thung-Yai Naresuan Wildlife Sanctuary

เสนอต่อ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบาย
การจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย(BRT)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โดย



มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

พฤศจิกายน 2541

BRT 340001

การศึกษาองค์ความรู้เชิงพฤกษศาสตร์ของชุมชนกะเหรี่ยง
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
**A Study of Ethnobotanical Knowledge of the Karen
in Thung-Yai Naresuan Wildlife Sanctuary**

เสนอต่อ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบาย
การจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย(BRT)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

โดย



มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

พฤศจิกายน 2541

กิตติกรรมประกาศ

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอขอบคุณ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและเอื้ออำนวยให้เกิดการศึกษาแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม ที่อาจมีความเป็นไปได้ในอนาคตอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทย รวมทั้งขอขอบคุณ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) โดย ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ และคณะ ที่มีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงการนี้ตั้งแต่ตอนต้น และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนกะเหรี่ยงโดยเปิดโอกาสให้คนกะเหรี่ยงได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเรื่องพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน รวมทั้งเฝ้าติดตามให้กำลังใจต่อการดำเนินงานเสมอมา ขอขอบคุณ กองทุนสัตว์ป่าโลกประจำประเทศไทย World Wild Fund For Nature (WWF) ในฐานะผู้ร่วมพัฒนาระบวนการวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในเรื่อง Ethnoecology ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ และช่วยในการเผยแพร่ผลการวิจัยที่ได้ไปสู่เครือข่ายทางวิชาการรวมทั้งใช้เป็นแบบจำลองสำหรับโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับคนพื้นเมืองในภูมิภาคอื่นๆ

อย่างไรก็ดี โครงการมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า เหตุปัจจัยที่ทำให้โครงการเกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ก็เพราะคนกะเหรี่ยงในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรได้อนุรักษ์ป่าผืนนี้ไว้เป็นอย่างดี และแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการอนุรักษ์เสมอมา รวมทั้งเปิดโอกาสให้สังคมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจต่อวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ขอขอบคุณคนกะเหรี่ยงในป่าทุ่งใหญ่ฯ ทุกท่านที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เฒ่าหม่องเทอู้ ผู้เฒ่าหม่องเป และผู้เฒ่าหม่องยุแผ่ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการผู้ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ลุล่วงด้วยดีและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ

อลงกต ชูแก้ว

หัวหน้าโครงการวิจัย

พฤศจิกายน 2541

บทคัดย่อ

โครงการศึกษาองค์ความรู้เชิงพฤกษศาสตร์ของชุมชนกะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่สะท้อนถึงกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัยและคนในท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในเรื่องการกำหนดกรอบการศึกษา การกำหนดวิธีวิทยา การกำหนดระบบข้อมูลและการวิเคราะห์ รวมตลอดไปจนถึงการได้รับประโยชน์จากงานวิจัยร่วมกันระหว่างองค์ความรู้ใหม่ที่สนองตอบต่อโจทย์การวิจัยและกิจกรรมจากโครงการที่ช่วยให้เกิดการสืบค้น รวบรวม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ของคนกะเหรี่ยงเองในระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้ฐานคิดต่อความรู้ทางด้านระบบนิเวศวิทยาและองค์ความรู้ที่ว่าด้วยพฤกษศาสตร์ของคนกะเหรี่ยงเองที่สามารถจำแนกความแตกต่างของประเภทป่า หรือการจำแนกชนิดพันธุ์พืช และการระบุถึงการใช้ประโยชน์จากพืชทั้งโดยคนและโดยสัตว์ป่าก็ได้รับการให้ความสำคัญในเหตุผลสนับสนุนที่สามารถหาข้อสรุปจากการผลการศึกษาครั้งนี้ได้เช่นกันที่พบว่า พรรณพืชจำนวน 461 ชนิดพันธุ์ที่สำรวจพบจากพื้นที่ศึกษา จำนวน 8 แหล่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของสังคมป่าที่ได้รับการบันทึกไว้ไม่น้อยกว่า 41 ประเภท ของคนกะเหรี่ยงนั้น ได้ระบุถึงการใช้ประโยชน์ในด้านสมุนไพรจำนวน 143 ชนิดพันธุ์ เป็นอาหาร จำนวน 145 ชนิดพันธุ์ ใช้ในพิธีกรรม จำนวน 12 ชนิดพันธุ์ และใช้ประโยชน์โดยทั่วไป จำนวน 91 ชนิดพันธุ์ อีกทั้งพบว่ามีพรรณพืช จำนวน 190 ชนิดพันธุ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ป่า จากกลุ่มเหาะ (Paw : Shrub, Bāmboo, Clumping, Vetgetation) จำนวน 31 ชนิดพันธุ์ กลุ่มเหิง (Teung : Tree) จำนวน 127 ชนิดพันธุ์ กลุ่มมือ (Meu : Woody climber/Liana) จำนวน 26 ชนิดพันธุ์ และจากกลุ่มพา (Pa : Epiphyte (Commensal, Parasitic) จำนวน 6 ชนิดพันธุ์ ซึ่งมีสัตว์ป่าที่ใช้ประโยชน์อย่างน้อย 13 ชนิดพันธุ์ ประกอบด้วย *Elephas maximus*, *Bos gaurus*, *Sus scrofa*, *Muntiacus muntjak*, *Cervus unicolor*, *Helarctos malayanus*, *Capricornis sumatrensis*, Civet ในวงศ์ Viverridae, *Lophura leuconelanos*, Gibbon ในวงศ์ Hylobatidae, ค่างในวงศ์ Cereopitheciidae, *M.memestrina*, Squirrel ในวงศ์ Sciuridae, และสัตว์ปีกในกลุ่มนก (Birds) โดยที่องค์ความรู้ของคนกะเหรี่ยงก็สามารถที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของสังคมป่าและกระบวนการทางนิเวศกับพฤติกรรมของสัตว์ป่าที่เข้าใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นบทสรุปที่สำคัญซึ่งได้จากการดำเนินโครงการในครั้งนี้จึงได้แก่ข้อสรุปที่ว่า องค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของชนเผ่าพื้นเมืองเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะนำไปสู่การหาข้อสรุปในทางนิเวศวิทยาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่ง และนับเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าสมควรได้รับการให้ความสำคัญและการอนุรักษ์ไว้ด้วยการสนับสนุนให้พฤติกรรมในการใช้ประโยชน์แบบพึ่งพาต่อทรัพยากรของคนพื้นเมืองได้ดำรงอยู่ควบคู่กับวิถีชีวิตต่อไป อีกทั้งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ปัจจัยจากภายนอกเข้าไปส่งผลกระทบต่อ

ต่อองค์ความรู้ที่มีอยู่ พร้อมกับการเอื้ออำนวยให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เหล่านั้นใน
การสร้างแผนการจัดการ และพัฒนาไปสู่กระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากร
ชีวภาพอย่างมีส่วนร่วมต่อไป

Abstract

The Karen Ethnobotanical Knowledge Study Project in Thung - Yai Naraesuan Wildlife Sanctuary is an action research project which reflects the participatory processes between the researchers and local people, such as in the establishment of study framework, methodology, data system and analysis. Not only research questions were answered, but activities under the project were undertaken to disseminate the Karen's knowledge which advantages to them at the same time. According to the Karen's conceptual base of ecological system and ethnobotanical knowledge, the types of forest can be identified. In this research project, the identification of forest types and plant species were verified and its result reveals that, by 461 plants species surveyed in 8 study areas as a representative of the recorded forest communities not less than 41 types, 143 plant species used for herb, 145 plant species used for food, 12 plant species used in rites and 91 plant species used in general. Besides, it's found that 190 plants species comprising 31 plant species of Paw (Shrub, Bamboo, Clumping, Vegetation), 127 plant species of Teung (Tree), 26 plant species of Meu (Woody climber / liana) and 6 plant species of Pa (Epiphyte (Commensal, Parasitic) are useful for wildlife at least 13 species as follows ; *Elephas maximus*, *Bos gaurus*, *Sus scrofa*, *Muntiacus muntjak*, *Cervus unicolor*, *Helarctos malayanus*, *Capricornis sumatrensis*, Civet in Viverridae Genus, *Lophura leuconelanos*, Gibbon in Hylobatidae Genus, Monkey in Cereopithecidae Genus, *M. memestrina*, Squirrel in Sciuridae Genus, and Birds. That's why the Karen's knowledge can illustrate the relation between the forest communities and ecological processes and the wildlife's behavior of forest use.

Therefore an important conclusion of this research project can illuminate the ethnobotanical knowledge of indigenous people which is considered as great instrument cluing to another natural resources ecology conclusion and as a worthy knowledge deserved to be taken into account and conserved by sustaining the livelihood by resources use in their area. Furthermore setting measures is required in a hurry in order to prevent any external factors impacting on an existing knowledge which benefits to accomplish bio - resources management plan and to develop knowledge relevant to participation and monitoring any impact on bio - resources.

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	I
Abstract	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VI
สารบัญภาพ	VII
บทที่ 1 : บทนำ	
1.1 ภูมิหลัง	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน	3
1.4 บริบทพื้นที่ศึกษา	4
การศึกษาพืชพรรณจากวิถีชีวิตคนกะเหรี่ยง	
1.พืชพื้นราบ พืชที่ลุ่ม และพื้นที่อื่นๆที่มีกิจกรรมของคนกะเหรี่ยง	4
2.พื้นที่ป่าสมบูรณ์	6
3.พื้นที่ไร่ชา	7
4.พืชพรรณบนหิน	8
5.พื้นที่ริมน้ำและ heophytics plant	8
บทที่ 2 : วิธีการศึกษา	
กระบวนการการวางแผนโครงการ	9
2.1 การคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการ	9
2.2 การรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆในชุมชน	9
2.3 การออกแบบวิธีการศึกษา	9
2.4 การคัดเลือกพื้นที่ศึกษา	11
2.5 การวางแผนการสำรวจ	15
2.6 การสำรวจ	15
2.7 การรวบรวมข้อมูล	16
2.8 การสรุปผลและการวิเคราะห์ข้อมูล	16
2.9 การนำเสนอข้อมูล	17
บทที่ 3 : ผลการศึกษา	
BOTANICAL CLASSIFICATION SYSTEM OF THE KAREN	19
3.1 การจำแนกพืชตามประเภทป่า	21
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดพืชกับการใช้ประโยชน์	23
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่ากับชนิดของพืชที่ใช้เป็นอาหาร	24

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 : บทสรุป

4.1 วิจารณ์ผลการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกะเหรี่ยงกับการใช้ประโยชน์จากพืชป่า	35
--	----

องค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของคนกะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์	35
---	----

สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	
------------------------	--

ความเข้าใจในกระบวนการทางนิเวศของชุมชนกะเหรี่ยง	36
--	----

กระบวนการมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่นต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	36
---	----

- แบบมีส่วนร่วม

4.2 ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการแสวงหาความร่วมมือกับ	37
--	----

คนท้องถิ่นในการอนุรักษ์	
-------------------------	--

ผลการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ในเชิงการจัดการ	37
--	----

แนวทางในการปกป้ององค์ความรู้ของคนพื้นเมือง	38
--	----

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1. Karen classification according to vegetative habit	19
2. Karen classification of individual plants	20
3. แสดงชนิดพืชที่สำรวจพบจำแนกตามประเภทป่า	21
4. แสดงการจำแนกตามการใช้ประโยชน์แต่ละประเภทป่า	23
5. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่ากับชนิดพืชที่ใช้เป็นอาหาร	24
6. แสดงรายละเอียดรายชื่อพืชที่ปรากฏในตัวอย่างภาพและการกำหนดรหัส	28
7. แสดงการกำหนดรหัสแทนประเภทป่า รหัสแทนลักษณะกลุ่ม - ประเภทพืช และรหัสแทนการใช้ประโยชน์	Page 1
8. แสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าเต็งเบ-ไผ่กล้า	Page 23
9. แสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าเต็ง-เข็กกล้า	Page 34
10. แสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าวากลิ้ง-กล้า	Page 40
11. แสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าเต็ง - ทีโน	Page 49
12. แสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าวามะดู - กล้า	Page 55
13. แสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าเต็ง - เข	Page 59
14. แสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าเต็ง - เขพุกกล้า	Page 63
15. แสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าเหว - เขกล้า	Page 66
16. แสดงการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในป่าเต็ง - เขพุกกล้า	Page 74
17. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับป่าเต็ง - เข	Page 74
18. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่าและช่วงเวลาที่ผ่านมา ใช้ประโยชน์ในป่าเหว - เขกล้า	Page 75
19. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับป่าวากลิ้ง - กล้า	Page 75
20. แสดงการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในป่าเต็ง - ทีโน	Page 76
21. แสดงการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในป่าเต็ง - เขกล้า	Page 76
22. แสดงการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในป่าวามะดู - กล้า	Page 77
23. แสดงการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในป่าเต็งเบ - ไผ่กล้า	Page 77

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1. แผนที่แสดงพื้นที่ดำเนินโครงการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	12
2. แผนที่แสดงการจำแนกประเภทป่าตามองค์ความรู้ของคนกะเหรี่ยง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	13
3. แผนที่แสดงตำแหน่งของประเภทป่าเพื่อประกอบการวางแผนสำรวจ	14
4. ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่าง ของป่าประเภทต่างๆ	Page 2
5. ภาพลายเส้นแสดงตัวอย่างกลุ่มสังคมป่าเต็งรัง	A1
6. ภาพลายเส้นแสดงตัวอย่างกลุ่มสังคมป่าเบญจพรรณ	A2
7. ภาพลายเส้นแสดงตัวอย่างกลุ่มสังคมป่าดิบชื้น - กล้า	A3

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ภูมิหลัง

โครงการศึกษาองค์ความรู้เชิงพฤกษศาสตร์ของชุมชนกะเหรี่ยง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการBRT) ได้เกิดขึ้นจากการที่มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เข้าดำเนินโครงการศึกษาการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมร่วมกับคนกะเหรี่ยงในพื้นที่นี้ระหว่างปี พ.ศ 2537 - พ.ศ 2539 และเมื่อโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงพร้อมกับข้อสรุปของการประเมินผลโครงการแบบมีส่วนร่วมระหว่างมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและตัวแทนองค์กรชุมชนในพื้นที่ พบว่ามีข้อเสนอจากคนกะเหรี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติการเพื่อการติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Monitoring Program) เกิดขึ้น พร้อมกับข้อเรียกร้องของคนกะเหรี่ยงในการขอมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวในทุกขั้นตอน ด้วยสาเหตุนี้ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าฯ จึงได้ทำหน้าที่ในการประสานงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงการขึ้นในลำดับถัดมาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ทั้งนี้ในการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการพบว่า กิจกรรมการสำรวจป่าได้รับการให้ความสำคัญเป็นพิเศษจากคนกะเหรี่ยงในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดซึ่งเป็นกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเข้าใจระบบนิเวศของคนกะเหรี่ยง โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์เป็นประเด็นหลัก และมีเป้าหมายของคนกะเหรี่ยงเองในเบื้องต้นที่จะทำให้งิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างผู้รู้ในชุมชนกับกลุ่มที่สนใจรวมตลอดไปจนถึงกลุ่มหนุ่มสาวกะเหรี่ยงเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ดีข้อจำกัดประการหนึ่งที่เป็นอุปสรรคเสมอมาของชุมชนบนความพยายามที่จะมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของกรมป่าไม้หรือหน่วยงานอื่นๆที่จะก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในการอนุรักษ์ก็คือความแตกต่างในเรื่องภาษาและศาสตร์ทางด้านฐานความรู้อันมีที่มาจากซึ่งแตกต่างกัน ระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ของท้องถิ่น (Indigenous Knowledge ; IK) ดังนั้นโครงการศึกษานี้จึงมีความพยายามในการจัดข้อจำกัดดังกล่าวในเบื้องต้นให้ได้มากที่สุด ด้วยการแสวงหาทางออกร่วมกับคนกะเหรี่ยงในพื้นที่ เริ่มตั้งแต่การเชิญผู้นำและผู้รู้ในชุมชนเป็นที่ปรึกษาโครงการทำหน้าที่ในการระดมความคิดและความคาดหวังทั้งหมดที่ชุมชนคาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ เพื่อประกอบการสร้างกระบวนการ วิธีการ วิถีวิทยา และระบบการบันทึกข้อมูลขึ้น บนหลักการพื้นฐานสำคัญที่ว่า การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นของชุมชน วิธีการทั้งหมดที่เกิดขึ้นต้องเป็นกิจกรรมที่ชุมชนมีความเข้าใจและพึงพอใจสูงสุด โดยไม่มีข้อกังวลใดๆถึงผลสรุปของคนกะเหรี่ยงต่อรูปแบบของโครงการ เมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ปรากฏในอนาคต ผลการศึกษาที่ได้ก็จะกลายเป็นการบันทึกอย่างเป็นระบบในรูปแบบที่ชุมชนต้องการและจะกลายเป็นเครื่องมือของคนกะเหรี่ยงที่จะใช้สำหรับการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะการสูญเสียองค์ความรู้ในเรื่องทรัพยากรในประเด็นต่างๆต่อไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาและข้อมูลที่ปรากฏย่อมนำไปสู่การทำความเข้าใจต่อสาธารณะและการแสวงหาข้อสนับสนุนในทางนโยบายเพื่อการให้ความสำคัญต่อชุมชนกะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามความรู้ของชุมชนร่วมกับหน่วยงานของทางราชการและการสร้างแผนการจัดการร่วม (Co-Management Plan) ในอนาคต อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการศึกษาดังกล่าวจะเป็นเพียงการศึกษาระดับขั้นต้น และไม่ได้ให้ความสำคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวควบคุมแต่อย่างใด หากแต่น่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญอันจะนำไปสู่การคิดค้นกระบวนการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ทั้งในแง่ของการสำรวจอย่างเป็นระบบ การจำแนก (Identification) การจัดทำอนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy) การแสวงหามาตรการอนุรักษ์ในสภาพธรรมชาติ (In-situ conservation) การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี พันธุวิศวกรรม หรือการศึกษาในเรื่องสัตวศาสตร์ต่อไปในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ของชุมชนกะเหรี่ยงตำบลไล่โว่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 6 หมู่บ้าน จำแนกประเภทป่าตามองค์ความรู้ของชุมชน
2. เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนนำกระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบนิเวศและกฎเกณฑ์รวมทั้งวัฒนธรรมการจัดการทรัพยากรตามวิถีชีวิตขยายสู่คนรุ่นใหม่
3. เพื่อสร้างแผนที่ภูมิปัญญาแสดงการจัดแบ่งประเภทป่าและการคุ้มครองภูมิความรู้ของชุมชน
4. เพื่อการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ของชุมชนเองในอนาคต

1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน

เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Action Research) อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์สำคัญตามเจตนารมณ์ของข้อตกลงร่วมระหว่างมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและคนกะเหรี่ยงในพื้นที่ กล่าวคือการปฏิบัติการร่วมกันในกระบวนการต่างๆของโครงการทุกขั้นตอน ดังนั้นเงื่อนไขสำคัญจึงอยู่ที่การจัดสรรเวลาในการดำเนินกิจกรรมที่ต้องเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนกะเหรี่ยง โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในรอบปี ทั้งที่เป็นกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมพิธีกรรม อีกทั้งการคำนึงถึงความสอดคล้องในแง่ความร่วมมือและความเหมาะสมในเรื่องภูมิประเทศและข้อจำกัดในเรื่องฤดูกาล ประกอบกับข้อจำกัดของระยะเวลาโครงการ ดังนั้นเมื่อพิจารณาประกอบกับเนื้อหาของความรู้ในเรื่องความเข้าใจระบบนิเวศวิทยาด้านป่าไม้ของคนกะเหรี่ยงซึ่งจะเป็นกรอบหลักในการศึกษาซึ่งพบว่ามีการจำแนกประเภทป่าไม่น้อยกว่า 41 ประเภท ทำให้การแสวงหาทางออกร่วมกันระหว่างมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่ากับคนกะเหรี่ยงในการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาได้กำหนดกิจกรรมการสำรวจโดยคัดเลือกพื้นที่ศึกษาจากสังคมป่าประเภทใหญ่ 3 ประเภทที่มีการจำแนกไว้ เพื่อให้เป็นตัวแทนของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด ประกอบกับการระบุถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางเข้าสำรวจ ดังนั้นผลการคัดเลือกจึงได้พื้นที่ศึกษาจำนวน 8 พื้นที่ คือ

1. ป่าเดอ-เซกล่า
2. ป่าเวีย-เซกล่า
3. ป่าวากลือ-กล่า
4. ป่าเดอ-ทีโน
5. ป่าวามะดู-กล่า
6. ป่าเดอ-เซ
7. ป่าเดอ-เซพูกล่า
8. ป่าเดอเบ-ไล่กล่า

เมื่อทำการคัดเลือกตัวแทนสังคมป่าที่ศึกษาได้ ในการกำหนดตัวแปรตามซึ่งเป็นประเด็นที่นำมาซึ่งการสร้างวิถีวิทยาในการศึกษาจึงได้กำหนดเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้

1. การใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ป่า
2. การกระจายตัวของพรรณพืชตามป่าประเภทต่างๆ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทป่ากับชนิดของพืช
4. การจำแนกพืชที่พบตามประเภทป่าที่ศึกษา
5. ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดพืชกับการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าและความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่ากับประเภทป่าที่ศึกษา
6. การศึกษาในมิติเชิงวัฒนธรรม (ผ่านการสนทนากลุ่มย่อยระหว่างการสำรวจ และ ประวัติศาสตร์การใช้ประโยชน์ของพืชในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพืชที่สำรวจพบ)
7. การศึกษาเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืชชนิดต่างๆที่สำรวจพบ (ผ่านการถ่ายทอดระหว่างผู้รู้ที่เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งต่อกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมการศึกษา)

1.4 บริบทพื้นที่ศึกษา

ชุมชนกะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ทั้งหมดเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ปี ทั้งนี้ทุกชุมชนได้ร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าในการพัฒนากระบวนการตามที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นด้วยกัน แต่ในกรณีนี้จะได้ยกตัวอย่างสำหรับหนึ่งชุมชนคือ หมู่บ้านสะเนฟอง ในการอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ในแง่ความหลากหลายของพันธุกรรมพืชจากการปรับตัวของชุมชนท่ามกลางสภาพนิเวศที่หลากหลายจนกระทั่งเป็นฐานข้อมูลที่ปรากฏในปัจจุบัน

หมู่บ้านสะเนฟอง เป็นหมู่บ้านของคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอสังขละบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 12 กิโลเมตร ที่ละติจูด 15 องศาเหนือ ลองติจูด 98.5 องศาตะวันออก อยู่ในบริเวณค่อนไปทางทิศตะวันตกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดยหมู่บ้านตั้งอยู่ในหุบเขาหินปูน ที่ระดับความสูง 200 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีห้วย “โรคี่” ไหลผ่านหมู่บ้านในทิศใต้ - ตะวันตก ระหว่างทางเข้าหมู่บ้าน มีเนินเขาไม้แดงลักษณะเนินค่อนข้างสูงเป็นเครื่องกีดขวางทางธรรมชาติจากอิทธิพลภายนอก ผาหินปูนและชั้นหินเป็นหมวดหินชุดราชบุรี ซึ่งเกิดอยู่ในช่วง Carboniferous-Permian ประมาณ 230-300 ล้านปี และเพิงยกตัวขึ้นมาไม่นานนัก

การศึกษาพืชพรรณจากวิถีชีวิตคนกะเหรี่ยง

1. พืชพื้นราบ พืชที่ลุ่ม และพื้นที่อื่นๆที่มีกิจกรรมของคนกะเหรี่ยง

คนกะเหรี่ยงในชุมชนนี้ทุกคนทำเกษตรกรรมในระบบไร่หมุนเวียน (Rotation Shifting Cultivation Agriculture System) ดังนั้นกิจกรรมการทำเกษตรกรรมในบริบทนี้ของชาวกะเหรี่ยงจึงได้มีส่วนในการปรับตัวทำให้เกิดการดำรงอยู่ของพันธุกรรมพืช ภายใต้ขอบเขตของพื้นที่ไร่หมุนเวียนที่เป็นไร่ชาก (Long Follow) ในช่วงอายุต่างๆ ยกเว้นในพื้นที่ซึ่งไม่มีกิจกรรม เช่นบริเวณที่เป็น

พื้นที่สูงชัน ภูเขาสูงชัน หรือพื้นที่อื่นๆซึ่งมีข้อห้ามที่หลากหลายของชุมชนกำกับการใช้พื้นที่เป็นตัวควบคุมอยู่

พื้นที่ทำการเกษตร และพื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัย พบวัชพืชที่ขึ้นทั่วไป เช่น *Eupatorium odoratum* L., *Tridax procumbens* L., *Blumea balsamifer*(L.) DC.(allcompositae) ; *Euphorbia hirta* L. and *Phyllanthus urinara* L.(Euphorbiaceae); various *Cyperaceae* เช่น *Cyperus halpan* L. var. *halpan*, *C. iria* L., *Simbristylis dichotoma* (L.) Vahl ssp. *Dichtoma*; and *Gramineae* (grasses) ประกอบด้วย *Chloris barbata* SW., *Digitaria setigera* Roth Roem. & Schult. Var. *setigera*, *Eleusine indica* (L). Gaerth., *Imperata cylindrica* (L.) P.Beauv. var. *major* (Nees) C.E. Hubb. Ex Hubb & vaugh., *Pennisetum pedicellatum* trin., และ *Sacciolepis indica* (L.) chase.

ส่วนในพื้นที่ที่เคยผ่านการเพาะปลูก/ถูกเผาและทิ้งร้างไว้ จะขึ้นตัวตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ ประกอบด้วย ไม้เนื้ออ่อน ไม้โตเร็ว ส่วนใหญ่เป็นไม้ไม่ผลัดใบอายุสั้น และไม้ผลัดใบ ความสูงมากกว่า 10 เมตร ได้แก่ *Flacourtia indica* (Burm.f.) Merr.(Flacourtiaceae), *Microcos paniculata* L. (Tiliaceae), *Oroxylum indicum* (L.) Vent. (Bignoniaceae), *Gmelina arborea* Roxb. (Verbenaceae), *Macaranga gigantea* (Rchb. f. & Zoll) M.A. (Euphorbiaceae) และ *Ficus hispida* L. f. var. *hispida* (Moraceae)

ไม้ชั้นล่างที่พบในพื้นที่ป่าที่มีกิจกรรมของคนกะเหรี่ยงพบวัชพืชที่เป็นตัวแทน เช่น *Thysanolaena latifolia* (Roxb.ex Hom.) Honda และ *Saceharum arundinaceum* Retz. (Gramineae) และพบว่าไม้พุ่ม และไม้สมุนไพร (พวก Perennial herbs) เป็นตัวแทนของพื้นที่นี้ด้วย

ไม้เนื้อแข็งบางอย่าง ได้แก่ *Helicteres hirsuta* Lour (Stercaliaceae) และ *Debregeasia longifolia* (Burm.f.) wedd. (Urticaceae)

Tinospora crispea (L.) Hk. f. & Th. และ *T. sinensis* (lour.) Merr. (Menispermaceae, ไม้ผลัดใบทั้งคู่) และ *Cayratia tenuifolia* (Wight & Arn) Gagnep. var. *tenuifolia* (Vitaceae) เป็นไม้เลื้อยที่พบได้ในพื้นที่นี้

ส่วนสมุนไพรอื่นๆได้แก่ *Alpinia malaccensis* (Burm. f.) Rosx. (Zingiberaceae), *Dioscorea bulbifera* L. (Dioscoreaceae) และ *Lygodium flexuosum* (L.) Sw. (Schizaeaceae, เฟิร์นเลื้อย)

2. พื้นที่ป่าสมบูรณ์

พื้นที่ป่าสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้เบญจพรรณ และไม้ไม่ผลัดใบ ในขณะที่ไม้พื้นล่างส่วนใหญ่เป็นไม้ไม่ผลัดใบ และพวกไม้พุ่ม สมุนไพร และลูกไม้ แม้ว่าในบางพื้นที่ที่มีไม้ใหญ่ถูกนำออกไปใช้ แต่ส่วนใหญ่จะมีไม้ขนาดใหญ่อยู่มาก ซึ่งมีความสูงกว่า 30 เมตร และ DBH มากกว่า 1 เมตร เช่น *Duabanga grandiflora* (Roxb. ex. DC.) Walp. (Sonneratiaceae ทุกชนิดเป็นไม้ไม่ผลัดใบ) ส่วนไม้ผลัดใบได้แก่ *Anogeisus acuminata* (Roxb. ex. DC.) Guill. & Perr. (Combretaceae), *Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers. var. *speciosa* (Lythraceae), *Casearia flavovirens* Bl. (Flacourtiaceae), *Xylia xylocarpa* (Roxb.) Taub. var. *Kerrii* (Craib & Hutch.) Niels. (Leguminosae, Mimosoideae), และ *Cratoxylum sumatranum* (Jack) Bl. ssp. *sumatranum* (Hypericaceae) ซึ่งเป็นพืชที่ค้นพบใหม่ในประเทศไทย

ไม้ไม่ผลัดใบ พบว่าอยู่ในวงศ์ *polyalthia* (Annonaceae), *Dysoxylum* (Meliaceae), *Knema linifolia* (Roxb.) Warb. (Myristicaceae)

ส่วนปาล์ม ได้แก่ *Arenga wightii* Griff (Palmae) มีความสูง 8 เมตร เรือนยอดกว้าง 7 เมตร

ไม้ชั้นล่างไม่ผลัดใบ ได้แก่ *Anaxagorea luzonica* A. Gray และ *Goniothalamus griffithii* Hk. f. & Th. (เป็น Annonaceae), *Saraca declinata* (Jack) Miq. (Leguminosae, Caesalpinioideae) (ทั้งคู่เป็น Euphorbiaceae), *Streblus taxoides* Hey. ex Roth) Kurz (Moraceae),

ส่วน *Strobilanthes turginodis* Im. (Acanthaceae) เป็นไม้พุ่มไม่ผลัดใบที่พบได้ตามไร่ร้างทั่วไป

ไม้เลื้อยไม่ผลัดใบ ได้แก่ *Tinomiscium petiolare* Hk. f. & Th. (Momsipernaceae) และ *Phytcrene vracteata* Wall. (Iccanicaceae) ที่ผลัดใบได้แก่ *Acacia megaladena* Desv. var. *megaladema* (Leguminosae, Mimomosoideae), *Premna scandens* Roxb. (Verbenaceae) และ *Broussonetina kurzii* (Hk. f.) Cron. (Moraceae)

พืชสมุนไพรที่เป็นตัวแทนพื้นที่นี้ได้แก่ *Geophila repens* (L.) i.M. John., *Ophiorrhiza hispidula* Wall. ex G. Don var. *hispidula* (ทั้งคู่เป็น Rubiaceae), *Aeginetia indica* Roxb. (Orobanchaceae) และ *Balanophor latispala* (Tiegh.) Lec. (Balanophoraceae)

ที่เป็นพวก Saprophytes/paraplots ได้แก่ *Justicia caloneura* Kurz (Acanrhaceae) และ *Amomum testaceum* Ridl. (Zingiberaceae)

เฟิร์น ได้แก่ *Adiantum philippense* L. (Parkeriaceae), *Tectaria impressa* (fee) Holtt. และ *T. herpetocaulos* holtt. (Dryopteridaceae) และ *Thelypteris nudata* (Roxb.) Mort. Thelypteridaceae

พวกกาฝาก (epiphytes) พบขึ้นอยู่อย่างสมบูรณ์ อยู่ทั่วไปในทุกชั้นของไม้ ได้แก่ *Dischidia hirsuta* (Bl.) Decne และ *Hoya acuta* Haw. var. *acuta* (ทั้งคู่เป็น *Asclepiadaceae*), ที่เป็นกล้วยไม้ ได้แก่ *Dendrobium fimbriatum* Hk., *Oberonia iridifolia* (Roxb.) Lindl., และ *Vanda teres* Lindl. ที่เป็นเฟิร์น ได้แก่ *Vittaria elongata* Sw. (*Vittariaceae*), *Asplenium nidus* L. var. *nidus* (*Aspleniaceae*) และ *Platyserium Wallichii* Hk.

3. พื้นที่ไร่ซาก(Long Follow)

พื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ในระบบไร่หมุนเวียนย้อนเวลาไปเมื่อ 200 ปีที่ผ่านมา อันเกิดจากการถากถาง/ตัด/เผาและเพาะปลูก จะยังคงมีไม้ใหญ่เหลืออยู่บ้างเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นไม้ผลัดใบ ขอบเขตของพื้นที่ดังกล่าวสังเกตได้จากความสมบูรณ์ของไม้ไฟ 2 ชนิดที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ viz. *Giantochloa apus* (Schult.) และ *G. nigro-ciliata* (Beuse) kurz (ทั้งคู่เป็น *Gramineae*, *Bambusoideae*) พื้นที่ที่โล่งมากก็จะพบไม้ไฟมาก

ไม้ผลัดใบที่เป็นตัวแทนของพื้นที่นี้ ที่มีความสูงกว่า 20 เมตร ได้แก่ *Cassia fistula* L. (*Leguminosae* *Caesalpinioideae*), *Mitragyna rotundifolia* (Roxb.) O.K. (*Rubiaceae*), *Phyllanthus emblica* L. (*Euphorbiaceae*), และ *Ficus superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq. (*Moraceae*)

ไม้พื้นล่างโดยเฉพาะพวกสมุนไพรจะมีอยู่อย่างหลากหลายและเป็นพวกที่พบได้ตลอดปี มีไม้อยู่หลายชนิดที่ออกดอกในช่วงแล้ง ก่อนที่จะทิ้งใบ ไม้สมุนไพรที่เป็นตัวแทนส่วนใหญ่เป็นพวก *monocots* เช่น *Curcuma Rosceana* Wall., *C. pepiolata* Roxb., *Zingiber smilesiamum* Craib, และ *Kaempferia elegans* Wall. (ทุกชนิดเป็น *Zingiberaceae*) ส่วนที่ยังไม่สามารถแยกชนิดได้นั้น พบว่าอยู่ในสกุลของ *Amorphophallus* (*Araceae*) ส่วนกล้วยไม้ที่อยู่ตามพื้นล่าง เช่น *Nervilia aragoana* Gaud. และ *Geodorum difersiflorum* (Lam.) Schltr.

โดยทั่วไปในพื้นที่ป่าไร่ซาก จะมีทั้งชนิดและจำนวนไม้ที่เป็นไม้เลื้อยและกาฝาก น้อยกว่าในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ และบ่อยครั้งที่การจำแนกพื้นที่ ระหว่างพื้นที่ป่ารุ่นสอง และพื้นที่ป่าไร่ซาก เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากมีลักษณะพืชพรรณที่คล้ายกันและในบางครั้งเช่นเดียวกับพื้นที่ป่าไร่ซากกับพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ที่มักพบปัญหาการแยกประเภทออกจากกัน

พืชพรรณบนหิน

ในพื้นที่ที่เป็นหินปูน มีพืชพรรณหลายอย่างที่พบเฉพาะพื้นที่นี้เท่านั้น และส่วนใหญ่ก็เป็นพืชประจำถิ่นที่ขึ้นกระจายทั่วไป ซึ่งทั้งหมดเป็นสมุนไพร ช่วงเวลาที่ดีที่สุดต่อการพบเห็น ได้แก่ ช่วงหลังฤดูฝน เดือนสิงหาคม - ตุลาคม พืชพวก Ilirhophytes หรือพวกที่ขึ้นได้เฉพาะบนหินปูน มีอย่างน้อย 6 ชนิด ได้แก่ *Argostemma* (Rubiaceae) เช่น *A. albovenatum* Gedd. และ *A. plumbeum* Craib (2ชนิด) และอีก 4 ชนิด ใน *Begonia* (Begoneceae) ได้แก่ *B. demissa* Craib และ *B. notata* Craib. *pilea* aff. *wightii* Wedd. (Urticaceae), *Caulokaempferia saxicola* K.Lar., *Globba substrigosa* King ex Bak. (ทั้งคู่เป็น Zingiberaceae) และ *Selaginella delicatula* (Desv.) Alst. (Selaginellaceae) จะพบว่ามีความหลากหลายในบริเวณหินที่เป็นร่มเงาและชื้น *Impatiens opinata* Craib, *I. patula* Craib (ทั้งคู่เป็น Balsamineceae) และ *Rhynchoglossum obliquum* Bl. (Gesneriaceae) เป็นพวกที่ชอบขึ้นบนหินปูนที่แห้ง และพบว่าพืชที่ขึ้นบนหินปูน อย่างน้อย 28 ชนิด

พื้นที่ริมน้ำและ rheophytics plant

ถึงแม้ว่าป่าสมบูรณ์ที่ตลอดลำห้วย “โรคิ” จะถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไปบ้าง แต่ในบริเวณพื้นที่หมู่บ้านยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ พืชพรรณส่วนใหญ่เป็นไม้ไม่ผลัดใบ ความสูงต่ำกว่า 10 เมตร และระบบรากที่คอดักตะกอน ได้แก่ *Dillenia indica* L. (Dilleniaceae) เป็นไม้ผลัดใบ ในช่วงเดือนสิงหาคม ในขณะที่ไม้อื่นเป็นไม้ไม่ผลัดใบ ได้แก่ *Capparis roxburghii* R. Br. var. *roxburghii* (Capparidaceae), *Elaeocarpus rugosus* Roxb. (Elaeocarpaceae), *Aesculus assamica* Griff. (Hippocastinaceae), *Eugenia megacarpa* Craib (Myrtaceae) และ *Homonoia riparia* Lour. (Euphorbiaceae) และเฟิร์นพบอยู่ตลอดริม น้ำ ได้แก่ *Diplazium esculentum* (Retz.) Sw. (Athgriaceae)

บทที่2 วิธีการศึกษา

กระบวนการการวางแผนโครงการ

ในการวางแผนและการกำหนดกิจกรรมขั้นตอนต่างๆของโครงการ องค์ประกอบสำคัญของการตัดสินใจคือการมีส่วนร่วมของคนกะเหรี่ยงในพื้นที่ผ่านระบบตัวแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการฯได้เชิญผู้รู้และผู้อาวุโสของชุมชนเป็นคณะที่ปรึกษาของโครงการ ดังนั้นกระบวนการทั้งหมดของโครงการฯจึงได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มตัวแทนดังที่ได้กล่าวแล้ว ซึ่งมีขั้นตอนในการปรึกษาตลอดจนการวางแผนและการปฏิบัติการดังต่อไปนี้

2.1 การคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการ

เนื่องจากโครงการนี้มีการพัฒนาโครงการมาจากการศึกษาในเรื่องความรู้อันเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของคนกะเหรี่ยง ดังนั้นในการคัดเลือกที่ปรึกษาของโครงการซึ่งเป็นคนกะเหรี่ยง จึงได้คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ในชุมชนในด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ก.ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ป่า ข.ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพืชและสมุนไพร ค.ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์ป่า และ ง.ผู้ที่สามารถประสานงานในชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจึงเป็นบุคคลที่ชุมชนให้การยอมรับสูง

2.2 การรับฟังความคิดเห็นของบุคคลกลุ่มต่างๆในชุมชน

ในขั้นตอนนี้โครงการได้กำหนดให้เกิดการสัมมนาในพื้นที่ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาโครงการที่เป็นคนกะเหรี่ยงได้ทำความเข้าใจในกิจกรรมการสำรวจต่อผู้ร่วมชุมชน อีกทั้งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องครอบคลุมของประเด็นที่จะทำการศึกษา รวมตลอดไปจนถึงความเป็นไปได้ของกิจกรรมในขั้นต่อไป

2.3 การออกแบบวิธีการศึกษา

หลังจากที่โครงการได้จัดทำสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากคนกะเหรี่ยงเสร็จสิ้น เป็นผลให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มประสานงานเพื่อการวางแผนโครงการขึ้นจากกลุ่มคนที่สนใจกิจกรรม จากนั้นจึงมีการกำหนดการประชุมเพื่อระบุถึงรายละเอียดของการศึกษารวมตลอดไปจนถึงกรอบประเด็นหลัก ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 2 ประเด็นได้แก่ ก.องค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ข.องค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ก.องค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการผสมผสานวิธีการกำหนดแปลงสำรวจพื้นฐาน กล่าวคือ อ้างอิงตามแปลงสำรวจพรรณพืชที่มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าฯ ได้ทำการศึกษาไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้เป็นตัวแทนของสังคมป่าประเภทต่างๆในการเก็บรวบรวมชนิดพันธุ์พืช


ซึ่งได้แก่แปลงสำรวจขนาด 5x20 เมตร² โดยมีการคัดเลือกพื้นที่ว่างแปลงซึ่งเป็นตัวแทนที่ครอบคลุมตัวแทนของพืชที่ปรากฏในพื้นที่ ส่วนวิธีการเก็บตัวอย่างพืชใช้วิธีการแบ่งพื้นที่แปลงตัวอย่างออกเป็น 3 แปลงย่อย และแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการสำรวจซึ่งมีไม่น้อยกว่า 40 คนในแต่ละครั้ง เพื่อเก็บตัวอย่างทั้งหมดที่พบ และบรรจุตัวอย่างพืชที่ได้ในถุงพลาสติก พร้อมการบันทึกรายละเอียดเบื้องต้นลงในบัตรคำที่เตรียมไว้ จากนั้นเมื่อทำการเก็บตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงรวมกลุ่มผู้ที่สำรวจเพื่อกำหนดตัวแทนในการนำเสนอชนิดพืชที่พบที่ละชนิดพันธุ์และให้ผู้เข้าร่วมการสำรวจทั้งหมดแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องการใช้ประโยชน์ ลักษณะ กระบวนการทางนิเวศ และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพืชชนิดนั้น ส่วนในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมตัวอย่างในกระบะไม้เพื่อการตรวจสอบรายชื่อทางวิทยาศาสตร์ (Identification) มีข้อทักท้วงถึงคหามไม่พร้อมของชุมชนในการเรียนรู้ของขั้นตอนนี้ โครงการจึงได้วางแผนไว้ตั้งแต่ตอนต้นเพื่อสร้างรูปแบบในขั้นตอนนี้ร่วมกับการศึกษาในระยะต่อไป ดังนั้นในการจำแนกพืชจึงอาศัยผู้รู้ในพื้นที่ซึ่งได้แก่คนกะเหรี่ยงที่เป็นผู้อาวุโสเป็นผู้ให้รายละเอียดแทน อีกทั้งเป็นการคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่เหมือนกันให้เหลือเพียงตัวอย่างเดียว ทำการบันทึกข้อมูลตามตารางที่ออกแบบไว้ทั้งภาษาไทยและภาษากะเหรี่ยง ส่วนขั้นตอนสุดท้ายของการจัดบันทึกหลังการจำแนกเสร็จสิ้น เป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมระหว่างโครงการกับคนกะเหรี่ยงกล่าวคือการบันทึกภาพตัวอย่างพืชที่พบทั้งหมดด้วยฟิล์มสไลด์ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงของโครงการและเพื่อเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ของคนกะเหรี่ยงผ่านโรงเรียนภาษากะเหรี่ยงของชุมชน

ข.องค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า การออกแบบวิธีการในประเด็นนี้ อาศัยฐานข้อมูลจากการจำแนกการใช้ประโยชน์ของพืชแต่ละชนิดที่มีการระบุถึงการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าในลักษณะพฤติกรรมต่างๆทั้งที่เป็นอาหาร เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย (Habitat) เป็นแหล่งหลบภัย และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำหรือประโยชน์ในด้านอื่นๆจากป่าประเภทที่ทำการศึกษา อีกทั้งอาศัยข้อมูลจากกลุ่มผู้เข้าร่วมที่มีประสบการณ์เรื่องสัตว์ป่าประกอบเป็นพฤติกรรมของสัตว์ป่าแต่ละชนิดในการเข้าใช้ประโยชน์จากสังคมป่าประเภทนั้นๆ โดยในการเลือกระบุถึงชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าขึ้นอยู่กับความสนใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมในครั้งแรกของการสำรวจว่ามีสัตว์ป่าประเภทใดที่สนใจ ซึ่งหลังจากนั้นในการสำรวจครั้งต่อไปจึงได้ออกแบบตารางการสำรวจเพื่อระบุถึงสัตว์ป่าที่ได้รับความสนใจเหล่านั้นในแบบการสำรวจที่เป็นมาตรฐานอันเดียวกัน ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ 3 ประการ กล่าวคือ 1.ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า 2.ระยะเวลาที่เข้าใช้ประโยชน์ในป่าประเภทนั้น (แบ่งตามเดือน โดยเริ่มนับจากเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือนเริ่มปีของคนกะเหรี่ยง) และ 3.พฤติกรรมของสัตว์ป่า


2.4 การคัดเลือกพื้นที่ศึกษา

เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาของโครงการและข้อคำนึงถึงผลกระทบของกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางการเกษตร กิจกรรมในวิถีชีวิต และกิจกรรมทางพิธีกรรมของคนกะเหรี่ยง ผสมกับข้อจำกัดในเรื่องภูมิประเทศ รวมทั้งสภาพอากาศ จึงทำให้เกิดประเด็นในการพิจารณาร่วมกันเพื่อให้ได้ความเหมาะสมของพื้นที่ศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการและเนื้อหาที่มีการกำหนดขึ้น ดังนั้นจึงได้อาศัยเครื่องมือในการวางแผน ซึ่งได้แก่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแสดงภูมิประเทศ (Three Dimension Model ; 3D Model) ขนาด 1: 50,000 ระยะเวลาต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร พื้นที่ 2,600 ตารางกิโลเมตร เพื่อให้ตัวแทนคนกะเหรี่ยงได้แสดงตัวอย่างจุดที่ตั้งของสังคมป่าทั้ง 41 ประเภท ตามที่ความรู้ของคนกะเหรี่ยงจำแนกได้ จากนั้นจึงได้นำข้อจำกัดดังที่ได้กล่าวในตอนต้นเพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนพื้นที่ให้ครอบคลุม พื้นที่ประเภทสังคมป่า (Forest Type) ทั้ง 3 ประเภท คือป่าเวิยเผ่อ ป่าเดอเผ่อ และป่าวากล่า ซึ่งจากการกำหนดทำให้ได้ตัวแทนประเภทป่าย่อย (Sub Forest Type) จำนวน 8 พื้นที่ ดังรายละเอียดในบทต่อไป

แผนที่ แสดงพื้นที่ดำเนินโครงการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร




แผนที่ แสดงการจำแนกประเภทป่าตามองค์ความรู้ของคนกะเหรี่ยงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร



1. เดอ-เพอ	ป่าดิบ, ชื้น	16. ไท-เพอ	ป่าดิบหุบเขา	31. เวีย-วา-กลา	ป่าหญ้า/ไม้ไผ่
2. เดอ-คูลง	ป่าชื้น, ดิบเขา	17. วา-กลา	ป่าไผ่	32. คูลง-เวีย	ป่าหญ้า/ไผ่ภูเขา
3. นู-กลา	ป่าไผ่ภูเขา	18. วา-หมี-กลา	ป่าไผ่ D. strictus	33. เวีย-วา-หมี	ป่าหญ้า/ไผ่ mountain [D.strictus]
4. เดอ-เร-กลา	ป่าดิบ, ภูเขา	19. วา-บ้วย-กลา	ป่าไผ่ B. tulda	34. เวีย-เร-กลา	ป่าหญ้า/ต้นไม้
5. เดอ-พา-เธอ	ป่าไม้สูง, ภูเขา	20. วา-ผะ-คูลา	ป่าไผ่ G. nigro-ciliata	35. เวีย-ชู-รอง	ป่าละวันนาที่ กำลังเปลี่ยนแปลง
6. เดอ-เมอ เดอ-ชา	ป่าภูเขาตึกดำ	21. วา-กลี-กลา	ป่าไผ่ G.apus	36. เลาะ-เวีย	ป่าละวันนาอายุ
7. เดอ-กอ-ไท	ป่าไม้สูง	22. เร-วา-กลา	ป่าไผ่และต้นไม้	37. ชา-เพอ	ป่าเก่าที่ไม่ถูกรบกวน
8. เดอ-วา-กลา	ป่าไผ่ชื้น, ดิบ	23. คี-เพอ	ป่าพื้นตัวใหม่, fallow	38. เก-เพอ	sandy, soil
9. เพอ-เพอ	ป่าพรุ	24. คี-บอง	ป่า fallow อายุต่ำกว่า 10 ปี	39. PAUN-กลา	บริเวณทุ่งหญ้าสูงชัน
10. เบ-เพอ	ป่าเตาวัลย์	25. คี-ชา	ป่า fallow อายุมากกว่า 10 ปี	40. ไท-กลา	บริเวณทุ่งหญ้าสูงชัน
11. เดอ-ที-โน	ป่าชื้น, streamside evergreen	26. วา-ลอง-กลา	ป่าไม้ไผ่ตาย	41. ยี-กลา	บริเวณทุ่งหญ้าสูง
12. ไส-กลา	ป่าดิบ, เต็มไปด้วยหิน, ชื้น	27. วา-ลอง-พู-กลา	ป่าไม้ไผ่พื้นตัวใหม่		ชันสอง
13. ยา-ไค-กลา	ป่ากล้วย	28. วา-เวีย	บริเวณไม้ตาย		
14. เดอ-เร-พู	ป่าดิบไม้เล็ก	29. เวีย-เพอ	ป่าทุ่งหญ้า (ละวันนา)		
15. เร-กลา	ป่าไม้แข็ง	30. วอง-กลา	"วอง"บริเวณทุ่งหญ้า		

แผนที่ แสดงตำแหน่งของประเภทป่าเพื่อประกอบการวางแผนสำรวจ



- | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1. ป่าเคอะเซ-โลกล่า | 2. ป่าเวีย-เซกล่า | 3. ป่าวากลือ-กล่า | 4. ป่าเคอะ-ทีโน |
| 5. ป่าวาระตุกล่า | 6. ป่าเคอะ-เซ | 7. ป่าเคอะ-เซพูกล่า | 8. ป่าเคอะเบ-ไล้กล่า |

2.5 การวางแผนการสำรวจ

เมื่อพิจารณาความแตกต่างในเรื่ององค์ความรู้ในระดับปัจเจกบุคคลต่อความเข้าใจและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากพืชและความเกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า โดยอาศัยข้อมูลจากการทำ (Focus Group) ในขั้นตอนที่ 2 พบว่า คนกะเหรี่ยงเองมีความแตกต่างกันในระดับความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่า ลัทธิความเชื่อภายในชุมชนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมหรือแบบแผนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังพบว่า กลุ่มอายุที่แตกต่างกันก็มีความรู้ในเรื่องทรัพยากรที่แตกต่างกัน และที่สำคัญยิ่งปรากฏชัดว่า เพศที่ต่างกันจะมีความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรที่แตกต่างกัน

ดังนั้นเพื่อให้การสำรวจมีความรัดกุมที่สุดในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นกรอบประเด็นหลักตาม รายละเอียดการศึกษาที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 จึงต้องกำหนดให้ในการสำรวจแต่ละครั้งมีการกำหนดระบบโควต้า เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าร่วมการสำรวจเป็นตัวแทน (Representative) ของทั้งเพศหญิงและเพศชายที่ประกอบด้วยความแตกต่างกันทั้งในเรื่องช่วงอายุและลัทธิความเชื่อภายในชุมชน จากนั้นจึงนำข้อจำกัดในเรื่องกิจกรรมทางการเกษตร ข้อจำกัดในเรื่องเวลาสำหรับการประกอบพิธีกรรม มาเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการสำรวจทั้ง 8 ครั้งตามที่ได้วางแผนไว้ในตอนต้น

2.6 การสำรวจ

ผลจากการปฏิบัติการตามขั้นตอนที่ 1-5 ทำให้ขนาดของผู้เข้าร่วมการสำรวจในแต่ละครั้งมีประมาณ 40 คน ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดบันทึกและก่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เกิดขึ้นระหว่างการสำรวจจึงมีการกำหนดให้กลุ่มที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้านดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้น ได้มีการหารือล่วงหน้า 1 วันก่อนการสำรวจจริง เพื่อการวางแผนในการเข้าพื้นที่ซึ่งในแต่ละครั้งผู้เข้าร่วมจะต้องใช้วิธีการเดินเท้าไปยังพื้นที่ซึ่งจะทำการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง จากนั้นเมื่อถึงวันนัดหมายในการเข้าสำรวจ กลุ่มที่มีการประชุมก่อนหน้าแล้วจะมีการแนะนำพื้นที่ แนะนำเส้นทาง และการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในพื้นที่ (Orentation) ซึ่งแต่ละครั้งจะใช้เวลาจำนวน 3 วัน ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นจึงมีการแบ่งกลุ่มการสำรวจออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีองค์ประกอบของบุคคลที่มีความแตกต่างกันดังที่ได้เสนอไว้ตอนต้นเป็นสมาชิกกลุ่ม จากนั้นเมื่อเดินทางถึงพื้นที่สำรวจ กลุ่มที่ปรึกษาโครงการจะทำการคัดเลือกพื้นที่เพื่อวางแผนการสำรวจและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆดังปรากฏรายละเอียดในขั้นตอนที่ 3 หรือการออกแบบวิธีการศึกษา

2.7 การรวบรวมข้อมูล

ในขั้นตอนของการนำเสนอตัวอย่างพืชที่สำรวจพบหลังจากการสำรวจแล้วเสร็จ มีการกำหนดกลุ่มผู้จัดบันทึกตามแบบฟอร์มการสำรวจที่สร้างขึ้น ทั้งเรื่ององค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และเรื่องสัตว์ป่า จากนั้นจึงทำการบันทึกภาพตัวอย่างพืชที่สำรวจพบและผ่านการจำแนกชนิดพันธุ์และการใช้ประโยชน์ด้วยฟิล์มสไลด์ อีกทั้งผู้เข้าร่วมการสำรวจได้ร่วมกันกำหนดพื้นที่เพื่อเป็นตัวแทนของสังคมป่า ในการบันทึกภาพในประเด็นโครงสร้าง (Structure) และองค์ประกอบ (Composition) ของประเภทป่าที่ทำการสำรวจครอบคลุมเนื้อหา 4 ประเด็นหลัก คือ 1.ชั้นเรือนยอด 2.กระบวนการทดแทน 3.สภาพโดยทั่วไปของป่า และ 4.จุดเด่นของสังคมป่าประเภทนั้น

2.8 การสรุปผลและการวิเคราะห์

ขั้นตอนนี้มีการแบ่งการสรุปผลและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ก.การสรุปผลและการวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ และข.การสรุปผลและการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ก.การสรุปผลและการวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ ขั้นตอนนี้เป็นการสรุปผลของการสำรวจในแต่ละครั้งที่ได้จากการจัดบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 กลุ่ม โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษาโครงการเป็นผู้สรุปถึงชนิดพันธุ์ที่สำรวจพบ การใช้ประโยชน์จากพืช และความเกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า ด้วยการใช้ตารางการสรุปที่จัดทำขึ้นด้วยกระดาษขนาดใหญ่ในวันสุดท้ายของการสำรวจก่อนการเดินทางกลับ ประกอบกับการใช้ภาพวาดลายเส้นที่รวบรวมลักษณะเด่น โครงสร้าง และองค์ประกอบของสังคมป่าประเภทที่ทำการสำรวจเป็นเครื่องมือในการสรุปสุดท้าย พร้อมกับการถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดที่ได้จากการรวบรวมกับกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ข.การสรุปผลและการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการ(Analysis & Conclusion)

วิธีวิทยา(Methodology) ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่โครงการได้ใช้ฐานข้อมูลที่เป็นผลสรุปของการสำรวจที่มีการนำเสนอและจัดบันทึกในตารางการสำรวจเพื่อกำหนดให้ตัวพืชแต่ละชนิดและการจำแนกกลุ่มพืชตามความเข้าใจของคนกะเหรี่ยงเพื่อเป็นรหัสต่างๆ(รายละเอียดตามตารางแสดงรหัสข้อมูล) รวมทั้งการสรุปผลของแต่ละครั้งด้วยสถิติ จำนวนและร้อยละ (Count&Percentage) จากนั้นจึงนำผลสรุปเบื้องต้นที่ได้จากการสำรวจในแต่ละครั้งมารวบรวมและนำเสนอผลในลักษณะเดียวกันเพื่อการสรุปผลที่ได้ขั้นสุดท้ายในภาพรวมเมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นทั้ง 8 ครั้ง และใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังปรากฏในบทสรุปผลการศึกษา

2.9 การนำเสนอข้อมูล

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและวัตถุประสงค์ของคนกะเหรี่ยง จึงมีการกำหนดให้เกิดการแบ่งลักษณะการนำเสนอข้อมูลใน 2 ระดับ กล่าวคือ ก.การนำเสนอในระดับชุมชน และข.การนำเสนอในเอกสารรายงานการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ก.การนำเสนอข้อมูลในระดับชุมชน เป็นการนำผลการศึกษารวบรวมที่ได้ทุกประเด็นของการสำรวจแต่ละครั้งเพื่อเตรียม (Presentation) ให้กับกลุ่มตัวแทนของผู้เข้าสำรจนำเสนอต่อผู้ร่วมชุมชนอื่นๆที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนั้นๆ โดยในการนำเสนอแต่ละครั้งจะมีตัวแทนคนกะเหรี่ยงจากทุกหมู่บ้านเข้ารับฟังการสรุปผล ซึ่งกิจกรรมในขั้นตอนนี้โครงการได้ดำเนินการทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกระจายพื้นที่จัดการประชุมให้หมุนเวียนครอบคลุมหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้านเพื่อกระจายการมีส่วนร่วม อีกทั้งเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูล (Cross-Checked) โดยเฉพาะการรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้อาวุโสในชุมชนที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกับคณะสำรวจได้ ส่วนรายละเอียดเนื้อหาของการนำเสนอประกอบด้วย 1.การฉายสไลด์ตัวอย่างพืชประกอบข้อมูลการบันทึกที่รวบรวมได้ 2.การเสนอตารางแสดงการเข้าใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าประเภทต่างๆ 3.ภาพวาดลายเส้นที่แสดงโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคมป่าประเภทนั้นๆ

เมื่อการนำเสนอในแต่ละครั้งเสร็จสิ้นกลุ่มที่ปรึกษาโครงการจะทำการมอบหมายให้กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการแต่ละครั้งจัดทำนิทรรศการเป็นภาษากะเหรี่ยง เพื่อจัดแสดงในช่วงที่มีกิจกรรมสำคัญหรือกิจกรรมทางพิธีกรรมในพื้นที่

ข.การนำเสนอในเอกสารรายงานการศึกษา

องค์ประกอบหลักของข้อมูลประกอบด้วย

1. การจำแนกพืชตามประเภทป่าที่ทำการสำรวจ ใช้สถิติจำนวนและร้อยละของชนิดพืชที่สำรวจพบตามการจำแนกประเภทป่า และใช้สถิติพรรณนาสำหรับการสรุปข้อมูลในภาพรวม ซึ่งประกอบด้วย จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่สำรวจพบ และรายละเอียดของชนิดพันธุ์ที่กระจายตามพื้นที่ศึกษา

2. ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดพืชกับการใช้ประโยชน์ โดยใช้ตารางแสดงสถิติและร้อยละของการจำแนกพืชตามการใช้ประโยชน์แต่ละประเภทป่าที่สำรวจ และใช้สถิติพรรณนาในการสรุปผลซึ่งประกอบด้วยชนิดพันธุ์และการใช้ประโยชน์

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่ากับชนิดพืชที่ใช้เป็นอาหาร ใช้สถิติจำนวนและร้อยละในรูปแบบของตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่ากับชนิดพืชที่ใช้เป็นอาหาร และใช้สถิติพรรณนาในการสรุปผลการจำแนกพืชตามจากใช้ประโยชน์ตามชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่คนกะเหรี่ยงสนใจ

4. ภาพแสดงตัวอย่างพืชที่สำรวจพบ โดยการคัดเลือกตัวอย่างภาพที่มีความสำคัญต่อคนกะเหรี่ยงเพื่อเป็นตัวแทนของจำนวนที่สำรวจพบทั้งหมด ซึ่งมีการกำหนดรหัสของชนิดพันธุ์ที่แสดงในภาพตัวอย่าง ประกอบกับการสร้างตารางอธิบายและตารางแสดงรายละเอียดของชนิดพันธุ์ที่ปรากฏในภาพตัวอย่างเป็นตัวควบคุมและนำไปสู่การสืบค้น

บทที่ 3 ผลการศึกษา

BOTANICAL CLASSIFICATION SYSTEM OF THE KAREN

Vegetation is classified by the Karen at the level of:

- a) Individual plant type - each plant has a Karen name, which may have a prefix corresponding to ‘genus”, and a suffix corresponding generally to “species”. The suffix may be two or more words consisting of a noun and adjectives. Usually a plant is named for its visual characteristics. (see Table1.)
- b) Forest type / vegetation community. These are categorized by a combination of six criteria including: Moisture level, evergreen vs. deciduous nature, ecological processes occurring in that forest type, historical factors pertaining to land use, structure of the community, and species composition (Steinmetz, 1996¹). The Karen recognize three main forest types, each with numerous subtypes. The major types are: Wiah-per (Savanna Forest), Wah-glah (Mixed Deciduous Forest, Bamboo Forest), and Der-per (Semi-evergreen Forest).
- c) Vegetative habit i.e. tree, shrub etc. (see Table 2)

Table 1. Karen classification according to vegetative habit

พา/Pa	Epiphyte (Commensal,Parasitic)
มีอ/Meu	Woody climber/Liana
เทิง/Teung	Tree
เพาะ/ Paw (Short sound)	Shrub,Bamboo,Clumping,Vetgetation

¹ Steinmetz, R. 1996. Landscape ecology and wildlife habitats: an indigenous Karen perspective from Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary of western Thailand. Unpublished report to The Ford Foundation and Wildlife Fund Thailand.

Table 2. Karen classification of individual plants.

Habit	Example	Karen Name	“Genus”	“Species”
เผาะ/Paw	Bamboo(Bambusa gigantochlia)	วาผะ-ดุกกล้า/ Wah-Padu-leuh	วา/Wah	ผะดู่/Pa-du Translation: Padu = Big
เทิง/Teung	Savanna forest tree	เซชาโว ^{v178} / They-Tha-Wo	เซ/They	ชาโว/Tha-wo Translation: ชา/Tha = Fruit โว/Wo = Red
พา/Pa	Lygodium japonicum (Thumb.) Swartz.	ทู่ไก้คู ^{v48} /Tu-Ki-Ku	ทู่ไก้/Tu-Ki	คู/Ku Translation : Ku = Hot
มีอ/Meu	Paederia linearis Hook.f.	นองตุยอี อัว ^{v128} /Nong-Tui-e-Oua	นองตุยอี/ Nong-Tui-E	อัว/Oua Translation : Oua = White

3.1 การจำแนกพืชตามประเภทป่า

ตารางที่1 แสดงชนิดพืชที่สำรวจพบจำแนกตามประเภทป่า

พื้นที่ป่าที่ศึกษา	กลุ่มพืช								จำนวน	ร้อยละ
	มือ		เกาะ		เหิง		พา			
1.ป่าเตอ-เซกล่า	10	26.31	8	21.05	19	50	1	2.64	38	8.24
2.ป่าเวีย-เซกล่า	16	20.51	26	33.33	33	42.30	3	3.84	78	16.91
3.ป่าวากลือ-กล่า	23	25.0	26	28.26	42	45.65	1	1.08	92	19.95
4.ป่าเตอ-ทีโน	14	24.13	19	32.75	23	39.65	2	3.44	58	12.58
5.ป่าวาฆะดุก-กล่า	6	15.38	2	5.12	31	79.48	0	0	39	8.45
6.ป่าเตอ-เซ	13	35.13	4	10.81	17	45.94	3	8.10	37	8.02
7.ป่าเตอเซ-พุกล่า	1	4.54	3	13.63	18	81.81	0	-	22	4.77
8.ป่าเตอเบ-ไล่ กล่า	29	29.89	20	20.61	44	45.36	4	4.12	97	21.04
รวม	112		108		227		14		461	100

สรุป

จากตารางที่1 พบชนิดพืชต่างๆกระจายตามพื้นที่ป่าที่ศึกษา จากลักษณะการจำแนกกลุ่มพืชของคนกะเหรี่ยงทั้งหมด 461 ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มพืชเหิง จำนวน 227 ชนิด กลุ่มพืชมือจำนวน 112 ชนิด กลุ่มพืชเกาะจำนวน 108 ชนิด และกลุ่มพืชพาจำนวน 14 ชนิด ส่วนชนิดพันธุ์ที่กระจายตามพื้นที่ศึกษาพบว่า

1. ป่าเตอ-เบ-ไล่กล่า มีจำนวน 97 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 21.4 ของพืชที่พบทั้งหมด ซึ่งจำแนกเป็นกลุ่มมือ จำนวน 29 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 29.89 กลุ่มเกาะจำนวน 20 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 20.61 กลุ่มเหิงจำนวน 44 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 45.36 และกลุ่มพาจำนวน 4 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 4.12 ของชนิดพันธุ์ที่พบในป่าประเภทนี้
2. ป่าวากลือ-กล่า มีจำนวน 92 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 19.95 ของชนิดพืชที่พบทั้งหมด โดยจำแนกเป็นกลุ่มมือจำนวน 23 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 25.0 กลุ่มเกาะจำนวน 26 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 28.26 กลุ่มเหิงจำนวน 42 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 45.65 และกลุ่มพาจำนวน 1 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 1.08 ของชนิดพันธุ์ที่สำรวจพบในป่าประเภทนี้
3. ป่าเวีย-เชกล่า มีจำนวน 78 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 16.91 ของพืชที่สำรวจพบทั้งหมด โดยจำแนกเป็นกลุ่มมือ จำนวน 16 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 20.51 กลุ่มเกาะจำนวน 26 ชนิดพันธุ์คิดเป็นร้อยละ 33.33 กลุ่มเหิงจำนวน 33 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 42.30 และกลุ่มพาจำนวน 3 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 3.84 จากชนิดพันธุ์ทั้งหมดที่สำรวจพบในป่าประเภทนี้

4. ป่าเตอ-ทีน มีจำนวน 58 ชนิดพันธุ์คิดเป็นร้อยละ 12.58 ของพืชที่พบทั้งหมด โดยจำแนกเป็นกลุ่มมือ จำนวน 14 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 24.13 กลุ่มเกาะจำนวน 19 ชนิดพันธุ์คิดเป็นร้อยละ 32.75 กลุ่มเทิงจำนวน 23 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 39.65 กลุ่มพาจำนวน 2 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 3.44 จากชนิดพันธุ์ทั้งหมดที่สำรวจพบในป่าประเภทนี้

5. ป่าวณะดู-กล่า มีจำนวน 39 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 8.45 ของพืชของพืชที่สำรวจพบทั้งหมด โดยจำแนกเป็นกลุ่มมือ จำนวน 6 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 15.38 กลุ่มเกาะจำนวน 2 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 5.12 กลุ่มเทิงจำนวน 31 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 79.48 ของชนิดพันธุ์ทั้งหมดที่สำรวจพบในป่าประเภทนี้ ส่วนกลุ่มพาไม่ปรากฏชนิดพันธุ์ที่สำรวจพบ

6. ป่าเตอ-เซกล่า มีจำนวน 38 ชนิดพันธุ์คิดเป็นร้อยละ 8.24 ของชนิดพันธุ์พืชที่สำรวจพบทั้งหมด โดยจำแนกเป็นกลุ่มมือ จำนวน 10 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 26.31 กลุ่มเกาะ จำนวน 8 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 21.05 กลุ่มเทิงจำนวน 19 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 50 และกลุ่มพาจำนวน 1 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของชนิดพันธุ์ที่สำรวจพบในป่าประเภทนี้

7. ป่าเตอ-เซ มีจำนวน 37 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 8.02 ของพืชที่สำรวจพบทั้งหมด โดยจำแนกเป็น กลุ่มมือ จำนวน 13 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 35.13 กลุ่มเกาะ จำนวน 4 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 10.81 กลุ่มเทิง จำนวน 17 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 45.94 และกลุ่มพาจำนวน 3 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 8.10 ของชนิดพันธุ์ที่สำรวจพบในป่าประเภทนี้

8. ป่าเตอเซพู-กล่า มีจำนวน 22 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 4.77 ของพืชที่สำรวจพบทั้งหมด โดยจำแนกเป็นกลุ่มมือจำนวน 1 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 4.54 กลุ่มเกาะจำนวน 3 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 13.63 กลุ่มเทิงจำนวน 18 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 81.81 ของชนิดพันธุ์ที่สำรวจพบในป่าประเภทนี้ ส่วนกลุ่มพาไม่ปรากฏชนิดพันธุ์ที่สำรวจพบ

3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดพืชกับการใช้ประโยชน์

ตารางที่2 แสดงการจำแนกตามการใช้ประโยชน์แต่ละประเภทป่า

กลุ่มพืช	การใช้ประโยชน์										รวม
	อาหารคน		อาหารสัตว์ป่า		ยารักษาโรค		ใช้ในพิธีกรรม		ใช้ด้านอื่น		
มีอ	33	30.84	18	16.82	48	44.86	-	0	8	7.48	107
เผาะ	46	34.33	31	23.13	38	28.36	5	3.73	14	10.45	134
เทิง	64	34.33	31	23.13	38	28.36	5	1.84	68	25.09	271
พา	2	15.38	3	23.08	5	38.46	1	15.38	1	7.7	13
รวม	145	27.61	134	25.52	143	27.23	12	2.28	91	17.33	525

สรุป

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชนิดพันธุ์พืชกับการใช้ประโยชน์ ซึ่งจำแนกเป็นอาหารคน อาหารสัตว์ป่า ยารักษาโรค ใช้ในพิธีกรรม และใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่นเป็นเครื่องมือ ในกิจกรรมทางการเกษตร อีกทั้งพิจารณาประกอบกับกลุ่มพืชพบว่า

1. กลุ่มพืชที่เป็นอาหารคน มีจำนวน 145 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 27.61 ของพืชที่สำรวจพบทั้งหมด โดยจำแนกตามการใช้ประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย พืชในกลุ่มมีอจำนวน 33 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 30.84 กลุ่มเผาะจำนวน 46 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 34.33 กลุ่มเทิงจำนวน 64 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 23.62 และกลุ่มพาจำนวน 2 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 15.38

2. กลุ่มพืชที่เป็นอาหารสัตว์ป่า มีจำนวน 134 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 25.52 ของพืชทั้งหมด โดยจำแนกตามการใช้ประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย พืชในกลุ่มมีอ จำนวน 18 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 16.82 กลุ่มเผาะ จำนวน 31 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 23.13 กลุ่มเทิงจำนวน 18 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 16.82 กลุ่มเผาะจำนวน 31 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 23.13 กลุ่มเทิงจำนวน 82 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 30.26 และกลุ่มพาจำนวน 3 ชนิดพันธุ์คิดเป็นร้อยละ 23.08

3. กลุ่มพืชที่เป็นยารักษาโรค มีจำนวน 143 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 27.23 ของพืชทั้งหมด โดยจำแนกตามการใช้ประโยชน์ซึ่งประกอบด้วย พืชในกลุ่มมีอจำนวน 48 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 44.86 กลุ่มเผาะจำนวน 38 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 28.36 กลุ่มเทิงจำนวน 52 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 19.19 และกลุ่มพาจำนวน 5 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 38.46

4. กลุ่มพืชที่ใช้ในพิธีกรรม มีจำนวน 12 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 2.28 ของพืชทั้งหมด โดยการจำแนกตามการใช้ประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเผาะจำนวน 5 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 3.73 กลุ่มเทิงจำนวน 5 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 1.84 และกลุ่มพาจำนวน 2 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 15.38 ส่วนพืชในกลุ่มมีอไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์

5. พืชที่ใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ มีจำนวน 91 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 17.33 ของพืชทั้งหมดโดยการจำแนกตามการใช้ประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วยพืชในกลุ่มมือจำนวน 8 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 7.48 กลุ่มเผาะจำนวน 14 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 10.45 กลุ่มเหิงจำนวน 68 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 25.09 และกลุ่มพาจำนวน 1 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 7.7

3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่ากับชนิดของพืชที่ใช้เป็นอาหาร

ตารางที่3 ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่ากับชนิดของพืชที่ใช้เป็นอาหาร

ชนิดสัตว์ป่า	ชนิดพืชที่ใช้เป็นอาหาร								จำนวน
	มือ		เผาะ		เหิง		พา		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ช้างป่า	1	11.11	3	33.34	4	44.44	1	11.11	9
กระทิง	0	0	2	25.0	4	50.0	2	25.00	8
หมูป่า	2	10.53	7	36.84	10	52.63	0	0	19
เก้งฟาน/กวางป่า	0	0	2	12.5	12	75.0	2	12.5	16
หมีคน	2	15.38	2	15.38	9	69.24	0	0	13
เสียดผา	0	0	1	16.67	4	66.67	1	16.67	6
อีเห็น/เม่น	6	16.22	3	8.1	28	75.68	0	0	37
ไก่ฟ้า	0	0	2	40.0	3	60.0	0	0	5
ชะนี/ค่าง/ลิงกัง	6	18.75	4	12.5	22	68.75	0	0	32
กระรอก	3	20.0	3	20.0	9	60.0	0	0	15
กลุ่มนก	6	20.0	2	6.67	22	73.33	0	0	30
รวม	26		31		127		6		190

สรุป

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่ากับชนิดพันธุ์ของพืชที่ใช้ประโยชน์ พบว่า สัตว์ป่าที่คนกะเหรี่ยงสนใจ อย่างน้อย 12 ชนิดพันธุ์และกลุ่มนก มีการใช้ประโยชน์จากพืชจำนวน 190 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 41.21 จากพืชที่สำรวจพบทั้ง 8 ป่า จำนวน 461 ชนิดพันธุ์ โดยจำแนกเป็น

- 1. พืชในกลุ่มมือจำนวน 26 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 5.63 ของพืชที่พบทั้งหมด และร้อยละ 13.68 ของพืชทั้งหมดที่สัตว์ป่าใช้ประโยชน์
- 2. พืชในกลุ่มเผาะ จำนวน 31 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 6.72 ของพืชที่สำรวจพบทั้งหมด และร้อยละ 16.31 ของพืชที่สัตว์ป่าใช้ประโยชน์

3. พืชในกลุ่มเหิง จำนวน 127 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 27.54 ของพืชที่สำรวจพบทั้งหมด และร้อยละ 66.84 ของพืชที่สัตว์ป่าใช้ประโยชน์

4. พืชในกลุ่มพา จำนวน 6 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของพืชที่สำรวจพบทั้งหมด และร้อยละ 3.15 ของพืชที่สัตว์ป่าใช้ประโยชน์

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่ากับการใช้ประโยชน์จากพรรณพืชที่สำรวจพบในป่าประเภทต่างๆ พบว่า สัตว์ป่าจำนวนอย่างน้อย 13 ชนิดพันธุ์และสัตว์ป่ากลุ่มนก มีการใช้ประโยชน์จากพืชที่สำรวจพบโดยจำแนกเป็นสัตว์ประเภทต่างๆดังนี้

1. ช้างป่า (*Elephas maximus*) มีการใช้ประโยชน์จากพืชที่สำรวจพบจำนวน 9 ชนิดพันธุ์ จากพืชในกลุ่มมือจำนวน 1 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 11.11 กลุ่มเผาะจำนวน 3 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 33.34 กลุ่มเหิงจำนวน 4 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 44.44 และกลุ่มพาจำนวน 1 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของพืชทั้งหมดที่ช้างป่าใช้เป็นอาหารจากพืชที่สำรวจพบ

2. กระตัง (*Bos gaurus*) มีการใช้ประโยชน์จากพืชที่สำรวจพบจำนวน 8 ชนิดพันธุ์ จากพืชในกลุ่มเผาะจำนวน 2 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 25.0 กลุ่มเหิงจำนวน 4 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 50.0 และกลุ่มพาจำนวน 2 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของพืชทั้งหมดที่กระตังใช้เป็นอาหารจากพืชที่สำรวจพบ ส่วนพืชในกลุ่มมือไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์

3. หมูป่า (*Sus scrofa*) มีการใช้ประโยชน์จากพืชที่สำรวจพบจำนวน 19 ชนิดพันธุ์ จากพืชในกลุ่มมือจำนวน 2 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 10.53 กลุ่มเผาะจำนวน 7 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 36.84 และกลุ่มเหิงจำนวน 10 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 52.63 ของพืชทั้งหมดที่หมูป่าใช้เป็นอาหารจากพืชที่สำรวจพบ ส่วนพืชในกลุ่มพาไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์

4. เก้งฟาน/กวางป่า (*Muntiacus muntjak/Cervus unicolor*) มีการใช้ประโยชน์จากพืชที่สำรวจพบจำนวน 16 ชนิดพันธุ์ จากพืชในกลุ่มเผาะจำนวน 2 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 12.5 กลุ่มเหิงจำนวน 12 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 75 และกลุ่มพาจำนวน 2 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของพืชทั้งหมดที่เก้งฟาน/กวางป่าใช้เป็นอาหารจากพืชที่สำรวจพบ ส่วนพืชในกลุ่มมือไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์

5. หมีคน (*Helarctos malayanus*) มีการใช้ประโยชน์จากพืชที่สำรวจพบจำนวน 13 ชนิดพันธุ์ จากพืชในกลุ่มมือจำนวน 2 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 15.38 กลุ่มเผาะจำนวน 2 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 15.38 และกลุ่มเหิงจำนวน 9 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 69.24 ของพืชทั้งหมดที่หมีคนใช้เป็นอาหารจากพืชที่สำรวจพบ ส่วนพืชในกลุ่มพาไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์

6. เลียงผา (*Capricornis sumatrensis*) มีการใช้ประโยชน์จากพืชที่สำรวจพบจำนวน 6 ชนิดพันธุ์ จากพืชในกลุ่มเผาะจำนวน 1 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 16.67 กลุ่มเหิงจำนวน 4 ชนิด

พันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 66.67 และกลุ่มพาจำนวน 1 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของพืชทั้งหมด ที่เลี้ยงมาใช้เป็นอาหารจากพืชที่สำรวจพบ ส่วนพืชในกลุ่มมือไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์

7. อีเห็น (วงศ์ Viverridae ไม่สามารถระบุ Species) มีการใช้ประโยชน์จากพืชที่สำรวจพบจำนวน 37 ชนิดพันธุ์ จากพืชในกลุ่มมือจำนวน 6 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 16.22 กลุ่มเผาะจำนวน 3 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 8.1 และกลุ่มเทิงจำนวน 28 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 75.68 ของพืชทั้งหมดที่อีเห็นใช้เป็นอาหารจากพืชที่สำรวจพบ ส่วนพืชในกลุ่มพาไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์

8. ไก่ฟ้าหลังเทา (Lophura leucomelanos) มีการใช้ประโยชน์จากพืชที่สำรวจพบจำนวน 5 ชนิดพันธุ์ จากพืชในกลุ่มเผาะจำนวน 2 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 40 และกลุ่มเทิงจำนวน 3 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 60 ของพืชทั้งหมดที่ไก่ฟ้าหลังเทาใช้เป็นอาหารจากพืชที่สำรวจพบ ส่วนพืชในกลุ่มมือและพาไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์

9. ชะนี/ค้างคาว/ลิงกัง (วงศ์ Hylobatidae ไม่สามารถระบุ Specie/วงศ์ Cercopithecidae ไม่สามารถระบุ Specie/M.memestrina) มีการใช้ประโยชน์จากพืชที่สำรวจพบจำนวน 32 ชนิดพันธุ์ จากพืชในกลุ่มมือจำนวน 6 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 12.22 กลุ่มเผาะจำนวน 4 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 12.5 และกลุ่มเทิงจำนวน 22 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 68.75 ของพืชทั้งหมดที่ชะนี/ค้างคาว/ลิงกัง ใช้เป็นอาหารจากพืชที่สำรวจพบ ส่วนพืชในกลุ่มพาไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์

10. กระรอก (วงศ์ Sciuridae ไม่สามารถระบุ Specie) มีการใช้ประโยชน์จากพืชที่สำรวจพบจำนวน 15 ชนิดพันธุ์ จากพืชในกลุ่มมือจำนวน 3 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 20 กลุ่มเผาะจำนวน 3 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 20 และกลุ่มเทิงจำนวน 9 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 60 ของพืชทั้งหมดที่กระรอกใช้เป็นอาหารจากพืชที่สำรวจพบ ส่วนพืชในกลุ่มพาไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์

11. กลุ่มนก (Birds) มีการใช้ประโยชน์จากพืชที่สำรวจพบจำนวน 30 ชนิดพันธุ์ จากพืชในกลุ่มมือจำนวน 6 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 20 กลุ่มเผาะจำนวน 2 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 6.67 และกลุ่มเทิงจำนวน 22 ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของพืชทั้งหมดที่นกใช้เป็นอาหารจากพืชที่สำรวจพบ ส่วนพืชในกลุ่มพาไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์

นอกจากนั้นสัตว์ป่าประเภทกินเนื้อเป็นอาหารถึงแม้ว่าไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์จากพืชแต่อย่างไรก็ดีพบว่า ได้ประโยชน์จากป่าประเภทต่างๆ ที่ทำการสำรวจด้วยเช่นกัน แต่อยู่ในรูปของการติดตามกลุ่มสัตว์ดังที่ได้เสนอในข้างต้นเข้ามาในป่าประเภทต่างๆ ในลักษณะของผู้ล่า (Predator) เช่น เสือ ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ในทุกฤดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผลไม้ป่าสุก อันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สัตว์ป่าประเภทกินพืชเป็นอาหารเข้ามาใช้

ประโยชน์อย่างหนาแน่น อีกทั้งเมื่อพิจารณาในด้านพฤติกรรมของสัตว์ป่าประเภทต่างๆในการใช้ประโยชน์จากป่าที่ทำการศึกษาก็พบว่าสัตว์ป่าหลายประเภทมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปในการอาศัยป่าประเภทที่ศึกษานั้น ทั้งในแง่ของการเข้ามาเพื่อหลบภัย เช่น สัตว์ประเภทที่เป็นอาหารของสัตว์ผู้ล่า (Predator) เช่น เก้ง กวาง หรือเข้ามาเพื่อผสมพันธุ์ เช่น กระตัง หรือเข้ามาเพื่ออาศัยแหล่งน้ำในฤดูแล้ง เช่น ช้าง เป็นต้น

ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดรายชื่อพืชที่ปรากฏในตัวอย่างภาพและการกำหนดรหัส

รหัส (V)	ประเภทป่า(F)/กลุ่มพืช(K)	การใช้ประโยชน์(E)	ชื่อพืช
v1	F1 / K3	-	เตยพู่
v2	F1 F3 / K3	E2	เตยพู่
v3	F1 / K1	E1	หมี่ปื๋อของที
v4	F1 F2 / K2	E3	ปีเลียว
v5	F1 F3 / K3	E5	เตยหย่งชะ
v6	F1 / K3	E2	กุวาเกอเรียง
v7	F1 / K4	E1 E2 E3	โล่คุกกล้า
v8	F1 F2 / K4	E2 E3	วองอ้ว
v9	F1 F7 / K2	E2 E3 E5	ไช่บ่ง
v10	F1 / K3	E3	เตยกุยซ่ง
v11	F1 F3 F4 F5 / K1	E3	เนหม่องยะ
v12	F1 / K2	E2 E5	วาจั่ว
v13	F1 / K1	E3	จ๋อง
v14	F1 / K1	E1	พะยาใต้คอง
v15	F1 / K2	E2	สะเคาะเนอ
v16	F1 / K1	E1 E3	ต๋องซ่ง
v17	F1 / K3	E1 E2 E5	กุงบ่อง
v18	F1 / K3	E1 E2 E5	กุหม่องหม่วยกะ
v19	F1 / K3	E1 E3	เพ่อชะไซ
v20	F1 / K2	E3	คาไค้อ้ว
v21	F1 / K3	E3	ต๋องกะเมือ
v22	F1 / K2	E1 E2	พุกุ่ก่อง
v23	F1 F3 / K2	E2 E3 E4	ไก่อ
v24	F1 F3 F4 / K2	E3	นองเซเปด
v25	F1 / K2	E1 E3	คว้ายเหม
v26	F1 / K2	E2 E3	พุกาว่อง
v27	F1 / K1	E3	จ๋องกะเหล่อไหว

v28	F1 / K3	E5	สะถ่อ
v29	F1 / K2	E1 E2	ฤทธิหมีชุย
v30	F1 F7 / K1	E1 E2	พุกวยมีทะ
v31	F1 F2 / K1	E1	เนเหม
v32	F1 / K1	E1	มีดี
v33	F1 / K1	E3	พุซ่องกุ
v34	F1 F4 / K3	E1 E2	กวากิ
v35	F1 / K3	E2 E3	อีไ่อ
v36	F1 / K2	E1 E2 E3	ชวยไถ่ที่
v37	F1 / K3	E1	ผะค่อ
v38	F1 / K2	E2	ชีไหล่ทะ
v39	F1 / K2	E3	ไก่คุดุหย่ง
v40	F1 / K3	E3	ทุยบาม่อง
v41	F1 F2 F4 / K3	E3	สะซุ
v42	F2 / K1	E1	จะไล่
v43	F2 / K3	E5	เปื่อนาคองมี
v44	F2 / K2	E3	ชีเฉาะเขลาะ
v45	F2 / K2	E3	เซซ่องพุ
v46	F2 / K2	E3	พุซ่องเกาะ
v47	F2 / K2	E3 E5	ซ่องหริ่มือเม่
v48	F2 F4 / K1	E3 E5	ทู่ไก่คุดุ
v49	F2 / K2	E3	ไฟ่จิริ
v50	F2 / K3	E2 E3 E5	เมื่อยเผื่อเลอะ
v51	F2 / K3	E3	นองป่อง
v52	F2 / K3	E3	ลู่ลัด
v53	F2 / K3	-	เซอ้วไฟ่
v54	F2 F4 F6 F7 / K2	-	ชีซุ
v55	F2 / K2	E3	ไฟ่ทูกุโหว่
v56	F2 F4 F8 / K3	E2	กุกิ
v57	F2 F4 / K3	E1 E2 E5	ไซงค่ง

v58	F2 F4 / K1	-	พลามือ
v59	F2 F3 / K2	E5	ซังลาอะ
v60	F2 F4 F5 / K2	E1 E2	วากลือ
v61	F2 F4 / K3	E3 E5	เปอะเตาะ
v62	F2 / K1	E3	หละเหม
v63	F3 / K2	E2	สะบ้ำเวีย
v64	F3 / K1	E3	ตชีคาพู
v65	F3 / K1	E3	ยาลิมือชา
v66	F3 / K3	E3	ฉ่ดเขะน่ ามอง
v67	F3 / K2	E3	หล่งฉิมอ
v68	F3 / K3	E2	เซกะช่องออง
v69	F3 F4 / K2	E1	พูลี
v70	F3 / K3	-	เกวหย่ง
v71	F3 / K2	E1 E2 E3	พูไซล่ที่
v72	F3 / K2	-	กลือชา
v73	F3 / K2	E3	พูเหล่อปา
v74	F3 / K3	E2 E5	กลีโหว่
v75	F3 / K1	-	ทิ
v76	F3 / K1	E3	หล่องเหม
v77	F3 / K1	-	เหมฆองมือ
v78	F3 / K1	E3	ไซว่หย่ง
v79	F3 / K2	E1	พูเส่อ
v80	F3 / K2	-	เขอะด่องซ่ง
v81	F3 / K2	-	ไซโหว่
v82	F3 / K2	E3	กลือชา
v83	F3 F4 / K3	E3 E5	มือมือคว่ำคว่ำ
v84	F3 / K1	-	คล่า
v85	F3 / K3	E3	ตำมล่อง
v86	F3 / K2	E2	พูชะมือ
v87	F3 / K1	E1 E2 E3	ด่องหะ

v88	F3 / K3	E2	เซ็กกีพู
v89	F3 / K3	E3	หรงฉัด ๑
v90	F3 / K1	E1	สะนีว้าว
v91	F3 / K3	E2 E3	นองชา
v92	F3 / K2	-	ชีเลื่อผลิที่
v93	F3 / K2	-	ตชีชะโหว่มี
v94	F3 F4 / K3	E1 E5	ไซว
v95	F3 / K2	E3	เหม่ปี้
v96	F3 / K3	E1 E3	เพ่อชะไซ
v97	F3 / K3	E1	หยี่ไหล
v98	F3 / K2	E1	อั่วล่องพู
v99	F3 / K3	E3	ไฟค์จ่อง
v100	F3 / K3	-	จ่องปี้เหลอเค่
v101	F3 / K3	-	ไฟค์
v102	F3 / K3	E3 E5	ปะพูย
v103	F3 / K3	-	หละซูเหม่
v104	F3 / K1	E3	ต่งตะเหล่อ
v105	F3 F5 / K4	E2	วอง
v106	F3 / K3	E2	ปี้ล่อง
v107	F3 / K3	-	เซอองกั้ว
v108	F3 / K2	-	นำดุ
v109	F3 F5 / K2	E1	ผู้อั่ว
v110	F3 / K3	E1 E2	คั่ง
v111	F3 / K2	E1 E3	พูไกคู้
v112	F4 / K2	E2	นองเวีย
v113	F4 / K3	E3	ไซ่งที่
v114	F4 / K1	E3	เจอะสะไว้
v115	F4 / K1	E3	โค่วเหม่
v116	F4 / K3	E3	มุ่ม
v117	F4 / K3	E5	เปื่อนาคองมี

v118	F4 / K3	E1	ไฟเฒ่
v119	F4 / K1	E1 E3	พู่ฉั้ว
v120	F4 / K3	E1 E2	สงชี
v121	F4 / K2	E1 E2	พู่ยู่เอ่
v122	F4 / K3	E1 E2 E3	นองชะ
v123	F4 / K1	E1 E3	ชีขละอัวยุ
v124	F4 / K1	E3 E5	ไปจจี้
v125	F4 / K1	E3	กล่งไค่ง
v126	F4 / K1	E3	ตงตะลง
v127	F4 / K3	E2 E3	เกอซ่ง
v128	F4 / K1	E3	นองทุยอี่อัว
v129	F4 / K3	E2 E3	เคิง
v130	F4 / K3	E3 E5	เอ่อเนา
v131	F4 / K1	E2 E3	คลี
v132	F4 / K3	E1	เซนองเอ่
v133	F4 / K3	E1	ไบปิ
v134	F4 / K3	E5	เฉาะเราะ
v135	F4 F5 / K3	E1	อัวคุด
v136	F4 / K1	E1	พริอทิไ้
v137	F4 / K3	E5	หรงฉี
v138	F4 / K1	E1	ถูไค่
v139	F4 / K2	E1	ยะพล่า
v140	F4 / K1		ชีบาเกาะ
v141	F4 / K2	E1	เอไซ
v142	F4 / K2	E1 E3	เกียวม่ง
v143	F4 / K1	E3	เหม่มองมือ
v144	F4 / K3	E2 E3	เหมโหยไ้
v145	F4 / K1	E1	เนจุ
v146	F4 / K3	E1	เหมิงเวิงมิ
v147	F4 / K1	E1	ดะบองมือ

v148	F4 / K3	E2 E3	เสื่อโย
v149	F4 / K3	E5	มือชาเขยเทิง
v150	F4 / K3	E3	พิดุซ่าเป
v151	F4 / K2	E3	เค
v152	F4 / K1	E3	ชีคา
v153	F4 / K1	E3	กล่งอ้วมือ
v154	F4 / K2	E3	นองเบอะไซ
v155	F4 / K3	E2 E3	กูลี
v156	F4 / K2	E1 E2 E3	ชุยไล่
v157	F4 / K1	E3	ชีช่วยบ่อง
v158	F4 / K3	E3	ชีขละนองเพ
v159	F4 / K3	E3	ทะไมบ่อง
v160	F4 / K2	E4	ไฟหล่าเขาอะ
v161	F4 / K3	E3 E5	เหมปี
v162	F4 / K3	E2	เซอองกว่า
v163	F4 / K1	E1	ชีขละโพล
v164	F4 / K3	-	เซงบงอึ่ง
v165	F4 / K2	-	พูซ่องชี
v166	F4 / K2	-	พูเซอเจิง
v167	F4 / K2	-	ทองมือ
v168	F5 / K2	E5	ไซปง
v169	F5 / K1	E1 E3	กล่งเค่อว
v170	F5 / K3	-	เซทอลา
v171	F6 / K3	E1	กูลี
v172	F7 / K1	E5	ดองกะโม
v173	F7 / K1	-	เกรียวเจิงมวย
v174	F7 / K3	-	เซยอ้วลา
v175	F7 / K3	E5	เซเซอไชวโน
v176	F7 / K3	E1	ละหม่งเย
v177	F7 / K1	E5	เซอก่องกะ

v178	F7 / K3	E2	เมหะ
v179	F7 / K1	-	ไล่จุมเด้ง
v180	F7 / K1	-	เซยโกวโกว
v181	F7 / K3	E2 E5	จื่อ
v182	F7 / K3	E4 E5	เซวาลา
v183	F7 / K3	E1	วะพูไ้
v184	F7 / K3	-	เซยพ่องบ่ง
v185	F7 / K3	E1 E3	ทะเช่า
v186	F8 / K3	E5	ไฟูกจ่อง
v187	F1 / K3	E4	ไฟิดค่า
v188	F1 / K3	-	ของอีหย่ง
v189	F4 / K2	E1 E3	พูซ่องซ้อง

บทที่ 4 บทสรุป

4.1 วิจารณ์ผลการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกะเหรี่ยงกับการใช้ประโยชน์จากพืชป่า

จากผลการศึกษาที่พบว่า มีจำนวนตัวอย่างพืชที่สำรวจพบ จำนวน 461 ชนิดพันธุ์ ที่ระบุการใช้ประโยชน์ของทั้งคนและสัตว์ตามการจำแนกของคนกะเหรี่ยง จากพื้นที่สำรวจจำนวน 8 แหล่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของพื้นที่สำรวจทั้งหมด จำนวน 41 แหล่งนั้น เมื่อพิจารณาในแง่การใช้ประโยชน์ซึ่งไม่รวมประโยชน์ที่สัตว์ป่าได้รับ ที่พบว่ามีไม่น้อยกว่า 391 ชนิดที่คนกะเหรี่ยงรู้จักการใช้ประโยชน์ หากแต่ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า ในแต่ละชนิดพืชที่คนกะเหรี่ยงใช้ประโยชน์ได้นั้น มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางนิเวศเป็นอย่างดี จึงทำให้เกิดกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อบังคับทางสังคมของคนกะเหรี่ยงในการควบคุมไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์เกินขอบเขตที่ธรรมชาติจะรับได้ จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแต่อย่างใด ผนวกกับเมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ปรากฏตามเอกสารการบันทึกการใช้ประโยชน์แล้วกลับพบว่า พฤติกรรมการใช้ประโยชน์ของคนกะเหรี่ยงตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 200 ปีของการตั้งถิ่นฐานในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแห่งนี้นั้น การใช้ประโยชน์เป็นไปในลักษณะเพื่อยังชีพ และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทั้งหมดก็เป็นการใช้ทางอ้อมที่ไม่ได้ทำลายเนื้อไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศ (Non-Timber Product) แต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามการที่คนกะเหรี่ยงได้ทดลองการใช้ประโยชน์จากพืชแต่ละชนิดมาเป็นระยะเวลาอันนานจนกลายเป็นองค์ความรู้ของพืชที่ใช้ประโยชน์ได้นั้น นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำรงการใช้ประโยชน์เหล่านั้นให้เกิดขึ้นต่อไปตามกลไกการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนผ่านถ่ายทอดด้วยวิธีการต่างๆ ให้การใช้ประโยชน์ได้ดำรงอยู่ ซึ่งจะเป็นการสร้างกระบวนการผลิตซ้ำทางความคิด (Reproduction of knowledge) เพื่อให้ความรู้ในแต่ละเรื่องเหล่านั้นได้ดำรงอยู่ต่อไป

องค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของคนกะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

ผลสำเร็จในความพยายามของโครงการที่ต้องการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจต่อศาสตร์ที่ว่าด้วยองค์ความรู้ของคนพื้นเมือง (Indigenous Knowledge ; IK) กับกรณีศึกษาจากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Action Research) ในครั้งนี้ ทำให้เกิดข้อสรุปอย่างเด่นชัดเป็นอย่างยิ่งว่า แบบแผนการใช้ประโยชน์ด้านพฤกษศาสตร์ของคนพื้นเมืองนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการเอากการใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้ง หากแต่เป็นเรื่องการสังเกตด้วยระยะเวลาอันยาวนานและทดลองใช้จนเกิดเป็นความรู้ที่มีค่าและเป็นประโยชน์ต่อการดำรงอยู่ของชุมชนไปพร้อมกันกับการพยายามที่จะใช้ประโยชน์ในแง่การปรับตัวให้สอดคล้องกับระดับการใช้ประโยชน์ ที่ยังคงรักษาสภาพนิเวศและ

ชนิดพันธุ์เหล่านั้นไว้ต่อไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ในการจัดกลุ่มพืชเป็นกลุ่มต่างๆ (Classification) และการจำแนก (Identification) ได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งการพบว่าในจำนวนของตัวอย่างพืชที่เก็บได้ทั้งหมดนั้น คนกะเหรี่ยงสามารถจำแนกความแตกต่างและการระบุชื่อได้หมดทุกตัวอย่าง ถึงแม้ว่าบางชนิดจะไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ก็ตาม ยิ่งทำให้เกิดข้อสรุปในระดับหนึ่งอีกว่าหากทำการศึกษาต่อไปถึงป่าประเภทอื่นๆ ที่มีการจำแนกประเภทไว้โดยกระบวนการศึกษาแบบเดียวกันนี้อีกต่อไปคงทำให้เกิดข้อสรุปในลักษณะเดียวกันที่ว่าสามารถจำแนกประเภท กลุ่มพืช และชนิดพันธุ์ได้เช่นเดียวกัน

ความเข้าใจในกระบวนการทางนิเวศของชุมชนกะเหรี่ยง

ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการเกษตรเพื่อยังชีพในระบบเกษตรกรรมแบบไร่หมุนเวียน (Rotation Shifting Cultivation Agriculture System) ของคนกะเหรี่ยงที่ต้องอาศัยการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เอื้ออำนวยให้เกิดปริมาณน้ำและการใช้ที่ดินที่เหมาะสมกับการผลิต กับผลการศึกษาที่สามารถระบุถึงองค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่ากับการใช้ประโยชน์จากพืชที่สำรวจพบ ได้สะท้อนให้เห็นว่าภาพวิถีชีวิตของคนกะเหรี่ยงในรอบปีทั้งที่ต้องอยู่ในภาคการเกษตรไม่น้อยกว่า 11 เดือน และการใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะที่ต่างกันอย่างน้อย 1 เดือนในรอบปีนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศแต่อย่างใด ซึ่งในประเด็นนี้น่าจะนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่า “คนกะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางนิเวศที่มีการปรับตัวระหว่างธรรมชาติและมนุษย์มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 200 ปีจนเกิดการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนในลักษณะที่สอดคล้องกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ”

กระบวนการมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่นต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

องค์ความรู้ที่เป็นผลจากการศึกษาของโครงการนี้ที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าผลของข้อมูลในเชิงปริมาณของชนิดพันธุ์ที่สำรวจในเบื้องต้นพบ ซึ่งได้แก่รูปแบบการประยุกต์วิธีวิทยา (Methodology) ให้มีความสอดคล้องกันเกิดขึ้นจนเป็นรูปแบบที่สามารถนำไปสู่การหาข้อสรุปและการใช้ประโยชน์ร่วมกันในผลการศึกษาได้ระหว่างนักวิจัยและคนพื้นเมืองโดยเฉพาะคนกะเหรี่ยงที่มีข้อจำกัดในเรื่องการรับรู้และความแตกต่างในเรื่องภาษาและภูมิหลังที่มากกว่าชาวบ้านที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ (Protected Area) ในพื้นที่อื่นๆ ได้สร้างแบบจำลองถึงความพยายามในการสร้างความร่วมมือและการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเมื่อเกิดการสร้างฐานความเข้าใจเบื้องต้นได้ การพัฒนาในขั้นตอนต่อไปก็น่าจะเป็นไปได้เช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในแง่ความยั่งยืนของโครงการที่จะเกิดขึ้นภายหลังที่โครงการสิ้นสุด

สุด เมื่อแบบจำลองอันเดียวกันนี้เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก ความต่อเนื่องของโครงการจึงเกิดขึ้นได้และมีตัวอย่างที่คนกะเหรี่ยงใช้วิธีการอันเดียวกันนี้ประสานงานเพื่อให้เกิดการทำกิจกรรมกันเอง ซึ่งคุณูปการจากโครงการศึกษาวิจัยครั้งนี้น่าจะได้เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญของการเกิดโครงการในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนี้กับพื้นที่อื่นต่อไป

4.2 ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการแสวงหาความร่วมมือกับคนท้องถิ่นในการอนุรักษ์

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าผลการศึกษาในครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ทุกประการ หากแต่เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของการอนุรักษ์แล้วจะเห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงบางประเด็นของคนกะเหรี่ยงที่วาดด้วยองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และความเกี่ยวเนื่องกับสัตว์ป่าบางประเภทเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงผลที่ได้รับในเบื้องต้นนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนารายละเอียด วิธีการ และเนื้อหา ในขั้นต่อไปอย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดเป็นรูปแบบและกระบวนการที่สมบูรณ์ขึ้นได้ และยังเป็นความต้องการของคนกะเหรี่ยงที่เรียกร้องถึงการพัฒนาองค์ความรู้อยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งหากมีการลำดับความสำคัญในประเด็นอื่นๆ และมีการพัฒนาเทคนิควิธีการที่ยืนอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมในลักษณะเดียวกันนี้ต่อไปก็น่าที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากงานศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้เพื่อแสวงหาคำตอบในเชิงนโยบายซึ่งจะเป็นผลดีกับคนกะเหรี่ยงในพื้นที่และผลสำเร็จต่อการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเช่นกัน

ผลการศึกษากับประโยชน์ในเชิงการจัดการ

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 2,600 ตารางกิโลเมตร หรือไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่ เมื่อพิจารณาในเชิงการจัดการที่แม้ว่าพื้นที่นี้จะถูกให้ความสำคัญในการประกาศจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก (Natural World Heritage Site) แต่ในความเป็นจริงข้อจำกัดในหลายประการของระบบการอนุรักษ์และการจัดการพื้นที่ก็ยังดำรงอยู่ ทั้งในเรื่องงบประมาณ บุคลากร เป็นต้น ทางออกประการหนึ่งภายใต้ข้อจำกัดดังที่ได้กล่าวแล้วในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการที่เป็นอยู่ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น น่าจะได้แก่การเปิดโอกาสให้คนพื้นเมืองเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในเรื่องการจัดทำแผนการอนุรักษ์ที่จำเป็นจะต้องผสมผสานองค์ความรู้ของทั้งจากคนพื้นเมือง มาตรการทางกฎหมาย และเทคนิควิธีการที่จะเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เข้าด้วยกันและก่อให้เกิดการเฝ้าระวังและการติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยกัน กรณีคนกะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรที่มีความขัดแย้งในเรื่องการแสวงหาทางออกในด้านนโยบายที่จะนำไปสู่ทางออกที่ยั่งยืนระหว่างการดำรงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและการดำรงอยู่ของคนพื้นเมือง ซึ่งใน

สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันที่เปิดโอกาสในทางกฎหมายอย่างสูงในการให้การยอมรับการจัดการทรัพยากรของคนในพื้นที่ ดังนั้นหากผลที่ได้จากโครงการนี้จะนำไปสู่ความพยายามในการเข้าใจวิถีชีวิตของคนกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่น้อยต่อการเข้าใจธรรมชาติ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและความเข้าใจด้านองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ เป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์เป็นแผนการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมที่เอื้ออำนวยให้คนกะเหรี่ยงได้แสดงออกถึงกิจกรรมอนุรักษ์ ก็จะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนและนำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการในขั้นตอนต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับชนเผ่าพื้นเมืองในเรื่องการเคารพสิทธิและภูมิปัญญาในระบบคุณค่าของการดำรงอยู่มากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่กรณีของ UNESCO ในคณะกรรมการว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองพื้นที่มรดกโลกเองก็ให้ความสำคัญต่อคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มรดกโลกเช่นกัน จนได้ประกาศสถานภาพมรดกโลกประเภทที่ 3 ขึ้น จาก Cultural World Heritage Site หรือพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม และ Natural World Heritage Site เป็นมรดกโลกประเภทใหม่ที่เรียกว่า Cultural Landscape World Heritage Site และมีกรณีตัวอย่างในประเทศภาคีสัญญาที่ได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพพื้นที่มรดกโลกไปแล้วด้วยเหตุผลที่ให้ความสำคัญต่อคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อนการประกาศเป็นเขตมรดกโลก ดังนั้นในกรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่น้อยก็เช่นกัน มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้นำไปเป็นประเด็นการหารือในเชิงนโยบาย ด้วยเหตุผลสนับสนุนจากผลการศึกษาที่ประกอบใน World Heritage Nomination เพื่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพดังที่ได้กล่าวแล้วต่อไป

แนวทางในการปกป้ององค์ความรู้ของคนพื้นเมือง

สมมติฐานที่มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระดับการรับรู้ในเรื่ององค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของคนกะเหรี่ยง ก็คือเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป การสูญเสียองค์ความรู้ก็จะยิ่งมีมากขึ้นจนในที่สุดอาจส่งผลให้ Generation ต่อๆ ไปของคนกะเหรี่ยงจะมีระดับความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่น้อยลง ทั้งนี้ก็จากข้อมูลในเชิงประจักษ์ที่พบว่า ปัจจุบันเจ้าหลายประการที่เป็นเงื่อนไขจากสังคมภายนอกทั้งในเรื่องนโยบายด้านต่างๆ ของรัฐ เช่นในเรื่องการศึกษา การสาธารณสุข ที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานชีวิตที่พึงพาทรัพยากรภายนอกเช่น ความรู้จากสังคมใหญ่หรือเวชภัณฑ์จากการผลิตภายนอกเพียงด้านเดียวจะเป็นตัวเร่งให้ระดับของการสูญเสียจากการพึ่งพาภายนอกเพิ่มมากขึ้น หรือแม้แต่การบริโภคกระแสดังกล่าวที่อาจกระตุ้นผ่านการพัฒนาของหน่วยงานในระดับต่างๆ ส่งผลกระทบถึงองค์ความรู้ในด้านพฤกษศาสตร์จนสูญเสียเสถียรภาพที่จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงอยู่ซึ่งชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มนี้ ดังนั้นเมื่อความสำคัญดังบริบทของงานวิจัยครั้งนี้ได้สนับสนุนให้ปรากฏอย่างเด่นชัดแล้วว่าองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของชุมชนกะเหรี่ยงมีความสำคัญและนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป ดังนั้น

ทางเลือกประการสำคัญในการอนุรักษ์องค์ความรู้ให้ดำรงอยู่ในลักษณะที่ไม่ใช่เพียงการบันทึกแต่ปรากฏอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนกะเหรี่ยง จึงน่าจะมีทางออกในการป้องกันกิจกรรมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อในทุกวิถีทาง โดยเฉพาะหากเมื่อเกิดกิจกรรมในลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อผลกระทบฉับพลันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียองค์ความรู้ เช่น นโยบายการย้ายคนกะเหรี่ยงออกจากพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร กิจกรรมทางนโยบายที่รว่านั้นน่าจะมีการศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์ความรู้ในระดับที่เท่าเทียมกันกับการศึกษาผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมก่อนการตัดสินใจดำเนินงานตามนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเหล่านั้น

ตารางแสดงการกำหนดรหัส (CODE)แทนประเภทป่า

ประเภทป่า(FOREST TYPE)	รหัส (CODE)
1.ป่าเต็งเบ-ไผ่กล้า	F1
2.ป่าเต็ง-เข็กกล้า	F2
3.ป่าเหียง-เข็กกล้า	F3
4.ป่าวากลิ้ง-กล้า	F4
5.ป่าเต็ง-ทีโน	F5
6.ป่าวามะตู-กล้า	F6
7.ป่าเต็ง-เซ	F7
8.ป่าเต็งเซพู-กล้า	F8


ตารางแสดงการกำหนดรหัสแทนลักษณะกลุ่ม-ประเภทพืช

กลุ่ม/ประเภทพืช(KIND)	รหัส (CODE)
1.ไม้	K1
2.พื้	K2
3.เหิง	K3
4.พ	K4

ตารางแสดงการกำหนดรหัสแทนการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์	รหัส (CODE)
1.อาหารคน	E1
2.อาหารสัตว์ป่า	E2
3.สมุนไพร/ยารักษาโรค	E3
4.ใช้ในพิธีกรรม	E4
5.ใช้ด้านอื่นๆ	E5

ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ




V1 F1 K3



V2 F1F3 K3E2




V3 F1 K1E1



V4 F1F2 K2E3




V5 F1F3 K3E5



V6 F1 K3E2



V7 F1 K4E1E2E3



V8 F1F2 K4E2E3



V9 F1F7 K2E2E3E5

ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ



V10 F1 K3E3




V11 F1F3F4F5 K1E3



V12 F1 K2E2E5



V13 F1 K1E3



V14 F1 K1E1



V15 F1 K2E2



V16 F1 K1E1E3



V17 F1 K3E1E2E5



V18 F1 K3E1E2E5


ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ



V19 F1 K3E1E3



V20 F1 K2E3



V21 F1 K3E3




V22 F1 K2E1E2



V23 F1F3 K2E2E3E4




V24 F1F3F4 K2E3



V25 F1 K3E1E3



V26 F1 K2E2E3




V27 F1 K1E3


ภาพถ่ายอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ



V28 F1 K3E5



V29 F1 K1E1E2



V30 F1F7 K1E1E2




V31 F1F3 K1E1




V32 F1 K1E1




V33 F1 K1E3



V34 F1F4 K3E1E2



V35 F1 K3E2E3




V36 F1 K2E1E2E3

ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ



V37 F1 K3E1




V38 F1 K2E2



V39 F1 K2E3




V40 F1 K3E3



V41 F1F2F4 K3E3



V42 F2 K1E1



V43 F2 K3E5



V44 F2 K2E3



V45 F2 K2E3

ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ



V46 F2 K2E3



V47 F2 K2E3E5




V48 F2F4 K1E3E5




V49 F2 K2E3




V50 F2 K3E2E3E5



V51 F2 K3E3



V52 F2 K3E1E3



V53 F2 K3




V54 F2F4F6F7 K2


ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ



V55 F2 K2E3



V56 F2F4F8 K3E2



V57 F2F4 K3E1E2E5




V58 F2F4 K1



V59 F2F3 K2E5




V60 F2F4F5 K2E1E2



V61 F2F4 K3E3E5



V62 F2 K1E3



V63 F3 K2E2


ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ



V64 F3 K1E3



V65 F3 K1E3



V66 F3 K3E3



V67 F3 K2E3



V68 F3 K3E2



V69 F3F4 K2E1



V70 F3 K3



V71 F3 K2E1E2E3



V72 F3 K2


ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ




V73 F3 K2E3




V74 F3 K3E2E5



V75 F3 K1




V76 F3 K1E3



V77 F3 K1




V78 F3 K1E3



V79 F3 K2E1



V80 F3 K2



V81 F3 K2


ภาพถ่ายอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่าง ๆ



V82 F3 K2E3




V83 F3F4 K3E3E5




V84 F3 K1



V85 F3 K3E3




V86 F3 K2E2




V87 F3 K1E1E2E3



V88 F3 K2E2



V89 F3 K3E3




V90 F3 K1E1


ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ




V91 F3 K3E2E3



V92 F3 K2



V93 F3 K2



V94 F3F4 K3E1E5




V95 F3 K2E3




V96 F3 K3E1E3



V97 F3 K3E1



V98 F3 K2E1



V99 F3 K3E3

ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ



V100 F3 K3




V101 F3 K3



V102 F3 K3E3E5




V103 F3 K3




V104 F3 K1E3




V105 F3F5 K4E2



V106 F3 K3E2



V107 F3 K3




V108 F3 K2


ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ



V109 F3F5 K2E1



V110 F3 K3E1E2



V111 F3 K2E1E3




V112 F4 K2E2



V113 F4 K3E3



V114 F4 K1E3



V115 F4 K1E3




V116 F4 K3E3




V117 F4 K3E5

ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ




V118 F4 K3E1




V119 F4 K1E1E3




V120 F4 K3E1E2




V121 F4 K2E1E3




V122 F4 K3E1E2E3




V123 F4 K1E1E3



V124 F4 K1E3E5




V125 F4F7 K1E3



V126 F4 K1E3

ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ



V127 F4 K3E2E3



V128 F4 K1E3




V129 F4 K3E2E3




V130 F4 K3E3E5



V131 F4 K1E2E3




V132 F4 K3E1



V133 F4 K3E1




V134 F4 K3E5



V135 F4 K3E1

ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ



V136 F4 K1E1



V137 F4 K3E5



V138 F4 K1E1



V139 F4 K2E1




V140 F4 K1



V141 F4 K2E1



V142 F4 K2E1E3




V143 F4 K1E3



V144 F4 K3E2E5

ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ




V145 F4 K1E1



V146 F4 K3E1



V147 F4 K1E1




V148 F4 K3E2E3




V149 F4 K3E5



V150 F4 K3E3



V151 F4 K2E3




V152 F4 K1E3




V153 F4 K1E3

ภาพถ่ายอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ



V154 F4 K2E3




V155 F4 K3E2E3




V156 F4 K2E1E2E3



V157 F4 K1E3




V158 F4 K3E3




V159 F4 K3E3



V160 F4 K2E4



V161 F4 K3E3E5



V162 F4 K3E2

ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ



V163 F4 K1E1




V164 F4 K3




V165 F4 K2



V166 F4 K2




V167 F4 K2




V168 F5 K2E3



V169 F5 K1E1E3



V170 F5 K3



V171 F6 K3E1

ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ




V172 F7 K1E5




V173 F7 K1




V174 F7 K3



V175 F7 K3E5




V176 F7 K3E1



V177 F7 K1E5



V178 F7 K3E2



V179 F7 K1



V180 F7 K1


ภาพตัวอย่างแสดงพรรณพืชที่สำรวจพบจากแปลงตัวอย่างของป่าประเภทต่างๆ



V181 F7 K3E2E5




V182 F7 K3E4E5



V183 F7 K3E1




V184 F7 K3



V185 F7 K3E1E3



V186 F8 K3E5



V187 F1 K3E4



V188 F1 K3



V189 F4 K2EE3

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่า เต๋อเบ - ไล่กล้า สถานที่ : บริเวณป่า ออตอซอง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
1	ชู / ดาว	เถิง	ออกผลเป็นทลาย ลูกอ่อนกินได้ยอดอ่อนเป็นผักรสหวานออกลูกจากบนลงล่างเมื่อถึงพื้นจะตาย ก้านใบทำไม้กวาด อีเห็นกินลูกบนต้น ตกพื้นหนูป่ากิน	F_1, K_3, E_1, E_2, E_5
2	เซ่พู (เซยพู)	เถิง		F_1, K_3, V_1
3	หม่องไผ่	เถิง	กินยอด เอาไม้ทำเชื้อไฟ ลูกแห้งกินเหมือนหมาก อีเห็นเห็นกินลูก ต้นเมื่อออกดอกแล้วจะตาย	F_1, K_3, E_1, E_2, E_5
4	เซพูกุ	เถิง	ไม้ยืนต้นลูกสีน้ำตาลเป็นช่อเนื้อในสีขาวแดงลูกสุกนกเงือกกินบินต้นแน่นและป่างกินลูกสุกรวงพื้น	F_1, K_3, E_2, V_2
5	เด่เซลา	เถิง		F_1, K_3
6	หมีบือซ่องที	มือ	กินยอด	F_1, K_1, E_1, V_3
7	หมาเจียโหว่ / บรเพ็ดขาว	มือ	แก้ปวดเอว	F_1, K_1, E_3
8	สะไหนไล่	เผาะ	(ใช้อะไรไม่ได้)	F_1, K_2
9	ไก่อะดูล้าย	เผาะ	ลักษณะเป็นกอกกล้วยผักกูดหากขึ้นบนหินกินยอดได้ แก้ปวดเอว กินยอดเป็นผัก	F_1, K_2, E_1, E_3
10	เซาเว่ปอหรี	พา	ยาแก้โรคบวม	F_1, K_4, E_3
11	เป่อน่ามองโง	เถิง	ดอกสีขาวใบคล้ายตีนควาย ใบมวนยาสูบ ยาแก้บวม แก้เหน็บชา ใช้ใบตำละเอียดผสมน้ำข้าวหมกให้เปรี้ยวแล้วพอก	F_1, K_3, E_3, E_5

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่า เต๋อเบ - ไล่กล่า สถานที่ : บริเวณป่า อุดตอของ

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
12	ปีเลี้ยว	เผาะ	ต้มทั้งต้นกินแก้ท้องร่วง	F ₁ , F ₂ , K ₂ , E ₃ , V ₄
13	เซพลุดู	เทิง	ลูกสระผมได้	F ₁ , K ₃ , E ₅
14	หมี่ล่าย	เทิง	กินลูก ยอดกินเป็นผัก ออกดอกช่วงเกี่ยวข้าว	F ₁ , K ₃ , E ₁
15	ช่องทอง	เผาะ	เป็นไม้เนื้ออ่อนอายุต้นใหญ่ขนาดโอบ นำใบมาห่อยาสูบหรือห่อน้ำตาลอ้อยมีคุณสมบัติกับความชื้น ดอกสีเหลืองยาวเป็นสามแฉก เปลือกย่อยมให้สีแดง ดึงลมกินลูก กระรอกกระแตกินเปลือกต้น	F ₁ , K ₂ , E ₂ , E ₅
16	คาเชิง	เผาะ	ใช้ใบทำหลังคา	F ₁ , K ₂ , E ₅
17	เซหย่งชะ	เทิง	นำเปลือกมาแช่น้ำย้อมແຈ້ບປລາ	F ₁ , K ₃ , E ₅ , V ₅
18	กุวากอเรียง	เทิง	แรดกินทั้งต้น	F ₁ , K ₃ , E ₂ , V ₆
19	วาซุ	เผาะ		F ₁ , K ₂
20	ไล่คูกล่า	พา	ยาท้องร่วง ท้องเฟ้อ / กินยอดเป็นผัก / นกกินลูก	F ₁ , K ₄ , E ₁ , E ₂ , E ₃ , V ₇
21	วองอ้ว	พา	ต้มกินรักษาโรคดีซ่านโดยเอาต้นผสมส่วนประกอบอื่นแก้ง กวาง กระทิง ช้าง กิน	F ₁ , K ₄ , E ₁ , E ₂ , E ₃ , V ₈

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่า เต๋อเบ - ไล่กล้า สถานที่ : บริเวณป่า ออตอซง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
22	สะอู้ง	เผาะ	แช่น้ำในกระบอกไม้ไผ่แล้วย่างไฟเอาน้ำอมแก้ปวดฟัน ลูกหวานกินได้	F ₁ , K ₂ , E ₁ , E ₃
23	สะหนะ	เผาะ	กินลูก ลึงกินลูกได้	F ₁ , K ₂ , E ₁ , E ₂
24	ไช่บง	เผาะ	ใช้หัวต้มแก้บวม ใช้หัวสับห่อใบเตยย่างไฟแล้วประคบ แผลงหรือตะขาบกัด เปลือกต้นใช้สานเสื่อสานโง(ตะ- กร้า) เตาหกกินหน่ออ่อน	F ₁ , K ₂ , E ₁ , E ₂ , E ₃ , E ₅ , V ₉
25	ผีไล่	พา	กินใบ รสชาติเปรี้ยว ไว้แกงส้ม	F ₁ , K ₄ , E ₁
26	ฆองชีน่า	มือ	กินยอดเป็นผัก กินปริมาณมากเป็นยานอนหลับ	F ₁ , K ₁ , E ₁ , E ₃
27	โผผิดำ	เหิง	ดอกเป็นสัญญาณบอกฤดูกาลทำไร่ในรอบปี	F ₁ , K ₃ , E ₄ , V ₁₈₇
28	โผผ่อง	เหิง	ต้มเปลือกกินแก้ปวดหลัง เม่น กระรอกกินลูก ลูกสุก ไว้ดักปลา	F ₁ , K ₃ , E ₂ , E ₃
29	พูฉีจุง	เผาะ	รากต้มกินแก้ปวดหลัง	F ₁ , K ₂ , E ₃
30	ตชีชะไล่	เหิง	แก้แพ้ ลดไข้ของเด็ก แก้แพ้อาหารของหญิงคลอดใหม่ ที่มีผลกับน้ำนม	F ₁ , K ₃ , E ₃
31	ไจ้เหล่อฟุง (รางจืด)	มือ		F ₁ , K ₁
32	เซกยู่ซ่อง	เหิง	เป็นหนาม หากโดนตำพิษจะแรงเหมือนงูเห่า ถ้าโดน หน้าฝนจะเจ็บนาน / หัวฝนแก้พิษงู	F ₁ , K ₃ , E ₃ , V ₁₀

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่า เต๋อเบ - ไล่กล้า สถานที่ : บริเวณป่า ออตอซอง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
33	เนหม่องยะ	มือ	นำรากต้มกับน้ำเปล่าแก้ไอ เอาเปลือกฝนแล้วทาถอนพิษแมงบึ้ง / ใช้หัวเป็นยาแก้ฝี	F ₁ , K ₁ , E ₃ , V ₁₁
34	วาจั่ว	เผาะ	ประเภทไผ่ลำต้นโตสูงสุดเท่าด้ามปากกาคล้ายเถาวัลย์ แตกหน่อด้วยตา อายุประมาณ 40 ปี จะตายชยุ ลำต้นทำหลอดกลิ้งยาสูบ หน่อออกช่วงฤดูฝนลิงค่างกิน	F ₁ , K ₂ , E ₂ , E ₅ , V ₁₂
35	ต่องกะเน	เทิง	เป็นไม้จริงโตเต็มที่ขนาด 3 คืบ ลำต้นมีหนามเป็นยาอายุวัฒนะ นำรากแก้วตัดทิ้งแล้ววางหม้อดินรองน้ำ เอาน้ำผึ้งผสมน้ำจากรากแก้วผึ้งหม้อดิน 7 วัน แล้วชูดมากิน (ต้องล้มน้ำตาม) น้ำรสขม วันที่สองตัดกิ่งใหญ่ ครบ 7 วัน แล้วชูดราก(วางหม้อก่อนตัดกิ่ง)ทำได้ปีละต้นกินมากเกินช้อนตาย	F ₁ , K ₃ , E ₃
36	จ่องกะโหล่ (จ่อง)	มือ	หยอดตา	F ₁ , K ₁ , E ₃ , V ₁₃
37	พะยาโคคอง	มือ	ต้มกินแก้ปวดท้อง เด็กทั้งอาบทั้งกิน	F ₁ , K ₁ , E ₁ , V ₁₄
38	เซวาเพียย่อง	เทิง		F ₁ , K ₃
39	ซ่องอีย่ง	เทิง		F ₁ , K ₃ , V ₁₈₈
40	ฉ่วยป่าคู	มือ	กินยอดอ่อน โดยเผาไฟให้สุกหรือต้ม ลูกไว้ดักปลา มีดอกสีม่วง เผากินได้เป็นยาแก้อักเสบหรือใช้ตำแล้วพอกจุดผื่นหนอง	F ₁ , K ₁ , E ₂ , E ₃
41	ทีโหลดู	เผาะ	หากขึ้นบนหินกินได้ แต่ขึ้นบนดินจะขม เลียงผากินยอด	F ₁ , K ₂ , E ₁ , E ₂
42	จ่องกะเหล่มือ	มือ	รักษาตาแดง หรือเป็นยาล้างตา ต้มเป็นยาแก้เมา นกกินปลีกินเกษร	F ₁ , K ₁ , E ₂ , E ₃

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่า เตอบะ - ไถ่กล้า สถานที่ : บริเวณป่า ออตอซอง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
43	สะเคอะเน่อ	เผาะ	ไม้เนื้ออ่อนอายุยืน ออกดอกช่วงฤดูฝน ชนิ ค่าง นกเงือก กินลูกสีแดง ลูกตกพื้นมั่งกิน ไม้ล้มตายจะมีเห็ดขึ้น	F ₁ , K ₂ , E ₂ , V ₁₅
44	จองไหว	เทิง	ไม้จริงอายุยืนดอกสีแดงหอมออกช่วง ก.พ. - มี.ค. ดอกเป็นยาแก้ปวดฟันใช้ผสมสมเียะว ถึงค่างกินยอดกับดอก	F ₁ , K ₃ , E ₂ , E ₃
45	เส้าเปออยู่	มือ	ดอกสีม่วงแดงออกดอกช่วงไม้ผลัดใบ ลูกออกฤดูฝนรสเปรี้ยวหวาน ใบมีกลิ่นหอม ใช้ยอดอ่อนต้มแก้หน้ามืด เวียนศีรษะ ใช้ใบกับยอดลงไฟให้ร้อน แล้วต้มในหม้อดิน ให้อายขึ้นขยายหลอดลม อีเห็น ค่าง ลิงกินลูกสุก	F ₁ , K ₁ , E ₂ , E ₃
46	ต้องซง	มือ	ไม้อายุยืน ลักษณะลำต้นเป็นปุ่ม เาปุ่มฝนทาหน้ารักรักษาผิว ใบหอม ใช้ลูกแห้งเป็นเครื่องแกงยอดอ่อนเป็นผัก	F ₁ , K ₁ , E ₁ , E ₃ , V ₁₆
47	กุ่มบ่อง / มะเดื่อเหลือง	เทิง	ดอกสีด้าออกช่วง ก.พ. ลูกสุกช่วงเข้าพรรษา ต้นทำตำบขหวาน ยอดอ่อนเป็นผัก ชะนีกินลูกสุกบนต้น เม่น กวาง กินลูกร่วงพื้น	F ₁ , K ₃ , E ₁ , E ₂ , E ₅ , V ₁₇
48	ภูหม่องหม่วยละ	เทิง	ลูกสุกสีเหลืองกินได้ ยางใช้ยึดข้อต่อมีด นก "ทุเก๊าเล้า" (โพระดก) กินลูก	F ₁ , K ₃ , E ₁ , E ₂ , E ₅ , V ₁₈
49	เพ่อชะไซ	เทิง	เป็นเถา กินยอดอ่อนรสเปรี้ยว เาเถาต้มให้เดือดนำอาบ น้ำรักษาแผลอักเสบ	F ₁ , K ₃ , E ₁ , E ₃ , V ₁₉
50	คาไค้อ้ว	เผาะ	เป็นพุ่ม ใบบดแล้วปิ้งไฟให้อุ่นประคบแก้เคล็ดขัดยอก	F ₁ , K ₂ , E ₃ , V ₂₀
51	ซ้อเผ	เผาะ	เป็นเถา ลูกสีแดงกินได้ เาเป็นยาแก้ไอใช้ต้มกินน้ำ ;	F ₁ , K ₂ , E ₁ , E ₃
52	ต้องเม่อ	เทิง	เป็นเถา เาใหญ่เท่านอง ลักษณะเป็นข้อปล้องเาเถาต้มเป็นยาแก้ปวดเา ลูกเท่านิ้วก้อย ลูกสุกสีขาว	F ₁ , K ₃ , E ₃ , V ₂₁

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่า เต๋อเบ - ไล่กล้า สถานที่ : บริเวณป่า ออดตอของ

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
53	พุดก่อง	เผาะ	เป็นกอ ออกลูกได้กอ ไม่เป็นยา ลูกสุกสีแดงกินได้รสหวาน ออกลูกช่วงฝน นก กระรอกกิน	F ₁ , K ₂ , E ₁ , E ₂ , V ₂₂
54	เฒ่า	เหิง	ไม้เนื้อแข็งขนาด 50 ซม. ออกลูกช่วงฤดูฝน ขนาดเท่านิ้วโป้ง ลูกกินได้รสชาติหวานมัน กินมาก(เกิน 10 ลูก) จะเมา ถึง ค้าง หมูปากิน	F ₁ , K ₃ , E ₁ , E ₂
55	ฉงฉวย	มือ	ไม้พุ่มกอ ใช้หัวต้มหรือแกง กลิ่นหอม ใช้ห่มผสมของเบรียวทาแก้คัน หมูปากินใบ	F ₁ , K ₂ , E ₂ , E ₃
56	ไก่อ	เผาะ	เป็นกอ ดอกทำไม้กวาด ใบใช้ห่อข้าวเหนียวในงานพิธีกรรมบือซ่องคู้ ช้างกินใบ นำหน่อลนไฟให้นุ่ม แล้วเอาน้ำหยอดหูรักษาโรคหูน้ำหนอง	F ₁ , K ₂ , E ₂ , E ₃ , E ₄ , V ₂₃
57	เจ้อซ้อไล่	มือ	เป็นกอ ลำต้นไม่สูง ขึ้นอยู่บนหิน นกกินปลีกินดอก	F ₁ , K ₁ , E ₂
58	ปะโชไล่	เหิง	เป็นต้นขนาดมะเดื่อ เป็นปล้อง ทุกตามีกิ่งขึ้น ดอกสีม่วง ออกช่วงเดือน ก.พ. ต้นอายุ 3 ปีตาย ฉะฉะ หรือเสียงผากินยอดและใบ	F ₁ , K ₃ , E ₂
59	เก้เล่	มือ	เป็นเถา มีหนามยาวขนาด 1.5 นิ้ว เอาแกนและเถาแก่ผสมเกลือย้อมด้ายให้สีเหลืองอ่อน	F ₁ , K ₁ , E ₅
60	นองเซเปิ้ล (นองเซ่งเปรย)	เผาะ	หยุดเลือดกำเดาไหล ห้ามเลือดจากบาดแผลโดนของมีคม ยอดอ่อนเอาเปลือกออกทาเกลือเสียบทวารเด็กแก้ท้องผูก เอาใบเช็ดกันรักษาบิด	F ₁ , K ₂ , E ₃ , V ₂₄
61	เซเลื้อญ	เหิง	ไม้ใหญ่เนื้อแข็ง เปลือกต้มกินรักษาโรคบิด	F ₁ , K ₃ , E ₃
62	นองพูลุย	เผาะ	เป็นเถา เก็บยอดเป็นผัก ผลเท่านิ้วก้อย รสฝาดขมคล้ายแตงไทยไม่มีลาย ออกลูกช่วงเดือนพฤษภาคม	F ₁ , K ₂ , E ₁
63	คว้ายเหม (ไคว้เหมง)	เหิง	ลำต้นเป็นปล้อง กินยอดเป็นผัก รสเผ็ด แก้โรค เด็กอ่อนเอาใบฝนแล้วทาแก้ปมหนองท้องอืด	F ₁ , K ₃ , E ₁ , E ₃ , V ₂₅

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่า เต๋อเบ - ไล่กล้า สถานที่ : บริเวณป่า ออดอซอง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
64	เซพูค้าย	เถิง	ไม้ยืนต้นลำต้นใหญ่โตเต็มที่ สูงประมาณ 30 เมตร เปลือกหยาบ ลูกสุกสีแดง นกกินลูกสุก กระรอกตง บ้าง หนู แม่น กินลูกตกพื้น	F ₁ , K ₃ , E ₂
65	พุดาว่อง (พุดาบ่อง)	เผาะ	เป็นกอ ออกดอกช่วง ก.พ. หัวเป็นยาบำรุงเลือด ใช้เมื่อด ฝนผสมเกลือกิน ไก่ฟ้า นกกินลูกสุก	F ₁ , K ₂ , E ₂ , E ₃ , V ₂₆
66	ซุสอง	เถิง	ไม้ยืนต้นออกลูกช่วงเดียวกับมะม่วง ลูกใหญ่หัวลูกกลม รสเปรี้ยว ยอดอ่อนเป็นผัก ค่างินลูกอ่อน	F ₁ , K ₃ , E ₁ , E ₃
67	ไซไม้จิง	เถิง	ลำต้นสูง 15 เมตร ดอกสีเหลืองออกช่วงพื้นไร่ เปลือกทำ เป็นปอหรือเชือก	F ₁ , K ₃ , E ₅
68	จ่องกะเหล่อไหว (จ่องกะเหล่อ)	มือ	เป็นเถา เอาใบมาดมคล้ายหวัดคัดจุมูก รากอมเป็นยา แก้ปวดฟัน	F ₁ , K ₁ , E ₃ , V ₂₇
69	ทะมะดู	เถิง	ไม้เนื้ออ่อนใบกว้างขนาด 1 ฟุตสูงเต็มที่ขนาด 7-10 เมตร ดอกกับผลออกพร้อมกันลูกเป็นช่อมีขนรอบ ใบไว้ห่อ พันธุ์ข้าว	F ₁ , K ₃ , E ₄
70	สะเถ่อ (สะเถิง)	เถิง	ไม้ยืนต้น	F ₁ , K ₃ , E ₅ , V ₂₈
71	ถูลีหมีชุย	เผาะ	เป็นกอออกดอกสีม่วงออกช่วง ก.พ. ดอกกินกับข้าว ปิ้งไฟ ออกรสหวานเข้ายากับพืชหลายชนิด หมูปากินหัว	F ₁ , K ₂ , E ₁ , E ₂ , V ₂₉
72	พุกวยซี่กะ (พุกวยหังจะ)	มือ	เป็นเถา ใบสามแฉ่ ลูกออกช่วงหน้าฝน ตำพริกหรือแกง ได้ ตกในน้ำปลา กิน ยอดเป็นผักรสเปรี้ยว	F ₁ , K ₁ , E ₁ , E ₂ , V ₃₀
73	พุลูมือ	มือ	เป็นเถาลำเท่าแขนเอาเถาต้มรักษาโรคตับหรือบวมพอง ลูกสีเหลืองขนาดข้อมือกินได้ รสหวาน ตกพื้นแม่นกิน อยู่บนยอดค่างิน	F ₁ , K ₁ , E ₁ , E ₂
74	ช่องหวง	มือ	เป็นเถาขึ้นตามต้นไม้เป็นยาแก้ไอ ใบปิ้งให้เหลือง ใส่น้ำ ร้อนกินแทนชา	F ₁ , K ₁ , E ₁ , E ₃

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่า เต๋อเบ - ไล่กล้า สถานที่ : บริเวณป่า ออตอซง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
75	เนเหม	มือ	เป็นเถาใบกว้างยอดกินเป็นผักออกช่วงฤดูฝน	F ₁ , K ₁ , E ₁ , V ₃₁
76	ลูซี่ / ตะเคียน	เถิง	ไม้ยืนต้น เปลือกอมรักษารากฟัน เป็นยาสมานแผลเน่า เอกเปลือกตากแห้งแล้วทุบขี้แล้วเอาที่ร่วนทาแผลหลัง ล้างด้วยน้ำร้อน เอาเปลือกห่อแล้วดมแก้วิงเวียนศีรษะ	F ₁ , K ₃ , E ₃
77	คาเช่อ	เถิง	เอาใบทำหลังคา กินยอดอ่อน ตัดกินน้ำได้ ลูกสุกสีเห็น กิน	F ₁ , K ₃ , E ₁ , E ₂ , E ₅
78	สะซี	มือ	เมื่อเดินป่าสามารถตัดเถาเอาน้ำหุงข้าวได้ น้ำในเถากิน แก้ปวดท้อง	F ₁ , K ₃ , E ₁ , E ₃
79	เบเถอะเฮี้ยว	มือ	เป็นเถา	F ₁ , K ₁
80	ซูม่ / สะตอป่า	เถิง	กินผัก ถึง หมี่กิน	F ₁ , K ₃ , E ₂
81	ฟ่า	เถิง	ไม้ยืนต้น แก่นย้อมผ้าให้สีเหลือง ชะนี ค่าง ลิงกิน ลูกตก พื้น หมี่ หมู กวาง หมูป่า ไก่ฟ้ากิน	F ₁ , K ₃ , E ₂ , E ₅
82	เซไหวพู	เถิง	ไม้ยืนต้นโตสุดเท่าด้ามขวาน ใช้ทำด้ามขวาน	F ₁ , K ₃ , E ₅
83	หนองมะของ	มือ	เป็นเถาหนาม	F ₁ , K ₁
84	คิทุ	เถิง	ไม้ยืนต้นเนื้อแข็ง ลูกรสเปรี้ยวหวาน ขนาดเท่าข้อมือ ยาวหนึ่งคืบ ชะนี ค่าง ลิง เม่น กิน	F ₁ , K ₃ , E ₂
85	เซซ่องฮินย่ง	เถิง	เป็นไม้จริงลำต้นไม่ใหญ่	F ₁ , K ₃ , E ₅

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่า เต๋อเบ - ไล่กล้า สถานที่ : บริเวณป่า ออตอซง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
86	นองปะโฮ	เผาะ	ดอกสีม่วงเป็นช่อ กินเป็นผักได้ ผลลักษณะเป็นสีเหลี่ยมเป็นช่อพวง	F ₁ , K ₂ , E ₁
87	มิดี / หวายไล่ไก่	มือ	โตเต็มที่ขนาด 1 นิ้ว ยาวเต็มที่ขนาด 2-3 เมตร ออกลูกช่วงฝน ลูกกินได้	F ₁ , K ₁ , E ₁ , V ₃₂
88	กะช่องซี่พุ	มือ	เอาใบและเถาต้มอาบเป็นยาแก้โรคบวม ช้ำชอบกิน	F ₁ , K ₁ , E ₂ , E ₃
89	พุช่องกู (พุช่องเกาะ)	มือ	เป็นเถาเอาหัวและใบขยี้ใส่เกลือแช่น้ำกินแก้ร้อนใน ดอกสีเหลืองออกที่ยอด	F ₁ , E ₃ , V ₃₃
90	กูวัก	เหิง	ดอกสีขาว ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีดำ กินได้ แต่กินมากจะคัน ผลทำเป็นเหยื่อตกปลา	F ₁ , K ₃ , E ₁ , E ₂ , V ₃₄
91	กูบ่องไล่	เหิง	ดอกสีดำ ผลสุกสีเขียวขนาด 1 ซม. เม่นชอบกิน	F ₁ , K ₃ , E ₂
92	ไฟช่องกะลิ	เหิง	เป็นยาแก้ปวดฟัน เอารากขยี้แล้วอมผสมเกลือ ดอกผลเหมือนไม้เตียน	F ₁ , K ₃ , E ₃
93	เซยาวี	เหิง	ตระกูลไทร นกกินผล	F ₁ , K ₃ , E ₂
94	สะเมยเพล	เผาะ	เป็นยาแก้กระษัย เอารากต้มกิน ออกดอกช่วงต้นฤดูฝน ผลสีน้ำตาล	F ₁ , K ₂ , E ₃
95	อีโฮ	เหิง	เอาผลเผาไฟ ผสมเกลือแช่น้ำกินแก้ไอ ช้ำช นก กก นก แก๊ก ค่าง ลิงกิน	F ₁ , K ₃ , E ₂ , E ₃ , V ₃₅
96	ชวยไถ่ที	เผาะ	เป็นยาขับลม ต้มกิน ผลสุกสีเหลือง คนกินได้ ลิง ค่าง อีเห็นกิน	F ₁ , K ₂ , E ₁ , E ₂ , E ₃ , V ₃₆

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่า เต๋อเบ - ไล่กล้า สถานที่ : บริเวณป่า ออดอซอง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
97	ผะค่อ	เถิง	ผลขนาดใหญ่เท่ากำปั้น กินได้	F ₁ , K ₃ , E ₁ , V ₃₇
98	ต่ง	เถิง	ลำต้นเป็นหนาม ดอก ผลกินได้ ออกผลเดือน ก.พ.	F ₁ , K ₃ , E ₁
99	ซีไหล่ทะ	เผาะ	ผลเหมือนอว้ยะเทศชาย ออกฤดูฝน หนึ่กิน	F ₁ , K ₂ , E ₂ , V ₃₈
100	เซเดอไถ่	เถิง	หรือไม้แพ้งคราม ปลูกมาก ๆ รับประทานจะมีขี้ รมไม้คลุมหญ้าได้ดี	F ₁ , K ₃ , E ₅
101	ไก่อุดหญ่ง	เผาะ	เอารากต้มแก้โรคบิด	F ₁ , K ₂ , E ₃ , V ₃₉
102	เซพ่องบุง	เถิง	ออกดอกช่วง ก.พ.-มี.ค. ผลสีขาว-เหลืองเข้ม-ดำ หนึ่ นกเงือกกิน	F ₁ , K ₃ , E ₂
103	หนึ่ตะม่อง	เถิง	เปลือกกินกับหมากได้รสฝาด ดอกสวยกลิ่นหอมสีขาว กินได้ กระจอกกิน รากใช้ทำกล้องยาสูบ	F ₁ , K ₃ , E ₁ , E ₂ , E ₅
104	ซ่องหล่องยองเด่	เผาะ	ยาแก้พิษงู เอาเถาต้มกินแก้ปวดเอว	F ₁ , K ₂ , E ₃
105	เซวีชะ	เถิง	ไม้เนื้ออ่อนข้างในสีขาวไม่มีแก่น ใช้ทำกระดานเขียนหนังสือ	F ₁ , K ₂ , E ₅
106	เบ่อม่องจี	เผาะ	ออกดอกเดือน ก.พ. สีขาว ถวายพระ ไก่ฟ้ากินผล	F ₁ , K ₂ , E ₂ , E ₄
107	ทุยบาม่อง	เถิง	ใช้รักษาแผลของสุนัข ออกผลครั้งละ 2-3 ผล	F ₁ , K ₃ , E ₃ , V ₄₀

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่า เต๋อเบ - ไล่กล้า สถานที่ : บริเวณป่า อดตอซง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
108	ชืคี่คั่ง	เผาะ	เป็นยาแก้กระษัย ดอกรักษาอาการไอ	F ₁ , K ₂ , E ₃
109	สะชู	เหิง	ผลใหญ่กว่ามะไฟ เป็นยาแก้ปวดฟัน เอาเปลือกต้มกับ วาชู-วามี่(ไผ่)อมห้ามกลิ่น	F ₁ , K ₃ , E ₃ , V ₄₁
110	เจอะเหล่องกั่ง	มือ	แก้แพ้ทุกชนิด นำไปตากให้แห้งผสมเกลือก่อนเก็บ	F ₁ , K ₁ , E ₃

สรุปการศึกษาป้าครั้งที่ 2 ป้าเต๋อ-เซกล่า ระหว่าง 16 - 19 มีนาคม 2540

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
1	ปีเดียว	เถิง	ให้ผู้หญิงหลังคลอดลูกกิน	V_4
2	จะไล่	มือ	เถาต้มกิน	V_{42}, F_2, K_1, E_1
3	เสาะปะยู่	มือ	ลูกกินได้ รากใช้รักษาพิษงู ตะขาบ	F_2, K_1, E_1, E_3
4	กระว้าง	เถิง	เป็นยาแก้ไข้ ความดันสูง ความดันต่ำ บำรุงเลือด	F_2, K_3, E_3
5	เปอนาคองมี	เถิง	ดอกสีขาว	F_2, K_3, E_5, V_{43}
6	เลี้ยวท่า	มือ	หว่ายชม ลูก ยอดกินได้ ถึง ค้างกินลูก	F_2, K_1, E_1, E_2
7	ชีเาะเซาะ	เผาะ	ยาลดไข้ของเด็ก	F_2, K_2, E_2, V_{44}
8	ชีช่องพู (เซช่องพู)	เผาะ	แก้เลือดไม่ดี ชัดเหลือง	F_2, K_2, E_3, V_{45}
9	พูช่องเกาะ	เผาะ	ยาแก้ร้อนใน แก้ปวดเอว กินยอดเป็นผัก	F_2, K_2, E_3, V_{46}
10	เซซามิ	เถิง	ต้มใช้ทาทั่วคันไถ	F_2, K_5, E_5
11	จะไว้ผะดู	มือ	แก้ท้องบิด	F_2, K_1, E_3

สรุปการศึกษาป่าครั้งที่ 2 ป่าเต๋อ-เซกล่า ระหว่าง 16 - 19 มีนาคม 2540

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
12	ช่องหรือมือแม่	เผาะ	รากเป็นส่วนผสมของยาแก้เบาหวาน ร้อนใน ใบใช้เสื่อได้	F ₁ , F ₂ , K ₂ , E ₃ , E ₅ , V ₄₇
13	ช่องหรือคุหล่ง	เทิง	ลูกอีเห็นกิน	F ₂ , K ₃ , E ₂
14	เลี้ยว	เผาะ		F ₂ , K ₂
15	เซวช่อง	มือ		F ₂ , K ₁
16	สะพลูหล่ง	เผาะ	ต้นกินได้ เข้ายาแก้ไอ หอบ	F ₂ , K ₂ , E ₁ , E ₃
17	มองเทออะซ่ง	เทิง	เป็นยา ผลสีน้ำตาลดำ นกกินผล แรดกระชูกินยอด ผลช่วงเดือน พ.ย.	F ₂ , K ₃ , E ₂ , E ₃
18	ทุไก่คู่	มือ	เอาเถาผูกมัด ขวาน ซึ่งเป็นเครื่องมือทำไร่ เป็นยา सानกระดูก โดยเอาใบอ่อนมาสับกับกบประคบบริเวณ กระดูกหัก	F ₂ , K ₁ , E ₃ , E ₅ , V ₄₈
19	สะทุ	เทิง	ออกผลช่วงหน้าฝน ลิงกิน	F ₂ , K ₃ , E ₂
20	อีกะไถ้	เทิง	ผลลักษณะเป็นฝัก กระรอกหรือสัตว์เล็กๆ กิน ต้น ประมาณ 15 เมตร กว้างครึ่งเมตร	F ₂ , K ₃ , E ₂
21	โก๋หลี	เทิง	ใบหอม เป็นยาแต่ต้องผสมอย่างอื่น	F ₂ , K ₃ , E ₃
22	ไฟจิรี	เผาะ	ใบเป็นรียาว ดอกสีขาว เป็นยาแก้ร้อนใน เอาที่ ต้มกิน	F ₂ , K ₃ , E ₃ , V ₄₉

สรุปการศึกษาป่าครั้งที่ 2 ป่าเต๋อ-เซกล่า ระหว่าง 16 - 19 มีนาคม 2540

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
23	โพช่วยหนะผลิ	มือ		F ₂ , K ₁
24	เมี้ยเผอเลอะ	เทิง	ลูกชักผ้าได้ เมล็ดทำเหยื่อล่อปลา เป็นยาถ่าย ขาหรือซ้ำในเอาเม็ดดำดีให้ละเอียดแล้วห่อประคบ แก้งกว้าง เม่นกินลูก	F ₂ , K ₃ , E ₂ , E ₃ , E ₅ , V ₅₀
25	คิโหว่	เทิง	सानตะกั่ว กินยอดได้ ขมมาก คนท้องกินไม่ได้ หโรคประจำตัวกินแล้วจะผดผื่นแดง	F ₂ , K ₃ , E ₁ , E ₅
26	ชีชี	เทิง	ลูกเป็นอาหารโปรดของหมี	F ₂ , K ₃ , E ₂
27	ชะเหรีญพู	เทิง	อยู่ในที่ขึ้น ต้นใหญ่ เอาไม้ทำธนู	F ₂ , K ₃ , E ₅
28	น่องบ่อง	เทิง	ยางขาวเปลือกหนา เอาเปลือกแช่น้ำกินเวลาปวดหรือทำงานหนัก เปลือกตำละเอียดผสมน้ำผึ้ง พริกไทย แก้โรคปวดท้องเส้นตึงของผู้ชาย	F ₂ , K ₃ , E ₃ , V ₅₁
29	อูยไล่	เทิง	เอาหัวฝนแล้วทาตัวแก้ตัวร้อน เอาหน่อทำแกงส้ม	F ₂ , K ₃ , E ₁ , E ₃ , V ₅₂
30	เซอ้วไผ่	เทิง		F ₂ , K ₃ , V ₅₃
31	ชวยไถ่	มือ	นำเถาต้มกินเป็นยาระบาย	F ₂ , K ₁ , E ₃
32	กูไธ่	เทิง	กินได้เป็นยาระบายท้อง ระบายลม	F ₁ , K ₃ , E ₃
33	เซอโหลหมี	เผาะ	กินได้	F ₁ , K ₂ , E ₁

สรุปการศึกษาป่าครั้งที่ 2 ป่าเต๋อ-เขกล่า ระหว่าง 16 - 19 มีนาคม 2540

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
34	กะช่องเซ่อ	มือ	เป็นยารักษาฝี	F ₂ , K ₁ , E ₃
35	โพข่าจุช่าคอง	เผาะ	มือ, ขาพลิกแพลง ทำให้ละเอียดแล้วนำมาประคบ สีขาว ออกช่วงหน้าแล้ง	F ₂ , K ₂ , E ₃
36	อู่ฉ่วย	เผาะ	ต้น หัวกินได้ หมูกินใบ	F ₂ , K ₂ , E ₁ , E ₂
37	นองเมอะคอง	เผาะ		F ₂ , K ₂
38	ตะชี	เผาะ	แก่น้ำกัดเท้า	F ₂ , K ₂ , E ₃
39	ต่ง	เทิง	ลูกยอดกินได้ นกกิน	F ₂ , K ₃ , E ₁ , E ₂
40	ชีชู	เผาะ		F ₂ , K ₂ , V ₅₄
41	โพทุกโหว่	เผาะ	เป็นยาอายุวัฒนะ	F ₂ , K ₂ , E ₃ , V ₅₅
42	กะเล้าเจียะบะ	มือ		F ₂ , K ₁
43	กู๊กิ	เทิง	นกกินลูก	F ₂ , K ₃ , E ₂ , V ₅₆
44	ไซค่ง	เทิง	ลูกกินได้ หมู อีเห็น กระรอกกิน ใบใช้ทำหลังค	F ₂ , K ₃ , E ₁ , E ₂ , E ₅ , V ₅₇

สรุปการศึกษาป่าครั้งที่ 2 ป่าเต๋อ-เขกลำ ระหว่าง 16 - 19 มีนาคม 2540

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
45	พลามือ	มือ		F ₂ , K ₁ , V ₅₈
46	ดีกิติ	เทิง	ออกลูกตามใบอยู่ในพื้นที่ดินเหลืองแดง ต้นเตี้ยชน เมตรครึ่ง	F ₂ , K ₃ , E ₅
47	ซ่งลาอะ	เผาะ	เอาใบทำเชือก	F ₂ , K ₂ , E ₆ , V ₅₉
48	วองอ้ว	พา	ยาแก้ไอเรื้อรัง เอาใบผสมเกลือใช้กวาดคอ ดมดม โรคตาเหลือง	F ₂ , K ₂ , E ₃
49	ปะโฉอาซอง	เผาะ		F ₂ , K ₂
50	ชีซละ	มือ	เป็นยาแก้แพ้ ช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องของผู้หญิง	F ₂ , K ₁ , E ₃
51	กุเสาะไว้	เทิง	ลูกสีดำ ลูกสีแดง เตากินลูก เปลือกลูกผ่าเป็นชิ้น เป็นของหวาน	F ₁ , K ₃ , E ₁ , E ₃
52	หวองพู	เทิง		F ₂ , K ₃
53	วากลือ	เผาะ	กินหน่อได้ ช้าง กระตัง เม่น อ้นกินหน่อ	F ₂ , K ₂ , E ₁ , E ₂ , V ₆₀
54	ปะโฉ	เทิง		F ₂ , K ₃
55	เปอะเดาะ	เทิง	ยอดกินแก้ท้องร่วง เอาเปลือกทำยาเบื่อปลา	F ₂ , K ₃ , E ₃ , E ₅ , V ₆₁

สรุปการศึกษาป่าครั้งที่ 2 ป่าเต๋อ-เซกล่า ระหว่าง 16 - 19 มีนาคม 2540

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
56	กะเดาะไฟ	เถิง	ลูกกินกับหมาก	F ₁ , K ₃ , E ₁
57	เฒ่	เถิง	ลูกกินได้ รสมัน ลิ้ง ค่างกิน ทำพื้นดี	F ₂ , K ₃ , E ₁ , E ₂ , E ₅
58	อีไ้	เถิง		F ₂ , K ₃
59	หละเหม่	มือ	เอาลูกซูดแปะแผลเรื้อรัง	F ₂ , K ₁ , E ₃ , V ₆₂
60	คิ๊ดิ	มือ	ลูกกินได้ เป็นหวายเส้นเล็กใช้สานเครื่องใช้ เช่น ต ลิ้ง ค่างกินลูก	F ₂ , K ₁ , E ₁ , E ₂ , E ₅
61	หล่องเหม่	มือ	ใบผสมเกลือให้วัว ควายกินรักษาแผลที่มีหนองได้	F ₂ , K ₁ , E ₃
62	ผิลาซอชะลิ	พา	เอาหัวให้เด็กอมแก้ฟันเป็นโรค ขึ้นตามต้นไม้	F ₂ , K ₄ , E ₃
63	คองเซอน่า	มือ	กินได้ กินมากทำให้งวงนอน ลิ้ง ค่างกินยอด ลูก ขาว ดองกินได้	F ₂ , K ₁ , E ₁ , E ₂

สรุปผลการศึกษาเรื่องพืช/ป่าวากลิ้ง-กล่า/บริเวณที่สระดองคี/บ้านกอมองทะ

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
1	นองเวีย (เขอะเอีย)	เผาะ	ใบเป็นอาหารของกวาง	F_4, K_2, E_2, V_{112}
2	นองชะ	เทิง	รากใช้รักษาฝี หนอง, เลือดลม เมล็ดออกเดือน ก.ย. กินได้ ยอดกินได้ นกกิน	$F_4, K_3, E_1, E_2, E_3, V_{122}$
3	ชีชู	เทิง	สูงประมาณ 1 ม. แก่โรคท้องบิด ต้น เปลือกผ่าเป็นซีกต้มรสฝาด ใบเคี้ยวพ่นแก้ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก น้ำกัดเท้า ออกลูกฤดูฝนไร่ นกกินลูก	F_4, F_4, K_3, E_2, E_3
4	พูซ่งซ้อง	เผาะ	ใช้หัวฝนกับไฟ เป็นยาแก้หวัดสำหรับเด็กอ่อน หัวและหน่อเป็นผัก	$F_4, K_2, E_1, E_3, V_{189}$
5	ชีชะอ้วย	มือ	ต้นทั้งใบ, ต้น เอาไว้กินและอาบ รักษาเด็กที่ตัวร้อน อุจจาระดำ	$F_4, K_1, E_1, E_3, V_{123}$
6	พูลี	เผาะ	ดอก หน่อ หัวกินเป็นผัก ออกดอกเดือน ก.ย.	F_4, K_2, E_1
7	ใบจ่งจี	มือ	ทุบเอาใส่กระบอกน้ำ-กะปิ-เกลือ-ปัสสาวะ รักษาสัตว์ที่เคล็ดขัดยอก บวม ใบแห้งมวนยาสูบ	$F_4, K_1, E_3, E_5, V_{124}$
8	กล่งโคง	มือ	ตัดเถาเป็นชิ้นๆผสมกับน้ำตาลมะพร้าว ต้มกะมั่ว ยาลี่ ผ่องบ่อง กะใจะใจ ต้มกินแก้ปวดเมื่อย รสจืด	F_4, K_1, E_3, V_{125}
9	ตงตะลง	มือ	นำใบ เปลือกผสมกับคั่วะ ไฟคั่วง ชีเย่พู เซล้าพู เจ้า ดำให้ละเอียดแล้วบั้ง รักษาเด็กปวดบวม	F_4, K_1, E_3, V_{126}
10	เก่อซง	เทิง	ลูกสุกรสเปรี้ยว สัตว์ทุกชนิดกิน เปลือกต้มแก้โรคท้องบิด	$F_4, K_3, E_2, E_3, V_{126}$
11	พูยาบ่อง	เผาะ	กินดอกเป็นผัก ออกเดือน ก.ย.	F_4, K_2, E_1

สรุปผลการศึกษาเรื่องพืช/ป่าวากลิ้ง-กล่า/บริเวณที่สระดองดี/บ้านกอมองทะ

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
12	เนหม่องยะ	มือ	ใช้หัวเป็นยาแก้ฝี นำรากต้มกับน้ำเป่าแก้ไอ เอาเมล็ด ฝนถอนพิษแมงป่อง	F_4, K_1, E_3
13	นองทุยอี	มือ	นำใบกลั่นลมหายใจแล้วนำไปแปะกัน ป้องกันโรคบิดระ- บาด ตัดเถา 1 กำผสมผลคุดี โควีชา เสือพูชาอัว อะหนะ ก็ ต้มกินแก้ลมจุกเสียด ผล, ยอด ช่วยขับลม	F_4, K_1, E_3, V_{128}
14	เดิง	เทิง	นำเปลือกต้มน้ำแล้วนั่งลงตะกร้า ใช้ผ้าห่มคลุมอบตัวให้ เหงื่อออก รักษาโรคบวม ลิง ค่าง กวางกินลูก สุกเดือน มี.ค.	F_4, K_3, E_3, V_{129}
15	เอ่อนา(เอ็งนา)	เทิง	มะเดื่อชนิดหนึ่ง ตัดต้น รากต้มแก้โรคบิด ใบหยาบใช้ขัด ไม้แทนกระดาษทรายได้	$F_4, K_3, E_3, E_5, V_{130}$
16	ทุไก่อคู่	มือ	ยอดต้นกินเป็นผัก ผสมกับนองเซี่ยเปรยต้มรักษามาลา เรีย	F_4, K_1, E_1, E_3
17	ไฟคู่จ้ง	เทิง	นำเปลือกผสมกับหมาไฟ น่อไฟแช่น้ำกินแก้ไข้ในหายใจ ไม่สะดวก รสขม	F_4, K_3, E_3
18	โง่งที (โง่งทิง)	เทิง	ลำต้นมีหนาม เปลือกย่างกับเกลือแช่น้ำดื่มแก้ร้อนใน กระหายน้ำ ใช้ใบผสมกับบือแคเผล เจอะเหล่อก่ง โควีชา ฝนกับเกลือ แก้อาหารเป็นพิษ แพ้ยา	F_4, K_3, E_3, V_{113}
19	เจอะสะไว	มือ	ผสมกับลูเล โควีชา ใ่อที่ กะโหนดชา เจอะเตอะมู กะบอง หละไฟ ต้มกินเป็นยารักษาธาตุ แก้เลือดลมหลังคลอด	F_4, K_1, E_3, V_{114}
20	กูบ่อง	เทิง	ยอดปิ้งกินเป็นผัก ลูกเม่น มัน กวาง เก้งกิน	F_4, K_3, E_1, E_2
21	โควีเหม	มือ	พริกไทยป่า ใบผสมกับปัสสาวะเด็ก ทาแก้ไข้สูง ก่อน ซัก	F_4, K_1, E_3, V_{115}
22	ตาหม่อง	เทิง	นกกินลูก สุกเดือน มี.ย. - ก.ค.	F_4, K_3, E_2

สรุปผลการศึกษาเรื่องพืช/ปาวากลือ-กล้า/บริเวณที่สระตองดี/บ้านกอมองทะ

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
23	มูมู	เถิง	นำยอดตัดกับข้าวสุก ตูดฝัหนอง	F_4, K_3, E_3, V_{116}
24	เปอนาคองมี	เถิง	ใช้ทำพินติดไฟดี	F_4, K_3, E_5, V_{117}
25	ไฟเฒ	เถิง	กินยอดรสเปรี้ยว เม็ดแห้งกินได้	F_4, K_3, E_1, V_{118}
26	พู้อว (ผู้อว)	มือ	ยอด หน่อต้มจืด เอาเถาแช่น้ำแล้วนำหอยเป็นๆ ใส่ลงไป ให้คนใช้ดื่ม ล้างหน้า เช็ดตัว ห้ามนอน รักษาอีสุกอีใส	$F_4, K_1, E_1, E_3, V_{119}$
27	พูไมบ่อง	เผาะ	กินดอกผสมเกลือห่อใบขมิ้น	F_4, K_2, E_1
28	ร่งซี	เถิง	ลูกอ่อนรสเปรี้ยวใช้ต้มยา ลูกสุกหยาป่า เค้า กวาง กระ- ทิง ลิง ค่างกิน	$F_4, K_3, E_1, E_2, V_{120}$
29	พูยู่เอ	เผาะ	หัวหน่อดอกกินเป็นผัก นำพูยู่เอ เอหม่ที่ พูเมียเซอ 1 ก.ก.+โควิชา 1 ชีด+น้ำผึ้ง ตำตากแดด ท้องอติปิโสพัน จบ กินเช้า-เย็น เป็นอายุวัฒนะ	$F_4, K_2, E_1, E_3, V_{121}$
30	คลี	มือ	ขูดหัวหั่นแช่น้ำใส่เกลือทิ้งไว้ 3 วัน บิดน้ำออกผสมน้ำ ตาล มะพร้าวกินแทนข้าว เอาหัวคั้นน้ำกินแก้พิษงู ตะขาบ	$F_4, K_1, E_1, E_3, V_{131}$
31	เซนองเอ	เถิง	ยอดเป็นผัก	F_4, K_3, E_1, V_{132}
32	ไก่ชะดูหยง	เผาะ	ตำผสมตะไคร้พอกแล้วพันรักษาซากหัก เคล็ด	F_4, K_2, E_3
33	ไบบี	เถิง	กินหน่อ	F_4, K_4, E_1, V_{133}

สรุปผลการศึกษาเรื่องพืช/ปาวากลิ้ง-กล่า/บริเวณที่สระดองคี่/บ้านกอมองทะ

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
34	เฉาะเราะะ	เหิง	ทำฟืน	F_4, K_3, E_5, V_{134}
35	เซนองใช้	เหิง	ทำฟืน	F_4, K_3, E_5
36	อ้าวคุด	เหิง	กินยอด	F_4, K_3, E_1, V_{135}
37	พลามือ	เหิง	ต้นทำฟืนได้	F_4, K_3, E_5
38	พริอทีใช้	มือ	ลูกกินได้	F_4, K_1, E_1, V_{136}
39	หรงฉี	เหิง	ใบแห้งมวนยาสูบ	F_4, K_3, E_5, V_{137}
40	กุกิ	เหิง	ลูกสุกใช้เป็นเหยื่อล่อปลา	F_4, K_3, E_2
41	สะนึสะเปรี้ยว	พา	นำเถาต้มแก้โรคบิด รสขม	F_4, K_5, E_2
42	ปัส่อง	เหิง	ลูก แก้ง กวางกิน	F_4, K_3, E_2
43	พุลีคุด	เผาะ	ดอกจมน้ำพริก	F_4, K_2, E_1
44	ดูลูไค้	มือ	กินลูก ออกช่วงเดือน ก.ย. ดอกสีเหลือง ลูกสุกสีเขียว	F_4, K_1, E_1, V_{138}

สรุปผลการศึกษาเรื่องพืช/ป่าวากลิ้ง-กล่า/บริเวณที่สระดองคี่/บ้านกองมอหนอง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
45	ยะพล่า	เผาะ	กินหยวกต้น	F ₄ , K ₂ , E ₁ , V ₁₃₉
46	โกวซัง	เทิง	ทำพิน ยอดกินได้	F ₄ , K ₃ , E ₁ , E ₅
47	หละชูเหม	มือ	เม่นกิน หัว ลูก	F ₄ , K ₁ , E ₂
48	วองอัว	เผาะ	ต้มทั้งต้นกินแก้ปัสสาวะแดง ร้อนใน	F ₄ , K ₂ , E ₃
49	ชีบาเกาะ	มือ		F ₄ , K ₁ , V ₁₄₀
50	เอ้ไซ้ (เอ่งซ้ายฮู)	เผาะ	กินหน่อ หัว	F ₄ , K ₂ , E ₁ , V ₁₄₁
51	เกี้ยวเหม่ง (โก้วเหม่ง)		หัวกินได้ ต้นเป็นยา เอาหัวเจาะรูใส่เกลือแล้วปิด เผา แล้วเปิดเอาเกลือมาอุดฟัน	F ₄ , K ₂ , E ₁ , E ₃ , V ₁₄₂
52	หยี้เหล่อ	เผาะ		F ₄ , K ₂
53	สระชู	เทิง	ลิง ค่างกินผล นำไปผสมกับตัวยาอื่นๆ แก้ปวดฟัน	F ₄ , K ₃ , E ₂ , E ₃
54	เหม่งของมือ	มือ	ผ่าแล้วชุบน้ำที่หัวแกมคั้นเป็นน้ำ 2 ขวด ผสมน้ำข้าว ข้าว+พริกไทย+น้ำผึ้ง 1 ขวด นำไปบ่มไว้ในยุงข้าว เปลือก 1 อาทิตย์กินก่อนอาหารเช้า-เย็นเป็นยาอายุวัฒนะ	F ₄ , K ₁ , E ₃ , V ₁₄₃
55	หล่า	เทิง	ลูกอีเหิน แก้ง กวางกิน ดอกขาว ออกตอนเกี่ยวข้าว	F ₄ , K ₃ , E ₂

สรุปผลการศึกษาเรื่องพืช/ป่าวากลือ-กล่า/บริเวณที่สระดองคี่/บ้านกอมองทะ

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
56	เหมโหยไ่ว	เถิง	ใช้ผล เปลือกทำสีย้อมผ้า(ดำ-น้ำเงิน) แก้ง กวาง เลียงผา กินผล	F_4, K_3, E_5, V_{144}
57	เนจุ	มือ	ใช้หัวทำขนม	F_4, K_1, E_1, V_{145}
58	โซว	เถิง	ใช้ทำเชือก	F_4, K_3, E_5
59	เลิงเวงมิ	เถิง	ผัดกินได้	F_4, K_3, E_1, V_{146}
60	นองกี	เผาะ	ใช้ใบทำเหยื่อล่อปลา	F_4, K_2, E_2
61	ช่องกะเหล่อ	มือ	ใช้น้ำจากเถา หยอดหู ตา	F_4, K_1, E_3
62	เปอะเดาะ	เถิง	ยอด เปลือกรักษาโรคท้องบิด เม่น มั่นกิน	F_4, K_3, E_2, E_3
63	ฤทิมขุย	เผาะ	หมูป่ากินหัว	F_4, K_2, E_2
64	ตะบ่องมือ	มือ	ยอดกินได้ รสเปรี้ยว	F_4, K_1, E_1, V_{147}
65	วากลือ	เผาะ	ไม้บง หน่อกินได้ ใช้สร้างบ้าน กระทิง หมูป่า ช้าง อ่อนกิน หน่อ	F_4, K_2, E_1, E_2
66	โซ่งค่ง	เถิง	เป็นยาแก้ร้อนใน ดอกสีแดง ผลยาว ลิงค่างกิน	F_4, K_3, E_2, E_3

สรุปผลการศึกษาเรื่องพืช/ป่าวากลิ้ง-กล่ำ/บริเวณที่สระตองคี/บ้านกอมองทะ

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
67	ซีไหลทะ	เถิง	หมี หมูป่า ลิง ค้างกินผล	F ₄ , K ₃ , E ₂
68	เสอโย	เถิง	ใช้เปลือกต้นมาทำยาสระผม นกกินผล สีดำ ออกเดือน ก.ค.	F ₄ , K ₃ , E ₂ , E ₃ , V ₁₄₆
69	นองเสยเปรย (น้องกะหล่ำ)	เผาะ	ใช้ยอดอ่อนผสมยาสูบแล้วนำไปบด แปะแผลสดรักษาบาด แผล ห้ามเลือด	F ₄ , K ₂ , E ₃
70	คล่ำ	เถิง	แก้โรคท้องเสีย นำยอดมาต้มกับน้ำกิน เปลือกใช้ย้อมผ้า ออกสีน้ำตาลแก่	F ₄ , K ₃ , E ₃ , E ₅
71	มือชาเมยเถิง	เถิง	ลำต้นมีหนาม ใช้ทำด้ามขวาน	F ₄ , K ₃ , E ₅ , V ₁₄₉
72	พิดุชำเบ	เถิง	นำเยื่อเปลือกมาปิดฝี รากต้มน้ำกินแก้ร้อนใน	F ₄ , K ₃ , E ₃ , V ₁₅₀
73	เค (เคอ)	เผาะ	นำมาต้มน้ำกินแก้ไอ หืด หอบ ปวดหลัง	F ₄ , K ₂ , E ₃ , V ₁₅₁
74	ซีคา	มือ	เอาหัวมาฝน แก้ไข้	F ₄ , K ₁ , E ₃ , V ₁₅₂
75	กล่งอ้อมมือ	มือ	เอายอดฉนไฟ ทาบริเวณที่น้ำกัดเท้า	F ₄ , K ₁ , E ₃ , V ₁₅₃
76	นองเบอะไซ้	เผาะ	นำมาต้มน้ำแก้โรคดีซ่าน ต้องผสมทะไลดงไฟ+วอง	F ₄ , K ₂ , E ₃ , V ₁₅₄
77	กุลี	เถิง	ผลสุกสีดำ นกกิน นำเปลือกผสมกับเกลือ แก้ไข้ร้อนใน	F ₄ , K ₃ , E ₂ , E ₃ , V ₁₅₅

สรุปผลการศึกษาเรื่องพืช/ปาวากลือ-กล่า/บริเวณที่สระตองคี่/บ้านกอมองทะ

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
78	ชุยไล่ (ชุยไล่)	เผาะ	ลำต้นกินได้ ดอกสีขาว ลิง ค่างกินต้น แก้วโรคเหนียวหอบ ร้อนใน	$F_4, K_2, E_1, E_2, E_3, V_{156}$
79	ชีช่วยบ่อง	มือ	น้ไม้ต้มแก้บิด ท้องเสีย	F_4, K_1, E_3, V_{157}
80	โพ่ทุก	มือ	เอาหัวมาต้มแก้ปวดหลัง ปวดเอว ดอกสีแดงคล้ายดอก แด่ กินได้ ยอดกินได้	F_4, K_1, E_1, E_3
81	ชีขละนองเพ่	เทิง	นำต้น รากมาต้มให้เด็กอาบ กิน แก้วแสง ท้องร่วง ท้องเสีย	F_4, K_3, E_3, V_{158}
82	กุงกิ	เทิง	ใช้ลูกเป็นเหยื่อตกปลา นกกินผลสุก	F_4, K_3, E_2
83	ชีบาเกาะ	มือ	นำลำต้น ราก ใบมาต้มแก้ไอ หอบ หืด	F_4, K_1, E_3
84	ทะไม้บ่อง (ไท่ไม้บ่อง)	เทิง	เอาเปลือกมาแช่น้ำให้เด็กอาบ แก้วแสง	F_4, K_3, E_3, V_{159}
85	โพ่นล่าเขา	เผาะ	ดอกใช้บูชาพระ ออกเดือน ส.ค.	F_4, K_2, E_4, V_{160}
86	เหมปี (เหมปีง)	เทิง	เปลือกใช้ย้อมผ้า สีน้ำตาลแก่ นำเปลือกผสมน้ำบัสสาวะ+เกลือ ตำแล้วคั้นน้ำมาหยอดตา รักษาตาเจ็บ ตาอักเสบ	$F_4, K_3, E_3, E_5, V_{161}$
87	เชอองกว่า (เชยอองกว่า)	เทิง	ดอกสีขาว ผลเป็นฝักยาว ลิง ค่างกินยอด	F_4, K_3, E_2, V_{162}
88	ชีขละโพล (ชิงขละโพล)	มือ	เอาเถามาต้มให้เด็กกิน เป็นยาแก้ท้องเสีย	F_4, K_1, E_1, V_{163}

สรุปผลการศึกษาเรื่องพืช/ป่าวากลิ้ง-กล่ำ/บริเวณที่สระดองคี่/บ้านกองมอหนอง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
89	เซียงยั้ง	เหิง		F_4, K_3, V_{164}
90	หละเหม	มือ		F_4, K_1
91	พุซ้องซี •	เผาะ		F_4, K_2, V_{165}
92	พุเซ่อเจ็ง	เผาะ		F_4, K_2, V_{166}
93	ทองมือ	เผาะ		F_4, K_2, V_{167}

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าเต็ง-ทีใน สถานที่ ไล่พอ-พาอี เกาะสะเก็ด

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
1	คองเขื่อน่า	มือ	กินเป็นผัก ค่าง ลิงกินยอด กินมากทำให้งวงนอน	F_4, K_1, E_1, E_2
2	พุด	เผาะ	ใช้ใบรักษาโรคอีสุกอีใส	F_4, K_2, E_3
3	พู่เจี๊	เผาะ	ลำต้นกินเป็นผัก หัวกินแก้หวัด หมูป่ากินหัว	F_4, K_2, E_1, E_2, E_3
4	ระกำป่า	เผาะ	คน กระรอก กระแต หมู กินลูก	F_4, K_1, E_1, E_2
5	สะโหน้	เทิง	สะตอป่า คนกินเมล็ด ลิง ค่างกินเมล็ด ยอด	F_4, K_3, E_1, E_2
6	เฒ่	เทิง	คนกินลูก เม่น มัง ลิง กระรอกกินลูก ต้นทำฟืนดี	F_4, K_3, E_1, E_2, E_5
7	วากลือ	เผาะ	ไม้บัง หน่อกินได้ ลิง หมูป่ากินหน่อ	F_4, K_1, E_1, E_2
8	หมี่ป้อซ่อง	เผาะ	ต้น ยอดกินได้ เก้งกินยอด นก ไก่ฟ้า มังกินลูก	F_4, K_1, E_1, E_2
9	พู่ผ้า	เผาะ	มัง กระรอกกินลูก ลิงกินแก่นใน	F_4, K_2, E_2
10	หม่องไผ่	เทิง	กระรอก ลิงลม อีเห็นกินลูกบนต้น ตกลงพื้น เม่น มังกิน ช้างกินปลายต้นอ่อน	F_4, K_3, E_2
11	เปอะไล่ตี	เทิง	นกกินลูก เลียงผากินยอด	F_4, K_3, E_2

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าเต็ง-ทีใน สถานที่ ไล่เพอ-พาอี เกาะสะเก็ง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
12	เปอะนาคองท่ง	มือ		F_4, K_1
13	หย่องเหม่งพู	เผาะ	กระรอก อีเห็นกินลูก	F_4, K_2, E_2
14	โค้วมือ	มือ	หมิ่นคน กระรอก กระแต อีเห็นกินลูก ตกลงพื้นเม่นกิน	F_4, K_1, E_2
15	คิมิทะ	เทิง	กระรอก เม่น มังกิน	F_4, K_2, E_2
16	ไซบ่ง	เผาะ	เปลือกลำตันใช้ทำเครื่องสานตระกร้า	F_4, K_2, E_5, V_{168}
17	เนอบง	เผาะ	เปลือกลำตันใช้สานตะกร้า ฝาบ้าน	F_4, K_2, E_5
18	เบ่กะชะเอ๋า	มือ		F_4, K_1
19	เคลอะกิมือ	มือ	ใช้แทนเชือกผูกสิ่งต่างๆ	F_4, K_1, E_5
20	ทิล่อง	เผาะ	ยอดกินได้	F_4, K_2, E_1
21	ฮู้	เทิง	อีเห็น กระรอก หมูป่า หมิ่นคนกินลูก	F_4, K_3, E_2
22	หละเหม่	มือ		F_4, K_1

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าเต็ง-ทีโน สถานที่ ไล่เพอ-พาอี เกาะสะเต็ง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
23	เซพูไค่	เทิง	เม่น มั่ง นกกินลูก	F ₄ , K ₃ , E ₂
24	ตะโปตะน่า	เทิง	เม่น มั่ง ค่างกินลูก	F ₄ , K ₃ , E ₂
25	หมักะเม่ว	เทิง		F ₄ , K ₃
26	วอง	พา	แก้ง เลี้ยงผากิน	F ₄ , K ₅ , E ₂
27	ไซเมยใจ	เผาะ	หัวใช้รักษาฟันเป็นแมง คนแก็กินกับหมาก	F ₄ , K ₂ , E ₁ , E ₃
28	ต่ง	เทิง	ลูกกินได้ ช้างกิน	F ₄ , K ₃ , E ₁ , E ₂
29	ไก่อุดูหย่ง	เผาะ	หัวใช้รักษาฟันเป็นแมง คนแก็กินกับหมาก	F ₄ , K ₂ , E ₅
30	ต่องกะเน่	เทิง	ใช้ต้นต้มกิน	F ₄ , K ₃ , E ₁
31	วากลือลา	เผาะ	ใช้ใบห่อข้าวเหนียว ลิงกินยอดอ่อน	F ₄ , K ₂ , E ₂ , E ₅
32	ปะไซทิ	เทิง	เลี้ยงผากิน	F ₄ , K ₃ , E ₂
33	เบ่จู้	มือ		F ₄ , K ₁

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าเต็ง-ทีโน สถานที่ ไล่เพอ-พาอี เกาะสะเต็ง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
34	จ๋องกะเหล่อ	มือ	ใช้น้ำจากก้านโดยตัดสดๆเอามาเป็นยาหยอดตา	F ₄ , K ₁ , E ₃
35	จ๋อเมว	เทิง	คนกินต้นอ่อน	F ₄ , K ₃ , E ₁
36	คาเซอ	เผาะ	หน่ออ่อนกิน ใบทำมุงหลังคาบ้าน กระรอก อีเห็นกินลูก	F ₄ , K ₂ , E ₁ , E ₂ , E ₅
37	เคอะคิปะหย่องต๋อง	เผาะ	กินได้รสหวาน	F ₄ , K ₂ , E ₁
38	เมโหยไหวี	เทิง	ลูกทำย้อมสีผ้า ลูกแก้งรสเปรี้ยว	F ₄ , K ₃ , E ₂ , E ₅
39	โพข่าจู้ข่าซ้อง	ทา	ใช้รักษาเคล็ดขัดยอก ใช้ต้นเผาแก้ปวดข้อมือ	F ₄ , K ₄ , E ₃
40	พู่ซ้อง	เทิง	ใช้ใบแก้ปวดบวม	F ₄ , K ₃ , E ₃
41	ชะน่านหย่อเดไซ้	มือ	กินไม่ได้จะเมา (ยาเบื่อ)	F ₄ , K ₁ , E ₅
42	กล่อต๋องมี	มือ	เม่น มัง กระรอก นก นมียอกกินลูก	F ₄ , K ₁ , E ₂
43	น่องปะอาย	เผาะ	ดอกกินได้ รสขม ใช้หว่ารักษาโรคฝีหนอง	F ₄ , K ₂ , E ₁ , E ₃
44	ซาไค้	เผาะ	ใช้ต้นตำแก้เคล็ดขัดยอก	F ₄ , K ₂ , E ₅

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าเต็ง-ทีใน สถานที่ ไล่เพอ-พาอี เกาะสะเต็ง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
45	ซูไล่	เผาะ	ต้นอ่อนกินได้ เป็นยาแก้ปวด	F ₄ , K ₂ , E ₁ , E ₃
46	ไซโหวู่	เหิง	ใช้ทำด้ามขวาน	F ₄ , K ₃ , E ₅
47	กล่งเค่อว	มือ	ใช้ต้นเป็นยาแก้กระษัย ใช้ใบชงชา	F ₄ , K ₁ , E ₁ , E ₃ , V ₁₆₉
48	กระช่องซิฟู	มือ	ใช้ใบทำเป็นที่รองยาสูบ	F ₄ , K ₁ , E ₅
49	เตซามิ	เหิง	ต้นใช้ทำคันไถ ให้ยางเข้าตาไม้ได้จะบอด	F ₄ , K ₃ , E ₅
50	ช่องเท	มือ	ลูกสีแดงใช้กินเป็นอาหาร นกกินลูก	F ₄ , K ₁ , E ₁ , E ₂
51	เนหม่องยะ	มือ	ใช้หัวเป็นยาแก้ฝี นำรากต้มกับน้ำเปล่าแก้ไอ เอาเปลือก ฝนและทาถอนพิษแมงบึ้ง	F ₄ , K ₁ , E ₃
52	ซ่งลาไฉ่	เผาะ	ใช้ลำต้นประกอบเป็นเครื่องดนตรี	F ₄ , K ₂ , E ₄
53	ทุลู่ไซ่หย่ง	มือ		F ₄ , K ₁
54	ซาพลูหย่ง	เหิง		F ₄ , K ₃
55	ซึยี้ไควว	เผาะ	ใช้รากต้มน้ำกินแก้ปวดเอว	F ₄ , K ₂ , E ₃

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าเต็ง-ทีโน สถานที่ ไล่เพอ-พาอี เกาะสะเด็ง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
56	เซทอလာ	เทิง		F_4, K_3, V_{170}
57	หลี่หย่ง	เทิง		F_4, K_3
58	จ๋องกะเหล่อหย่ง	มือ		F_4, K_1
59	ชื้อเบ่ฟู้	เทิง	เปลือกทารองที่นึ่งบนหลังช้าง	F_4, K_3, E_5
60	ชี่ทู่หย่ง	เทิง		F_4, K_3
61	น่องเพอะไซ้	มือ		F_4, K_1
62	เตฉ่องอี	เทิง	ใช้ทำเป็นพื้นไม้กระดาน	F_4, K_3, E_5
63	หลี่หล่งเผาะ	เทิง	ใช้เมล็ดสีแดงตกเป็นเหยื่อล่อปลา เอาใบฝนแล้วทาแก้ปวดหนองท้องอืด	F_4, K_3, E_5
64	กล่งไท่หย่ง	มือ		F_4, K_1

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
1	กุน่า	เหิง		F_6, K_3
2	ชนะนะ	เหิง	ลูกกินได้	F_6, K_3, E_1
3	กูเออนา	เหิง	ลูกกินได้	F_6, K_3, E_1
4	เค้ว	เหิง	ลูกกินได้	F_6, K_3, E_1
5	ซีเค้บอง	มือ		F_6, K_1
6	เปอะเดาะฉ่องดู	เหิง	เป็นต้นไม้ที่บอดฤดูกาลว่าฝนจะตกหนักหรือฝนแล้ง เช่น ออกลูกที่ยอดฝนจะตกต้นฤดูกาล ออกกลางต้นฝน ตกกลางฤดู ออกลูกปลายยอดแล้ง ยอดอ่อนกินได้ ใช้ เป็นยาแก้โรคบิด	F_6, K_3, E_1, E_3, E_5
7	กะว่อง	เหิง	ใช้รากกินกับพล	F_6, K_3, E_1
8	เซนองเอ	เหิง	ยอดกินได้	F_6, K_3, E_1
9	ซีคิมิ	มือ	ใช้ต้นต้มกินแก้ปวดหลัง ปวดเอว	F_6, K_1, E_1
10	เซอทุช่วย	เผาะ	เห็ดโคนกินได้	F_6, K_2, E_1
11	ชะเขาะ	เหิง	ยอดกินได้ ใช้ยางทาแก้โรคปากเปื่อย นกเงือกกินลูก	F_6, K_3, E_1, E_2, E_3

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
12	พุ่มงา	เผาะ	ถ้าขึ้นสูงขนาดเอวจะเป็นตัววัดว่าเป็นพื้นที่สภาพดินดี เหมาะสำหรับทำไร่ ถ้าหากว่าในพื้นที่นี้มีพืชชนิดนี้จะ ปลูกข้าว ข้าวโพดได้ดี	F ₆ , K ₂ , E ₅
13	ไผ่เขา	เหิง	ใช้ทำฟืน ขอบอยู่ใกล้น้ำ ขึ้น ถ้าขึ้นบนยอดเขาแสดงว่า ลักษณะเป็นดินขึ้น	F ₆ , K ₃ , E ₅
14	พล่า	เหิง	หมู เม่น มัง ลิง ค่าง หมี ชะนี คนกินลูก	F ₆ , K ₃ , E ₁ , E ₂
15	บัวคว่ำ	เหิง	ออกลูกช่วงเช้าพรรษา คนกินลูก	F ₆ , K ₃ , E ₂
16	ดิเตอะถิ	เหิง	ลูกกินได้ คนกิน	F ₆ , K ₃ , E ₁ , E ₂
17	ไฟฟู๊ดอง	พา	กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง ดอกสีแดง	F ₆ , K ₄ , E ₅
18	เผอะปะ	มือ	ตระกูลพลู	F ₆ , K ₁ , E ₁
19	หม่องหม่วยละ	เหิง	กินลูกได้ คล้ายมะเดื่อ จะอยู่ที่ขึ้น	F ₆ , K ₃ , E ₁
20	กูดี้	เหิง	เปลือกใช้ผสมหมากพลุกินได้ มีกลิ่นหอม	F ₆ , K ₃ , E ₁ , V ₁₇₁
21	ซีซุ	เหิง	ใช้ยอดกินสดแก้โรคบิด คน ไก่ฟ้า ไก่ป่ากินลูก	F ₆ , K ₃ , E ₃ , E ₂
22	ซูเบ่	เหิง	สะตอป่า ชะนี ค่าง คนกินลูก	F ₆ , K ₃ , E ₁ , E ₂

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
23	เก๋อเก	เหิง	ใช้ทำด้ามขวานด้ามมีด	F ₆ , K ₃ , E ₅
24	ซีโหว่	มือ	ใช้เถาต้มน้ำแก้ปวดเอว ปวดหลัง	F ₆ , K ₁ , E ₃
25	เซซามิ	เหิง	ยางมีพิษ ถ้าถูกตาอาจทำให้ตาบอด	F ₆ , K ₃ , E ₅
26	โพชวง	เหิง	ดอกสีขาว	F ₆ , K ₃ , E ₅
27	เมทะโล่	เหิง	ใบ ยอดอ่อนกินได้	F ₆ , K ₃ , E ₁
28	กูว่งเปอ	เหิง	ใบใช้เป็นเครื่องยา ผสมหลายชนิดทำเป็นยาต้ม	F ₆ , K ₃ , E ₃
29	ซีซละนองเพ่	เหิง	ใช้ต้มน้ำดื่มกับน้ำแก้แพ้อาหาร แพ้อากาศ	F ₆ , K ₂ , E ₃
30	กูเบาะ	เหิง	ใบปิ้งกับไฟกินได้ หมู หมี่ เม่น มังกินลูก	F ₆ , K ₃ , E ₁ , E ₂
31	ซีคื่อ	เหิง	กระรอก หมี่ หมู กินลูก	F ₆ , K ₃ , E ₂
32	เก๋อเก๋	เหิง	หมี่ หมูกินลูก	F ₆ , K ₃ , E ₂
33	ทุฟ่งบอง	เหิง	มะม่วงป่า ลิ้น ะนี คนกินลูก ออกลูกเดือน มี.ค. - เม.ย.	F ₆ , K ₃ , E ₁ , E ₂

สรุปผลการศึกษาเรื่องพืช/ปาวากลิ้ง-กล่า/บริเวณที่สระดองคี่/บ้านกอมองทะ

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
78	ชุยไล่ (ชู่ไล่)	เผาะ	ลำต้นกินได้ ดอกสีขาว ลิง ค่างกินต้น แก้วโรคเหนียวหอบร้อนใน	$F_4, K_2, E_1, E_2, E_3, V_{156}$
79	ชีช่วยบ่อง	มือ	น้ไม้ต้มแก้บิด ท้องเสีย	F_4, K_1, E_3, V_{157}
80	โพทุก	มือ	เอาหัวมาต้มแก้ปวดหลัง ปวดเอว ดอกสีแดงคล้ายดอกแค กินได้ ยอดกินได้	F_4, K_1, E_1, E_3
81	ชีขละนองเพ่	เทิง	นำต้น รากมาต้มให้เด็กอาบ กิน แก้วแสง ท้องร่วง ท้องเสีย	F_4, K_3, E_3, V_{158}
82	กุงกิ	เทิง	ใช้ลูกเป็นเหยื่อตกปลา นกกินผลสุก	F_4, K_3, E_2
83	ชีบาเกาะ	มือ	นำลำต้น ราก ใบมาต้มแก้ไอ หอบ หืด	F_4, K_1, E_3
84	ทะไม้บ่อง (ไท้ไม้บ่อง)	เทิง	เอาเปลือกมาแช่น้ำให้เด็กอาบ แก้วแสง	F_4, K_3, E_3, V_{159}
85	โพหล่าเขา	เผาะ	ดอกใช้บูชาพระ ออกเดือน ส.ค.	F_4, K_2, E_4, V_{160}
86	เหมปี (เหมปีง)	เทิง	เปลือกใช้ย้อมผ้า สีน้ำตาลแก่ นำเปลือกผสมน้ำปัสสาวะ+เกลือ ตำแล้วคั้นน้ำมาหยอดตา รักษาตาเจ็บ ตาอักเสบ	$F_4, K_3, E_3, E_5, V_{161}$
87	เซอองกว่า (เซยอองกว่า)	เทิง	ดอกสีขาว ผลเป็นฝักยาว ลิง ค่างกินยอด	F_4, K_3, E_2, V_{162}
88	ชีขละโพล (ชิงขละโพล)	มือ	เอาเถามาต้มให้เด็กกิน เป็นยาแก้ท้องเสีย	F_4, K_1, E_1, V_{163}

สรุปผลการศึกษาเรื่องพืช/ป่าวากลิ่น-กล่า/บริเวณที่สระทองคำ/บ้านกอมองทะ

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
89	เข่งยงอึ้ง	เหิง		F_4, K_3, V_{164}
90	หละเหม	มือ		F_4, K_1
91	พุซ่งซี •	เผาะ		F_4, K_2, V_{165}
92	พุเซอเจิง	เผาะ		F_4, K_2, V_{166}
93	ทองมือ	เผาะ		F_4, K_2, V_{167}

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าเต็ง-ทีใน สถานที่ ไล่พอ-พาอี เกาะสะเก็ง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
1	คองเขื่อน่า	มือ	กินเป็นผัก ค่าง ลิงกินยอด กินมากทำให้ง่วงนอน	F_4, K_1, E_1, E_2
2	พุด	เผาะ	ใช้ใบรักษาโรคผิวหนัง	F_4, K_2, E_3
3	พุเจ้	เผาะ	ลำต้นกินเป็นผัก หัวกินแก้หวัด หมูป่ากินหัว	F_4, K_2, E_1, E_2, E_3
4	ระกำป่า	เผาะ	คน กระรอก กระแต หมู กินลูก	F_4, K_1, E_1, E_2
5	สะไหนด	เทิง	สะตอป่า คนกินเมล็ด ลิง ค่างกินเมล็ด ยอด	F_4, K_3, E_1, E_2
6	เฒ	เทิง	คนกินลูก เม่น มัง ลิง กระรอกกินลูก ต้นทำฟืนดี	F_4, K_3, E_1, E_2, E_5
7	วากลือ	เผาะ	ไม่บ่ง นอนกินได้ ลิง หมูป่ากินหน่อ	F_4, K_1, E_1, E_2
8	หมีปือซอ	เผาะ	ต้น ยอดกินได้ แก้งกินยอด นก ไก่ฟ้า มังกินลูก	F_4, K_1, E_1, E_2
9	พูผ้า	เผาะ	มัง กระรอกกินลูก ลิงกินแก่นใน	F_4, K_2, E_2
10	หม่องไผ่	เทิง	กระรอก ลิงลม อีเห็นกินลูกบนต้น ตกลงพื้น เม่น มังกิน ข้างกินปลายต้นอ่อน	F_4, K_3, E_2
11	เปอะไผ่	เทิง	นกกีบลูก เลียงผากินยอด	F_4, K_3, E_2

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าเต็ง-ทีใน สถานที่ ไล่พอ-พาวี เกาะสะเก็ด

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
12	เปอะนาคองท่ง	มือ		F ₄ , K ₁
13	หย่งเหม่งพู	เผาะ	กระรอก อีเห็นกินลูก	F ₄ , K ₂ , E ₂
14	โค้วมือ	มือ	หมิ่นคน กระรอก กระแต อีเห็นกินลูก ตกลงพื้นเม่นกิน	F ₄ , K ₁ , E ₂
15	คิม๊ะ	เทิง	กระรอก เม่น มั่งกิน	F ₄ , K ₂ , E ₂
16	ไซบ่ง	เผาะ	เปลือกลำตันใช้ทำเครื่องสานตระกร้า	F ₄ , K ₂ , E ₅ , V ₁₆₈
17	เนอบง	เผาะ	เปลือกลำตันใช้สานตะกร้า ฝาบ้าน	F ₄ , K ₂ , E ₅
18	เบ่กะชะเอ๋า	มือ		F ₄ , K ₁
19	เคลอะกิมือ	มือ	ใช้แทนเชือกผูกสิ่งต่างๆ	F ₄ , K ₁ , E ₅
20	ทิล่อง	เผาะ	ยอดกินได้	F ₄ , K ₂ , E ₁
21	ซู้	เทิง	อีเห็น กระรอก หมูป่า หมิ่นคนกินลูก	F ₄ , K ₃ , E ₂
22	หละเหม่	มือ		F ₄ , K ₁

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าเต็ง-ทีใน สถานที่ ไล่เพอ-พาอี เกาะสะเต็ง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
23	เซพูไค่	เทิง	เม่น มั่ง นกกินลูก	F ₄ , K ₃ , E ₂
24	ตะโปตะน่า	เทิง	เม่น มั่ง ค่างกินลูก	F ₄ , K ₃ , E ₂
25	หมี่กะเม่ว	เทิง		F ₄ , K ₃
26	วอง	พา	แก้ง เลียงผากิน	F ₄ , K ₅ , E ₂
27	ไซเมยใจ	เผาะ	หัวใช้รักษาฟันเป็นแมง คนแกกินกับหมาก	F ₄ , K ₂ , E ₁ , E ₃
28	ต่ง	เทิง	ลูกกินได้ ช้างกิน	F ₄ , K ₃ , E ₁ , E ₂
29	ไก่อุดูหย่ง	เผาะ	หัวใช้รักษาฟันเป็นแมง คนแกกินกับหมาก	F ₄ , K ₂ , E ₅
30	ต่องกะเน่	เทิง	ใช้ต้นต้มกิน	F ₄ , K ₃ , E ₁
31	วากลือลา	เผาะ	ใช้ใบห่อข้าวเหนียว ลิงกินยอดอ่อน	F ₄ , K ₂ , E ₂ , E ₅
32	ปะโชทิ	เทิง	เลียงผากิน	F ₄ , K ₃ , E ₂
33	แป้จู้	มือ		F ₄ , K ₁

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าเต็ง-ทีใน สถานที่ ไล่เพอ-พาอี เกาะสะเต็ง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
34	จ่องกะเหล่อ	มือ	ใช้น้ำจากก้านโดยตัดสดๆเอามาเป็นยาหยอดตา	F ₄ , K ₁ , E ₃
35	จ่อเมว	เทิง	คนกินต้นอ่อน	F ₄ , K ₃ , E ₁
36	คาเซอ	เผาะ	หน่ออ่อนกิน ใบทำมุงหลังคาบ้าน กระรอก อีเห็นกินลูก	F ₄ , K ₂ , E ₁ , E ₂ , E ₅
37	เคอะคิปะหย่องต่อง	เผาะ	กินได้รสหวาน	F ₄ , K ₂ , E ₁
38	เมโหยไหวี	เทิง	ลูกทำย้อมสีผ้า ลูกแก้งรสเปรี้ยว	F ₄ , K ₃ , E ₂ , E ₅
39	โพข้าจู้ข้าซ้อง	ทา	ใช้รักษาเคล็ดขัดยอก ใช้ต้นเผาแก้ปวดข้อมือ	F ₄ , K ₄ , E ₃
40	พูซ้อง	เทิง	ใช้ใบแก้ปวดบวม	F ₄ , K ₃ , E ₃
41	ชะน่าย่อยเดไซ้	มือ	กินไม่ได้จะเมา (ยาเบื่อ)	F ₄ , K ₁ , E ₅
42	กล่อต่องมี	มือ	เม่น มัง กระรอก นก หมีขอกินลูก	F ₄ , K ₁ , E ₂
43	น่องปะอาย	เผาะ	ดอกกินได้ รสขม ใช้ห้รักษาโรคฝีหนอง	F ₄ , K ₂ , E ₁ , E ₃
44	ชาได้	เผาะ	ใช้ต้นตำแก้เคล็ดขัดยอก	F ₄ , K ₂ , E ₅

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าเต็ง-ทีโน สถานที่ ไล่เพอ-พาอี เกาะสะเต็ง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
45	ทุไล่	เผาะ	ต้นอ่อนกินได้ เป็นยาแก้ปวด	F ₄ , K ₂ , E ₁ , E ₃
46	ไซโหวู่	เทิง	ใช้ทำด้ามขวาน	F ₄ , K ₃ , E ₅
47	กล่งเค่อว	มือ	ใช้ต้นเป็นยาแก้กระษัย ใช้ใบชงชา	F ₄ , K ₁ , E ₁ , E ₃ , V ₁₆₉
48	กระช่องขีฟู่	มือ	ใช้ใบทำเป็นที่รองยาสูบ	F ₄ , K ₁ , E ₅
49	เตชามี	เทิง	ต้นใช้ทำคันไถ ให้ยางเข้าตาไม้ได้จะบอด	F ₄ , K ₃ , E ₅
50	ชองเท	มือ	ลูกสีแดงใช้กินเป็นอาหาร นกกินลูก	F ₄ , K ₁ , E ₁ , E ₂
51	เนหม่องยะ	มือ	ใช้หัวเป็นยาแก้ฝี นำรากต้มกับน้ำปลาแก้ไอ เอาเปลือกฝนและทาถอนพิษแมงป่อง	F ₄ , K ₁ , E ₃
52	ซ่งลาไ้	เผาะ	ใช้ลำต้นประกอบเป็นเครื่องดนตรี	F ₄ , K ₂ , E ₄
53	ทุลู่ไซหย่ง	มือ		F ₄ , K ₁
54	ชาพลูหย่ง	เทิง		F ₄ , K ₃
55	ซียี้ไควว	เผาะ	ใช้รากต้มน้ำกินแก้ปวดเอว	F ₄ , K ₂ , E ₃

ตารางแสดงรายชื่อพืชที่สำรวจพบในป่าเต็ง-ทีใน สถานที่ ไล่เพอ-พาอี เกาะสะเต็ง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
56	เซท้อลา	เถิง		F ₄ , K ₃ , V ₁₇₀
57	หลี่หย่ง	เถิง		F ₄ , K ₃
58	จ๋องกะเหล่อหย่ง	มือ		F ₄ , K ₁
59	ชื่อเบ่พู้	เถิง	เปลือกทารองที่นึ่งบนหลังช้าง	F ₄ , K ₃ , E ₅
60	ชี่ทูหย่ง	เถิง		F ₄ , K ₃
61	น้องเพอะไซ้	มือ		F ₄ , K ₁
62	เตฉ่องฉิ	เถิง	ใช้ทำเป็นพื้นไม้กระดาน	F ₄ , K ₃ , E ₅
63	หลี่หล่งเผาะ	เถิง	ใช้เมล็ดสีแดงตกเป็นเหยื่อล่อปลา เอาใบฝนแล้วทาแก้ปวดหนองท้องอืด	F ₄ , K ₃ , E ₅
64	กล่งไท่หย่ง	มือ		F ₄ , K ₁

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
1	ภู่น้ำ	เหิง		F_6, K_3
2	ชะนะ	เหิง	ลูกกินได้	F_6, K_3, E_1
3	ภูเอ่อนา	เหิง	ลูกกินได้	F_6, K_3, E_1
4	เคี้ยว	เหิง	ลูกกินได้	F_6, K_3, E_1
5	ชีเค็บอง	มือ		F_6, K_1
6	เปอะเดาะช่องดู	เหิง	เป็นต้นไม้ที่บอดฤดูกาลว่าฝนจะตกหนักหรือฝนแล้ง เช่น ออกลูกที่ยอดฝนจะตกต้นฤดูกาล ออกกลางต้นฝน ตกกลางฤดู ออกลูกปลายยอดแล้ง ยอดอ่อนกินได้ ใช้ เป็นยาแก้โรคบิด	F_6, K_3, E_1, E_3, E_5
7	กะว่อง	เหิง	ใช้รากกินกับพล	F_6, K_3, E_1
8	เชนองเอ๋	เหิง	ยอดกินได้	F_6, K_3, E_1
9	ชีคีมิ	มือ	ใช้ต้นต้มกินแก้ปวดหลัง ปวดเอว	F_6, K_1, E_1
10	เช่อทู่ช่วย	เผาะ	เห็ดโคนกินได้	F_6, K_2, E_1
11	ชะเขาะ	เหิง	ยอดกินได้ ใช้ยางทาแก้โรคปากเปื่อย นกเงือกกินลูก	F_6, K_3, E_1, E_2, E_3

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
12	พุ่มงา	เผาะ	ถ้าขึ้นสูงขนาดเอวจะเป็นตัววัดว่าเป็นพื้นที่สภาพดินดี เหมาะสำหรับทำไร่ ถ้าหากว่าในพื้นที่นี้มีพืชชนิดนี้จะ ปลูกข้าว ข้าวโพดได้ดี	F ₆ , K ₂ , E ₅
13	ไผ่เขาะ	เหิง	ใช้ทำฟืน ชอบอยู่ใกล้น้ำ ขึ้น ถ้าขึ้นบนยอดเขาแสดงว่า ลักษณะเป็นดินขึ้น	F ₆ , K ₃ , E ₅
14	พล่า	เหิง	หมู เม่น มัง ลิง ค่าง หมี ชะนี คนกินลูก	F ₆ , K ₃ , E ₁ , E ₂
15	บัวโค้ว	เหิง	ออกลูกช่วงเช้าพรรษา นกกินลูก	F ₆ , K ₃ , E ₂
16	ดิเตอะถิ	เหิง	ลูกกินได้ นกกิน	F ₆ , K ₃ , E ₁ , E ₂
17	ไฟฟูต้อง	พา	กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง ดอกสีแดง	F ₆ , K ₄ , E ₅
18	เผาะปะ	มือ	ตระกูลพลู	F ₆ , K ₁ , E ₁
19	หม่องหม่วยกะ	เหิง	กินลูกได้ คล้ายมะเดื่อ จะอยู่ที่ขึ้น	F ₆ , K ₃ , E ₁
20	กุลี	เหิง	เปลือกใช้ผสมหมากพลูกินได้ มีกลิ่นหอม	F ₆ , K ₃ , E ₁ , V ₁₇₁
21	ซีซุ	เหิง	ใช้ยอดกินสดแก้โรคบิด นก ไก่ฟ้า ไก่ป่ากินลูก	F ₆ , K ₃ , E ₃ , E ₂
22	ซูเบ่	เหิง	สะตอป่า ชะนี ค่าง คนกินลูก	F ₆ , K ₃ , E ₁ , E ₂

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
23	เกอเก	เหิง	ใช้ทำด้ามขวานด้ามมีด	F ₆ , K ₃ , E ₅
24	ซีโ้ว	มือ	ใช้เถาต้มกินแก้ปวดเอว ปวดหลัง	F ₆ , K ₁ , E ₃
25	เซซามิ	เหิง	ยางมีพิษ ถ้าถูกตาอาจทำให้ตาบอด	F ₆ , K ₃ , E ₅
26	โพขว้าง	เหิง	ดอกสีขาว	F ₆ , K ₃ , E ₅
27	เมทะโล่	เหิง	ใบ ยอดอ่อนกินได้	F ₆ , K ₃ , E ₁
28	กูวองเปอ	เหิง	ใบใช้เป็นเครื่องยา ผสมหลายชนิดทำเป็นยาต้ม	F ₆ , K ₃ , E ₃
29	ซีซะนองเพ่	เหิง	ใช้ต้มน้ำดื่มกับน้ำแกงเพื่ออาหาร เพื่ออากาศ	F ₆ , K ₂ , E ₃
30	กูเบาะ	เหิง	ใบปิ้งกับไฟกินได้ หมู หมี่ เม่น มังกินลูก	F ₆ , K ₃ , E ₁ , E ₂
31	ซีคื่อ	เหิง	กระรอก หมี่ หมู กินลูก	F ₆ , K ₃ , E ₂
32	เกอگوی	เหิง	หมี่ หมูกินลูก	F ₆ , K ₃ , E ₂
33	ซุหุงบ่อง	เหิง	มะม่วงป่า ลิ้ง ชะนี คนกินลูก ออกลูกเดือน มี.ค. - เม.ย.	F ₆ , K ₃ , E ₁ , E ₂

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
34	คาเซ่อ	เหิง	หวายขม	F ₆ , K ₃ , E ₁
35	เจอะสะไห่ว	มือ	เถาต้มกินได้	F ₆ , K ₁ , E ₁
36	ชีช่วยป่อง	มือ	ต้มกินแก้บิด	F ₆ , K ₁ , E ₃
37	ซังคัง	เหิง	ดอกสีแดง	F ₆ , K ₃ , E ₅
38	โพซ่องเหย่	เหิง		F ₆ , K ₃
39	หยี่ชะ	เหิง	เป็นเครื่องยา ดอกสีขาว	F ₆ , K ₃ , E ₃
40	พูซ่องซี	เผาะ	ห้วกินได้	F ₆ , K ₂ , E ₁
41	เซอู่	เหิง		F ₆ , K ₃

ตารางรายละเอียดการใช้ประโยชน์จากพืชในป่าเต็งรัง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
1	ไผ่ปล้อง	เผาะ	หัวใช้ถอนพิษงู ตะขบ ลำต้นใช้สานเสื่อ ตะกร้า	F ₇ , K ₂ , E ₃ , E ₅
2	มะอึง	พา	ลูกอยู่โคนต้นเป็นพวงๆ เม็ดเล็กๆสีดำ ใช้เป็นยาแก้ ความดันต่ำ รสเผ็ดหอม	F ₇ , K ₄ , E ₃
3	เพ็ญคำ	เทิง		F ₇ , E ₃
4	เขยพู่เขือ	เทิง	ใบ, ต้น ใช้เป็นยาแก้ท้องอืด	F ₇ , K ₃ , E ₃
5	พลู	มือ	ลูกกินได้ อีเห็นกิน ลูกสีเหลือง รสหวาน เข้ายาแก้โรค บวม	F ₇ , K ₁ , E ₁ , E ₂ , E ₃
6	เสาะปะยู๋	มือ	ใบมีกลิ่นหอมใช้ทำขนม	F ₇ , K ₁ , E ₁
7	เขยทุค้าย	เทิง	ลูกสีแดง เม็ดสีดำ	F ₇ , K ₃ , E ₅
8	เยอะคุคุย	เทิง	ใช้ทำด้ามขวานดี	F ₇ , K ₃ , E ₅
9	ซุเบ่	เทิง	ใช้ทำด้ามขวาน ลูกกินได้	F ₇ , K ₃ , E ₁ , E ₅
10	ไกรกร่ง	เทิง	ลูกกินได้ทั้งคนและสัตว์	F ₇ , K ₃ , E ₁ , E ₂
11	คิทู	เทิง	ลูกกินได้สีเหลือง	F ₇ , K ₃ , E ₁

ตารางรายละเอียดการใช้ประโยชน์จากพืชในป่าเต็ง-เซ

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
12	ช้องเทย	มือ	ลูกสีแดง เบรียวผาด	F_7, K_1, E_1
13	ต่องกะโม้	มือ	เป็นยาแก้ปวดเอว	F_7, K_1, E_3, V_{172}
14	ชีชู	เผาะ	ต้น, ใบ ใช้ต้มอาบแก้แพ้	F_7, K_2, E_3
15	โกลี	เทิง	เป็นยาแก้โรคมะเร็ง ต้องผสมยาหลายขนาน	F_7, K_3, E_3
16	เกรียวเจิงมวย	มือ		F_7, K_1, V_{173}
17	พุกวยหึงอะ	มือ	ใบเปรี้ยวใช้แกง	F_7, K_1, E_1
18	เซยอ้วลา	เทิง		F_7, K_3, V_{174}
19	เซยเซอไชวโน้	เทิง	ใช้ทำด้ามขวาน	F_7, K_3, E_5, V_{175}
20	ละหม่งเย	เทิง	ลำใบป่า ลูกกินได้	F_7, K_3, E_1, V_{176}
21	เซอก่องกะ	มือ	เป็นกาฝากชนิดหนึ่ง	F_7, K_1, E_5, V_{177}
22	เมหะ	เทิง	ลูก นก กระรอกกิน	F_7, K_3, E_2, V_{178}

ตารางรายละเอียดการใช้ประโยชน์จากพืชในป่าเต็งรัง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
23	ไผ่จุมิแดง	มือ		F_7, K_1, V_{179}
24	ไผ่คุดหย่ง	เผาะ		F_7, K_2
25	เขยโกวไกร	มือ		F_7, K_1, V_{180}
26	จื่อ	เหิง	ลูกสีแดงมันชอบกิน ใช้ย่างทำยางน่อง	$F_7, K_3, E_2, E_5, V_{181}$
27	เขยวาลา	เหิง	ใช้ในทางไสยศาสตร์ เช่น เส้าบ้านดกน้ำมัน ทำเป็นลิ่มไปปักไว้ ใช้ทำทพตีเวลากินข้าว ทำให้อิ่มได้นาน	$F_7, K_3, E_4, E_5, V_{182}$
28	โพรงอั่ว	เหิง	ขี้ใบผสมน้ำ ทาแก้กลากเกลื้อน	F_7, K_3, E_3
29	เขยอาลา	เหิง		F_7, K_3
30	กล่งโคง	มือ		F_7, K_1
31	เสอะน่าเสอะไหร่	มือ		F_1, K_1
32	สระทุ	เหิง	มะไฟป่า เป็นยาระบาย	F_7, K_3, E_3
33	ก๊วะพูไซ	เหิง	ใบอ่อนแกงส้มอร่อย	F_7, K_3, E_1, V_{183}

ตารางรายละเอียดการใช้ประโยชน์จากพืชในป่าเตอ-เซ

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
34	เซยพ่องบ่ง	เหิง		F_7, K_3, V_{184}
35	ทะเช่า	เหิง	ยอดกินได้ ใช้ยางทาแก้ปากนกกระจอก	F_7, K_3, E_1, E_3
36	กะว่อง	เหิง	ลูกใช้เป็นยาแก้โรคความดันต่ำ	F_7, K_3, E_3
37	ซ่องหรีมือเม	เผาะ	ใบตากแห้งใช้สานเสื่อ	F_7, K_2, E_3

ตารางสำรวจการใช้ประโยชน์จากพืชในป่าเต็งรัง-เต็งรัง

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
1	คองเขื่อนา	มือ	ยอดกินได้	F_8, K_1, E_1
2	เซพูไค้	เทิง	ใช้ทำเสา ไม้กระดาน เมา่ นกกินลูก	F_8, K_3, E_2, E_5
3	เมียพะเลอะ	เทิง	ลูกใช้ชักผ้าได้	F_8, K_3, E_5
4	ไฟไม่จ้อง	เทิง	ลูกกินได้ นกกิน	F_8, K_3, E_1, E_2
5	เซพูกุ	เทิง	นก เมา่กินลูก	F_8, K_3, E_2
6	กลีหวั	เทิง	หวาย อีเห็นกินลูก ใบใช้ทำหลังคา	F_8, K_3, E_2, E_5
7	ไฟ	เทิง	กวาง เก้งกินลูก	F_8, K_3, E_2
8	หล่งมา	เทิง	เก้ง กววงกินลูก	F_8, K_3, E_2
9	ช่องพ่า	เทิง	ใช้ทำไม้กระดาน เสา	F_8, K_3, E_5
10	ซุทิตะ	เทิง	มะม่วง ลูกกินได้	F_8, K_3, E_1
11	เมียอ	เทิง	มีลูก เข้ายาแก้ไข้	F_8, K_3, E_3

ตารางสำรวจการใช้ประโยชน์จากพืชในป่าเต็งรัง-เขาหินซ้อน

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
12	หม่าที	เหิง	ลูกกินไม่ได้ ใช้ทำฟืน กระดาน	F ₈ , K ₃ , E ₅
13	พล่า	เหิง	ใช้ทำฟืน คน นก อีเห็นกินลูก	F ₈ , K ₃ , E ₁ , E ₂ , E ₅
14	กุ๊ก	เหิง	ใช้รากเป็นยาแก้โรคท้องเสีย บิด นกกินลูก	F ₈ , K ₃ , E ₂ , E ₃
15	โพกจ่อง	เหิง	ใช้ทำฟืน	F ₈ , K ₃ , E ₅ , V ₁₈₆
16	โพทะเซ่อ	เหิง	ดอกสีแดง ออกช่วงเช้าพรรษา นำไปถวายพระ	F ₈ , K ₃ , E ₄
17	ลากลือ	เผาะ	ใช้ใบห่อขนม	F ₈ , K ₂ , E ₅
18	ชีฮ่องกะริ	เผาะ	ใช้รากอุดฟัน แก้ปวดฟัน	F ₈ , K ₂ , E ₃
19	โพมือล่องไล่	เหิง	ใช้ใบย่างไฟประคบแก้ปวดแขน ปวดขา	F ₈ , K ₃ , E ₃
20	โพมิ	เหิง	ลิ้นจี่ป่า ลูกกินได้ อีเห็น ค่างกินลูก	F ₈ , K ₃ , E ₁ , E ₂
21	พุดทอง	เผาะ	ดอกกินได้	F ₈ , K ₂ , E ₁
22	หย่องท่า	เผาะ	หว่ายชนิดหนึ่ง ใช้ทำเฟอนิเจอร์	F ₈ , K ₂ , E ₅

ตารางสำรวจการใช้ประโยชน์จากพืชในป่าเต็งรัง-เขาหินซ้อน

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
23	พุดหัว	เหิง	ยอดกินได้	F ₈ , K ₃ , E ₁

ตารางแสดงรายชื่อพรรณพืชที่สำรวจพบในป่าเวียแซกล่า

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
1	ตะเบาะเวีย	เผาะ	ชะนีค่างกินผล	F ₂ , K ₂ , E ₂ , V ₆₃
2	ตชีคาญ	มือ	ยาแก้แพ้	F ₃ , K ₁ , E ₃ , V ₆₄
3	ยาลี่มีชา	มือ	แก้โรคปากเปื่อย	F ₃ , K ₁ , E ₃ , V ₆₅
4	ฉวงเปอนามอง	เหิง	รักษาโรคคันตามผิวหนัง	F ₂ , K ₃ , E ₃ , V ₆₆
5	สะพลูลู่หล่ง	เผาะ	ต้มกิน แก้ไอ หอบหืด	F ₃ , K ₂ , E ₃ , V ₆₇
6	ลาซ่าย	เผาะ	ใช้ใบห่อขนม	F ₂ , K ₂ , E ₁
7	เซกะช่องออง	เหิง	ข้างกินเปลือก	F ₃ , K ₃ , E ₂ , V ₆₈
8	พูลี	เผาะ	ดอก หน่อ หัว กินเป็นผัก ออกเดือน ก.ย.	F ₂ , K ₂ , E ₁ , V ₆₉
9	เซช่องช่วย	เหิง		F ₂ , K ₃
10	ควอย่ง	เหิง		F ₂ , K ₃ , V ₇₀
11	ชาไค่	เผาะ	ตำทั้งต้น ราก พอกแก้ขัดยอก	F ₂ , K ₂ , E ₃

ตารางแสดงรายชื่อพรรณพืชที่สำรวจพบในป่าเวียแซกล่า

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
12	พุไชลที	เผาะ	ลำต้นกินเป็นผัก ทั้งกินแก้วัด หมูปากินหัว	F ₂ , K ₂ , E ₁ , E ₂ , E ₃ , V ₇₁
13	ซีมาหนี่มา	มือ	กระตุนความรู้สึกทางเพศ	F ₂ , K ₁ , E ₃
14	กะว่อง	เทิง	ใช้รากกินกับพล	F ₂ , K ₃ , E ₁
15	กลือซา	เผาะ		F ₂ , K ₂ , V ₇₂
16	พุเหลือป่า	เผาะ	เป็นยาบำรุงเลือด	F ₂ , K ₂ , E ₃ , V ₇₃
17	กลีไหว	เทิง	หวาย อีเห็นกินลูก ใบใช้ทำหลังคา	F ₂ , K ₃ , E ₂ , E ₅
18	เซพูกุ	เทิง	นก เม่น กินลูก	F ₂ , K ₃ , E ₂
19	ตะโปตะน่า	เทิง	เม่น มัง ค่าง กินลูก	F ₂ , K ₃ , E ₂
20	จะไ่วยะดู	มือ	แก้ท้อง (บิด)	F ₂ , K ₁ , E ₃
21	กะโหลวไหว	เทิง		F ₂ , K ₃

ตารางแสดงรายชื่อพรรณพืชที่สำรวจพบในป่าเวียแซกล้า

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
22	ที	มือ		F ₂ , K ₁ , V ₇₅
23	ไก่อ	เผาะ	เป็นกอ ดอกทำไม้กวาด ใบใช้ห่อข้าวเหนียวในงานพิธีกรรม (ปือซ่องดู) ช้างกินใบ, นำหน่อลนไฟให้นุ่มแล้วเอาน้ำหยอดหุงรักษาหูน้าหนวก	F ₂ , K ₂ , E ₂ , E ₃ , E ₄ , E ₅
24	หล่องเหม	มือ	รักษาโรคเท้าเปื่อย, ปากเปื่อยของวัวควาย	F ₂ , K ₁ , E ₃ , V ₇₆
25	เหมฆองมือ	มือ		F ₂ , K ₁ , V ₇₇
26	ไขว้หย่ง(โห่งหย่ง)	มือ	ยาลดไข้เด็ก	F ₂ , K ₁ , E ₃
27	พูเสือ	เผาะ	กินยอดเป็นผัก	F ₂ , K ₂ , E ₁
28	เนหม่องยะ	มือ	ใช้หัวเป็นยาแก้ฝี, นำรากต้มกับน้ำเปล่าแก้ไอ เอาเปลือกฝนแล้วทาถอนพิษแมงป่อง	F ₁ , K ₂ , E ₁ , E ₃
29	นองเซเปิล	เผาะ	หยุดเลือดกำเดาไหล, ห้ามเลือดจากบาดแผลโดย ของมีคม, ยอดอ่อนเอาเปลือกออกทาเกลือเสียบทวาร เด็กแก้ท้องผูก เอาใบเช็ดกันรักษาโรคบิด	F ₁ , F ₂ , F ₃ , K ₂ , E ₃
30	เนเหม	มือ		F ₁ , F ₂ , K ₁
31	เซอะต้องล้อง	เผาะ		F ₂ , K ₂
32	ทะดู	มือ	แก้ชักเสบ, บวม	F ₂ , K ₂ , E ₃

ตารางแสดงรายชื่อพรรณพืชที่สำรวจพบในป่าเหียงเขากล้า

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
33	คูมะกู	เผาะ		F ₃ , K ₂ , E ₃ , V ₈₁
34	มือมือคว่ำคว่ำ	เผาะ	ใบทำเชือก	F ₃ , K ₂ , E ₃ , V ₈₂
35	ซังลาอะ	เผาะ	ใบทำเชือก	F ₁ , F ₃ , K ₂ , E ₅
36	คล้า	เหิง	แก้ท้องเสีย นำยอดมาต้มกับน้ำกิน เปลือกใช้ ย้อมผ้า ออกสีน้ำตาลแก่	F ₂ , K ₃ , E ₃ , E ₅ , V ₈₃
37	ผะโค	เหิง	ผลขนาดใหญ่กินได้ รสหวาน	F ₂ , K ₃ , E ₁
38	พุเต้อป่า	เผาะ		F ₂ , K ₂
39	ตชีคาเหียง	มือ		F ₂ , K ₁
40	เคอเรือะ	พา		F ₂ , K ₄
41	ตำลอง / กำลั้ง	เหิง	ยาชูกำลัง, ใช้รากต้มกับน้ำ	F ₃ , K ₃ , E ₃ , V ₈₅
42	ทุชะมือ	เผาะ	นกยูงกินได้ ใบป่า ออกรวงพร้อมข้าว	F ₃ , K ₂ , E ₂ , V ₈₆
43	ต่องหะ	มือ	เป็นเถาใหญ่ออกลูกช่วง เม.ย. เหาลูกเหากินได้ ถ้ากินมากๆจะเมา ถ้าตกพื้นเม่นจะกิน และเป็น ยารักษาสดริบวม แผลเสือกัด ลูกอ่อนลิง ค่างกิน	F ₂ , K ₁ , E ₁ , E ₂ , E ₃ , V ₈₇

ตารางแสดงรายชื่อพรรณพืชที่สำรวจพบในป่าเวียแซกล่า

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
44	เซ็กกีญ	เถิง	ลูกสีแดง ช้างในสีขาว นกตัวเล็กกินเม็ด ปลากินใบ	F ₃ , K ₃ , E ₂ , V ₈₈
45	หรงจี้คว่า	เถิง	ยาแก้ไอ เอรากมาต้มน้ำกิน เอาใบอ่อนผสมปูนขาวทาแก้กลากเกลื้อน	F ₃ , K ₃ , E ₃ , V ₈₉
46	สะนีวอ้ว	มือ	เอาต้นกินเป็นผัก	F ₃ , K ₁ , E ₁ , V ₉₀
47	นองซา	เถิง	ดอกสีขาว ลูกสีดำ ออกดอกเดือน เม.ย. ออกลูกหน้าฝน รสเปรี้ยวอมหวาน เอาเปลือกผสมข้าวตำทาแก้ฝี และ ประโยชน์สำหรับนกไว้ใช้กินลูก	F ₃ , K ₃ , E ₂ , E ₃ , V ₉₁
48	ซีเลื่อผลีที	เผาะ		F ₃ , K ₂ , V ₉₂
49	ตซีชะโหวหมิ	เผาะ		F ₃ , K ₂ , V ₉₃
50	หญ่ายหย่ง	เถิง	ลูกกวาวกิน ลูกสีเขียวเหลือง พระใช้ต้มน้ำดื่ม ส่วนลูกเอามาตำน้ำกั๊ดเท้า	F ₂ , K ₃ , E ₂ , E ₃ , E ₅
51	เซซีโหว	เถิง	เอาแก่นสีดำทำด้ามมีด เอาแก่นทำหวีทอผ้า	F ₂ , K ₃ , E ₅
52	มื	เถิง	รากเป็นยาแก้ไข้ ร้อนใน เอาใบมุงหลังคา ไปใช้พรมน้ำมนต์ กระติง กวาง แก้งกินต้น	F ₂ , K ₃ , E ₂ , E ₃ , E ₄ , E ₅
53	ไซว	เถิง	ไม้เนื้ออ่อน ลูกสีแดง เปลือกทำเชือกต่างๆ ลูกกินได้	F ₃ , K ₃ , E ₁ , E ₅ , V ₉₄
54	กลือ	เถิง	ลูกสีเหลือง แก้ง กวาง กินลูก เปลือก ลูกแก้ไอ แก้คันคอ	F ₂ , K ₃ , E ₂ , E ₃

ตารางแสดงรายชื่อพรรณพืชที่สำรวจพบในป่าเวียแซกล้า

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
55	เหมีปี	เผาะ	เปลือกตำละเอียด ผสมกับปัสสาวะแก้เจ็บตา	F ₂ , K ₂ , E ₃ , V ₉₅
56	เพอชะซ่าย	เหิง	มีลูกสีแดง กลิ่นหอม กินได้ รสเปรี้ยว เป็นยาแก้ฝี เอาหัวขูดผสมข้าวปะหัวฝี ดูดหนอง แก้อักเสบ	F ₃ , K ₃ , E ₁ , E ₃ , V ₉₆
57	หยีไหล่ว	เหิง	ลูกสีเขียว ยอดกินเป็นผัก	F ₃ , K ₃ , E ₁ , V ₉₇
58	มีเซญ	เหิง		F ₂ , K ₃
59	อวล่องพู	เผาะ	ต้มกินกับข้าว	F ₃ , K ₂ , E ₁ , V ₉₈
60	โพคูจ่อง	เหิง	เอาเปลือกมาต้มแก้บิด ลูกคล้ายเม็ดยาสูบ	F ₃ , K ₂ , E ₃ , V ₉₉
61	แบ่งยาฮือเหม	มือ	ลูกคล้ายถั่ว นกกิน	F ₂ , K ₁ , E ₂
62	จ่องปีไหลอเค่	เหิง		F ₃ , K ₃ , V ₁₀₀
63	โพกิ	เหิง	ลูกสีเขียว ลูกสีแดงกินไม่ได้(คัน)	F ₃ , K ₃ , V ₁₀₁
64	อ้อ่าย	เผาะ		F ₂ , K ₂
65	ปะชุย	เหิง	ลำต้นใหญ่ ใบมวนยาสูบ เอาเปลือกมาต้มแก้โรคท้องบิด ต้มให้น้ำแห้ง	F ₃ , K ₃ , E ₃ , E ₅ , V ₁₀₂

ตารางแสดงรายชื่อพรรณพืชที่สำรวจพบในป่าเวียแซกล่า

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
66	หละชูเหม	เถิง		F ₃ , K ₃ , V ₁₀₃
67	ตงตะหล่อง	มือ	ตัดเอาน้ำปากเถา กินแก้บิด	F ₃ , K ₁ , E ₃ , V ₁₀₄
68	เซหย่งชะ	เถิง	เปลือกย้อมสวึง แห	F ₁ , F ₂ , F ₃ , K ₃ , E ₅
69	วอง	พา	กระพิง กวาง ช้าง สัตว์เลี้ยง	F ₂ , K ₄ , E ₂
70	พู่เลื้อ	พา	ยอดกินได้	F ₂ , K ₄ , E ₁
71	ปี่ล่อง	เถิง	มีลูกสีเขียว รสฝาด แก้งกิน กระรอกดงกิน	F ₂ , K ₃ , E ₂ , V ₁₀₆
72	เซอองกัว	เถิง	เนื้อแข็ง	F ₂ , K ₃ , V ₁₀₇
73	ตะโขงภู / น้ำดู	เผาะ	คล้ายต้นข้าว	F ₃ , K ₂ , V ₁₀₈
74	กระโหลงโหว่	เถิง	เนื้อไม้แดง แก่นแดง ใช้ทำเสาบ้าน	F ₂ , K ₃ , E ₅
75	กะเหมงปู	เผาะ	กินยอดอ่อน รสเปรี้ยวหวาน เปลือกรากกินเป็นยาแก้ ท้องอืด ลูกเล็กๆนกชอบกิน	F ₂ , K ₂ , E ₁ , E ₂ , E ₃
76	พุดุ	เผาะ	ยอดต้มเป็นผักกิน	F ₃ , K ₂ , E ₁ , V ₁₀₉

ตารางแสดงรายชื่อพรรณพืชที่สำรวจพบในป่าเวียแซกล่า

ลำดับ	ชื่อพืชไทย/กะเหรี่ยง	กลุ่มพืช	ลักษณะและการใช้ประโยชน์	ตัวแปร
77	คั่ง	เหิง	ต้นใหญ่มีลูก ลูกอ่อน แกงส้มได้ ลูกสุกตากพื้แห้ง กวาง กระทิง เต่า ค่าง ชะนี อีเห็น ลิงลม กินบนต้น	F ₂ , K ₃ , E ₁ , E ₂
78	ซูไก่อู้	เผาะ	เป็นเถาเลื้อย ยอดอ่อนแกงกินได้ รากเป็นยาแก้ไข้	F ₂ , K ₂ , E ₁ , E ₃ , V ₁₁₁

ตารางการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในป่า เดอ-เซพูกล่า(F8)

ลำดับ	สัตว์	เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
1	กวาง		กินผลไม้										
2	เก้ง		กินผลไม้										
3	เม่น			กินลูกกุดี ไผ่									
4	อีเห็น												
5	ลิงค่าง												
6	ช้าง		เข้ามาใช้แหล่งน้ำ										
7	เสือ		ตามแก่งกวางเข้ามาเพื่อกินเป็นอาหาร										
8	ชะมด		กินลูกเซพู										

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับป่าเดอ-เซพู(F7)

สัตว์/เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1.กระต๊อ	นอน											นอน
2.เสือ												
3.กวางป่า												
4.เก้งฟาง				ช่วงเขางอก อยู่พื้นที่สูง								
5.หมีคน					กินลูกเกาลัด			ไปๆ มาๆ				
6.หมูป่า				กินลูกไม้								
7.เม่น					กินลูกเกาลัด					กินลูกไม้		
8.ช้าง	พักผ่อน											พัก
9.ลิงกัง												
10.ค่าง	กินลูกไม้ ยอดไม้							ไปๆ มา	เป็นทางผ่าน			

สัตว์/เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.				
1.กระทิง												หลบแดด				
2.ช้าง	หลบแดด											อาศัย				
3.หมีคน			กินระกำ								อาศัยห้วย					
4.หมูป่า							ช่วงผสมพันธุ์									
5.กวางป่า							อาศัยหลบแดด กินสาหร่าย									
6.เม่น	เข้ามาอาศัยหากินลูกไม้ตลอดทั้งปี															
7.มัน	เข้ามาอาศัยหากินลูกไม้ตลอดทั้งปี															
8.ลิงกัง	เข้ามาอาศัยหากินลูกไม้ตลอดทั้งปี															
9.ค่าง												กินคอง เขื่อนา และ ลูกไม้สุก				

สัตว์เดือน	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
1.ช้างป่า	หากินเถาวัลย์											
2.กระทิง											เข้ามาหากิน	
3.หมีคน				หากินเขยฟองบ่ง								
4.เสือ	เข้าไม่เป็นเวลา ขึ้นอยู่กับเหยื่อที่เข้ามาในป่านี้											
5.แก้งฟาน	ชอบอยู่บริเวณที่เป็นเดอเซอ-เวียเซอ											
6.หมูป่า				หากินลูกไม้								
7.ชะนี	อยู่เป็นประจำ											
8.ลิงกัง	อยู่เป็นประจำ											
9.ค่าง	อยู่เป็นประจำ											
10.เม่น	หากินเป็นประจำ											

ตารางการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในป่าวาผะดู-กล้า(F6)

สัตว์/เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1.หมีคน	ผ่านมากินช่วงลูกพล่าสุก			เข้ามากินลูกไม้								
2.หมูป่า	เข้ามากินลูกไม้			เข้ามากินลูกไม้						เข้ามากินลูกไม้		
3.ค่าง				กินหน่อไม้								
4.แก้งฟาน										กินไผ่ซา		
5.กวางป่า	มากินลูกชาน											
6.กระทิง	กินพล่าซา			กินหน่อไม้								
7.ช้างป่า	กินลูกชาน			กินหน่อไม้								
8.เสือ	ตามหมู			ตามหมู								
9.เม่น	กินพล่า,คั่ง			กินชีซา								
10.แมวดาว							มากินไก่อ่ กินนก					
11.อีเห็น							มากินไก่อ่ กินนก					

ตารางการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในป่าเตอบะ-ไล่กล้า(F1)

สัตว์/เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1.หมีคน		กินลูกหมู				กินชีไหลทะ		กินเซฟองบุง				
2.หมูป่า		กินลูกหมู /นอนโคลน					-			กินถั่วที่มีขุย		
3.ค่าง/ชะนี			กินลูกสะเคอะเน่อ							กินลูก,ดอกจองไหว		
4.แก้งฟาน	กินวองอ้ว							-				
5.กวางป่า	กินวองอ้ว											
6.กระทิง	กินวองอ้ว											
7.ช้างป่า	กินวองอ้ว						กินกะช่องชีฟู					
8.เม่น	กินพลมื่อ/กูบองไล่											
9.อีเห็น	อาศัย/ กินลูกหมู			กินลูกคาเซอ							กินขวยไล่ที่	
10.นก			กินลูกสะเคอะเน่อ(นกเงือก)					กินอีไธ	กินเซฟองบุง			
11.เลียงผา	กินยอดที่โหลดู										กินใบ/ยอดปะใจไ	
12.ไก่ฟ้า											กินเบ่อม่องจี	
13.กระรอก			กินเปลือกตันช่องทอง					กินลูกไม้พอง				

ภาพที่1 ป่าเตอบ-ไถกล้า ตัวอย่างแสดงกลุ่มสังคมป่าเตอบ



ภาพที่ 3 ป่าเหียงเขกล่า ตัวแทนสังคมป่าเหียงผ่อ



ภาพที่ 2 ป่าวาเกลื้อ-กล่า ตัวแทนกลุ่มสังคมป่าวา-กล่า

