



จิตยานิพนธ์

กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและการย้อนบรรยายลักษณะของปลา
ในวงศ์ BAGRIDAE ที่พบในประเทศไทย

COMPARATIVE ANATOMY AND REDESCRIPTION OF BAGRID CATFISHES
(PISCES : BAGRIDAE) OF THAILAND

นายภาสกร แสงจันทร์แดง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๔๔

A. 63



โครงการ BRT ชั้น 15 อาคารมหานครฮิปปี้
539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

15 ส.ย 2544



ใบรับรองวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรการประมง)

ปริญญา

วิทยาศาสตรการประมง

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

สาขา

ภาควิชา

เรื่อง กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและการย้อนบรรยายลักษณะของปลาในวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย

Comparative Anatomy and Redescription of Bagrid Catfishes (Pisces: Bagridae) of Thailand

นามผู้วิจัย นายภาสกร แสนจินแดง

ได้พิจารณาเห็นชอบให้เป็นวิทยานิพนธ์ระดับ.....

โดย ประธานกรรมการ.....

อาจารย์ประจิตร วงศ์รัตน์, Ph.D.

กรรมการ.....

ศาสตราจารย์สืบสิน สนธิรัตน์, Ph.D.

กรรมการ.....

รองศาสตราจารย์กรรณิกา ชั่วลวานิช, วท.ม.

หัวหน้าภาควิชา.....

ศาสตราจารย์ลัดดา วงศ์รัตน์, M.S.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับรองแล้ว

ศาสตราจารย์ทัศนีย์ อัดตะนันท์, D. Agr.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2544

วิทยานิพนธ์

เรื่อง

กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและการย้อนบรรยายลักษณะของปลา
ในวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย

Comparative Anatomy and Redescription of Bagrid Catfishes
(Pisces: Bagridae) of Thailand

โดย

นายภาสกร แสนจันแดง

เสนอ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)
พ.ศ. 2544

ISBN 974-461-444-7

Pasakorn Saenjundaeng 2001 : Comparative Anatomy and Redescription of Bagrid Catfishes (Pisces: Bagridae) of Thailand. Master of Science (Fisheries Science), Major Field Fisheries Science, Interdisciplinary Graduate Program. Thesis Advisor : Mr. Prachit Wongrat, Ph.D. 474 pages.
ISBN 974-461-444-7

The bagrid catfishes (Pisces: Bagridae) from seven river basins in Thailand were studied. There were 7 genera and 25 species. These genera were *Bagrichthys*, *Batasio*, *Hemibagrus*, *Leiocassis*, *Mystus*, *Rita* and *Sperata*. The two species of genus *Bagrichthys* were *Bagrichthys macracanthus* and *B. macropterus*. The six species of genus *Hemibagrus* were *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp. and *H. elegans* n.sp. The four species of genus *Leiocassis* were *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus*, *L. siamensis* and *L. stenomus*. *Mystus* were the large genera consisted of *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan* and *M. wolffi*. The genus which consisted of only one species were *Batasio* (*B. blythi*), *Rita* (*R. sacerdotum*) and *Sperata* (*S. acicularis*). The two new species of genus *Hemibagrus* were *Hemibagrus mekongensis* n.sp. and *H. elegans* n.sp. The first record of bagrid catfishes from Thailand were *Leiocassis micropogon* and *Rita sacerdotum*. The pictorial key with the prominent morphology and anatomy were presented. The taxonomically data of each bagrid catfishes species were scientific name, local name, common name, synonym, diagnosis, morphology, anatomy, habitat, biology, distribution and fisheries

Pasakorn Saenjundaeng

Student's signature

Prachit Wongrat

Thesis Advisor's signature

26 Mar 2001

คำนิยม

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ดร.ประจิตร วงศ์รัตน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่กรุณาให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ และแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.สืบสิน สนิธิรัตน์ กรรมการสาขาวิชาเอก รศ.กรรณิกา ชัชวาลวานิช กรรมการสาขาวิชารอง และ รศ.ดร.นิตยา เลาหะจินดา ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย ที่กรุณาให้คำแนะนำในการตรวจแก้วิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากร-ชีวภาพในประเทศไทยซึ่งร่วมจัดตั้งโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ที่ให้ทุนสนับสนุนในการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ ดร.อภิชาติ เต็มวิชากร และ ดร.ชวลิต วิทยานนท์ จากกลุ่มวิจัยอนุกรมวิธานปลาน้ำจืด สถาบันพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และตัวอย่างปลาในการศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์

ขอขอบคุณ คุณชัยวุฒิ กรุดพันธ์ และคุณจรงจิต สุนัยรัตนภรณ์ ที่เอื้อเฟื้อตัวอย่างปลารวมถึงชาวประมงทุกคนที่ช่วยในการเก็บตัวอย่างปลาเพื่อใช้ในการศึกษา รวมถึงพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนด้านการศึกษาตลอดมา

ภาสกร แสนจันทร์แดง

มีนาคม 2544

ประวัติการศึกษา

วัน เดือน ปี เกิด : 12 ธันวาคม 2516

สถานที่เกิด : อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สารบัญ

หน้า

สารบัญ	(1)
สารบัญตาราง	(2)
สารบัญภาพ	(3)
คำอธิบายย่อ	(16)
คำนำ	1
วัตถุประสงค์	3
การตรวจเอกสาร	4
อุปกรณ์และวิธีการ	30
ผลการศึกษา	60
วิจารณ์	421
สรุป	435
เอกสารอ้างอิง	437
ภาคผนวก	456

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	จำนวนรายชื่อสกุล สถานภาพ ชนิดต้นแบบ และการกระจายพันธุ์ ของปลา วงศ์ Bagridae ที่พบในโลก ตาม Eschmeyer (1998)	18
2	ชนิดปลาในวงศ์ Bagridae ที่กรมประมงได้ทำการสำรวจตามแหล่งน้ำต่างๆ ของประเทศไทย	28
3	จำนวนครั้งการเก็บตัวอย่างจาก 7 ลุ่มน้ำของไทยในช่วงปี 2540 – 2541	49
4	ชนิดของปลากดปลาแขยงวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย	60
5	จำนวนชนิดของปลาในวงศ์ Bagridae ที่มีรายงานการพบในประเทศไทย และชื่อที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	422
ตารางผนวกที่		
1	การเปรียบเทียบข้อมูลการนับของปลาวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย	457
2	ความถี่ของจำนวนข้อกระดูกสันหลังของปลาในวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย	458
3	ความถี่ของจำนวนซี่กรองเหงือกของปลาวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย	459

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 จุดเก็บตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	54
2 การจัดแบ่งลุ่มน้ำของประเทศไทย	55
3 วิธีการวัดและนับ ที่ใช้ในการศึกษาปลาตกปลาแขยงวงศ์ Bagridae	56
4 ขั้วกระดูกในแนวด้านบนของกะโหลกศีรษะ	57
5 ขั้วกระดูกในแนวด้านล่างของกะโหลกศีรษะ	58
6 ส่วนประกอบของกระดูก a. ชุดกระดูก suspensorium และชุดกระดูกปิดเหงือก, b. ชุดกระดูก Weberian apparatus, c. ชุดกระดูก hyal และกระดูก branchiostegal ray และ d. กระดูก cleithrum	59
7 แบ่งกลุ่มตามลักษณะรูปร่างของส่วนหัว	86
8 แบ่งกลุ่มตามขนาดและรูปร่างของปาก	88
9 แบ่งกลุ่มตามลักษณะการมีหรือไม่มีผิวหนังคลุมแผ่นกระดูกบริเวณ ตอนปลายส่วนท้ายของหัว	90
10 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของการซ้อนหรือไม่ซ้อนทับกันของเยื่อหุ้มแผ่น กระดูกปิดคอคอค	92
11 แบ่งกลุ่มตามตำแหน่งของตา	94

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
12	แบ่งกลุ่มตามการมีหรือไม่มีรูรับความรู้สึกบริเวณส่วนหัว (sensory pore) 96
13	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของซี่กรองเหงือก (gill raker) 99
14	แบ่งกลุ่มตามการมีหรือไม่มีผิวหนังคลุมตา (subcutaneous) 101
15	แบ่งกลุ่มตามจำนวนของหนวด 103
16	แบ่งกลุ่มตามความยาวของหนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel) 107
17	แบ่งกลุ่มตามความยาวของหนวดบริเวณจมูก (nasal barbel) 111
18	แบ่งกลุ่มตามความยาวหนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่าง (outer mandibular barbel) 115
19	แบ่งกลุ่มตามความยาวหนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่าง (inner mandibular barbel) 119
20	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลัง (dorsal spine) 123
21	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบหลัง 125
22	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของซี่กับริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอก (pectoral spine) 127

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
23	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก humero-cubital process 129
24	แบ่งกลุ่มตามความยาวก้านครีบกึ่งของครีบท้ง (dorsal spine) 131
25	แบ่งกลุ่มตามความยาวฐานครีบกึ่งไขมัน (adipose fin) 135
26	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของสีบริเวณลำตัว (color pattern) 139
27	แบ่งกลุ่มตามการมีหรือไม่มีจุดหรือแถบขวางสีดำบริเวณครีบท้ง 143
28	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของปลายครีบท้ง 147
29	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก mesethmoid 151
30	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของร่องกึ่งกลางหัว (fontanelle) 153
31	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก supraoccipital process 155
32	แบ่งกลุ่มจากลักษณะของขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid 157
33	แบ่งกลุ่มจากลักษณะของการโค้งงอลงด้านล่างของขอบด้านนอก กระดูก lateral ethmoid 159

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
34	แบ่งกลุ่มตามขนาดของแถบฟัน vomerine teeth 161
35	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของแถบฟัน mandibular teeth 163
36	แบ่งกลุ่มตามขนาดของกระดูก maxilla 165
37	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก nasal 167
38	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก lacrymal และ infraorbital 169
39	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก metapterygoid 171
40	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก interopercle 173
41	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก urohyal 175
42	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก branchiostegal ray และชุดกระดูก hyal 177
43	แบ่งกลุ่มกระดูก Weberian apparatus ตามลักษณะของกระดูก neural spine 179
44	แบ่งกลุ่มกระดูก Weberian apparatus ตามลักษณะของกระดูก Müllerian process 181
45	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก posttemporal 183
46	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก pelvic girdle 185

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
47	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระเพาะอาหาร (stomach) 187
48	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของความยาวลำไส้ (intestine) 189
49	แบ่งกลุ่มตามลักษณะรูปร่างของไตส่วนหลัง (trunk kidney) 191
50	แบ่งกลุ่มตามลักษณะของของกระเพาะลม (air bladder) 193
51	<i>Bagrichthys macracanthus</i> (Bleeker, 1854) 216
52	ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Bagrichthys macracanthus</i> 220
53	แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Bagrichthys macracanthus</i> ที่พบในประเทศไทย 222
54	<i>Bagrichthys macropterus</i> (Bleeker, 1853) 224
55	ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Bagrichthys macropterus</i> 228
56	แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Bagrichthys macropterus</i> ที่พบในประเทศไทย 230
57	<i>Batasio blythi</i> (Day, 1877) 234

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
58 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Batasio blythi</i>	238
59 แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Batasio blythi</i> ที่พบในประเทศไทย	240
60 <i>Hemibagrus filamentus</i> (Fang and Chaux, 1949)	244
61 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Hemibagrus filamentus</i>	248
62 แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Hemibagrus filamentus</i> ที่พบในประเทศไทย	250
63 <i>Hemibagrus microphthalmus</i> (Day, 1877)	252
64 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Hemibagrus microphthalmus</i>	257
65 แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Hemibagrus microphthalmus</i> ที่พบในประเทศไทย	259
66 <i>Hemibagrus nemurus</i> (Valenciennes in Cuv. & Val., 1839)	261
67 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Hemibagrus nemurus</i>	265

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
68	แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Hemibagrus nemurus</i> 267
69	<i>Hemibagrus wycki</i> (Bleeker, 1858) 269
70	ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Hemibagrus wycki</i> 273
71	แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Hemibagrus wycki</i> ที่พบในประเทศไทย 275
72	<i>Hemibagrus mekongensis</i> n.sp. 277
73	ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Hemibagrus mekongensis</i> n.sp. 280
74	แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Hemibagrus mekongensis</i> n.sp. ที่พบในประเทศไทย 282
75	<i>Hemibagrus elegans</i> n.sp. 284
76	ลักษณะโครงสร้างภายนอกของปลาชนิด <i>Hemibagrus elegans</i> n.sp. 286
77	แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Hemibagrus elegans</i> n.sp. ที่พบในประเทศไทย 287
78	<i>Leiocassis micropogon</i> (Bleeker, 1858) 291

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
79	ลักษณะโครงสร้างภายนอกของปลาชนิด <i>Leiocassis micropogon</i>	294
80	แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Leiocassis micropogon</i> ที่พบในประเทศไทย	295
81	<i>Leiocassis poecilopterus</i> (Valenciennes in Cuv. & Val., 1839)	297
82	ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Leiocassis poecilopterus</i>	301
83	แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Leiocassis poecilopterus</i> ที่พบในประเทศไทย	303
84	<i>Leiocassis siamensis</i> (Regan, 1913)	305
85	ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Leiocassis siamensis</i>	310
86	แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Leiocassis siamensis</i> ที่พบในประเทศไทย	312
87	<i>Leiocassis stenomus</i> (Valenciennes in Cuv. & Val., 1839)	314
88	ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Leiocassis stenomus</i>	318
89	แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Leiocassis stenomus</i> ที่พบในประเทศไทย	320

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
90	<i>Mystus atrifasciatus</i> Fowler, 1937	324
91	ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Mystus atrifasciatus</i>	328
92	แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Mystus atrifasciatus</i> ที่พบในประเทศไทย	330
93	<i>Mystus bocourti</i> (Bleeker, 1864)	332
94	ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Mystus bocourti</i>	336
95	แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Mystus bocourti</i> ที่พบในประเทศไทย	338
96	<i>Mystus cavasius</i> (Hamilton, 1822)	340
97	ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Mystus cavasius</i>	344
98	แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Mystus cavasius</i> ที่พบในประเทศไทย	346
99	<i>Mystus gulio</i> (Hamilton, 1822)	348
100	ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Mystus gulio</i>	352

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
101 แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Mystus gulio</i> ที่พบในประเทศไทย	354
102 <i>Mystus micracanthus</i> (Bleeker, 1846)	356
103 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Mystus micracanthus</i>	360
104 แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Mystus micracanthus</i> ที่พบในประเทศไทย	362
105 <i>Mystus multiradiatus</i> Roberts, 1992	364
106 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Mystus multiradiatus</i>	368
107 แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Mystus multiradiatus</i> ที่พบในประเทศไทย	370
108 <i>Mystus mysticetus</i> Roberts, 1992	372
109 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Mystus mysticetus</i>	376
110 แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Mystus mysticetus</i> ที่พบในประเทศไทย	378
111 <i>Mystus rhegma</i> Fowler, 1935	380

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
123	<i>Sperata acicularis</i> Ferraris & Runge, 1999 413
124	ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด <i>Sperata acicularis</i> 417
125	แผนที่การกระจายพันธุ์ของ <i>Sperata acicularis</i> ที่พบในประเทศไทย 419
ภาพผนวกที่	
1	ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวมาตรฐาน (standard length) กับเปอร์เซ็นต์ ความยาวฐานครีบก้น (% adipose fin base length/SL) ในปลาสกุล <i>Hemibagrus</i> 460
2	ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวมาตรฐาน (standard length) กับเปอร์เซ็นต์ ความยาวฐานครีบก้น (% adipose fin base length/SL) ในปลาสกุล <i>Mystus</i> (ยกเว้นกลุ่มแขวงช้างลาย) 461
3	ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวมาตรฐาน (standard length) กับเปอร์เซ็นต์ ความยาวฐานครีบก้น (% adipose fin base length/SL) ในกลุ่มแขวงช้าง ลายสกุล <i>Mystus</i> 462
4	ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวมาตรฐาน (standard length) กับเปอร์เซ็นต์ ความยาวก้านครีบแข็งของครีบหลัง (% dorsal spine length/SL) ในปลาสกุล <i>Mystus</i> (ยกเว้นกลุ่มแขวงช้างลาย) 463

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพผนวกที่	หน้า
5 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวมาตรฐาน (standard length) กับเปอร์เซ็นต์ความยาวก้านครีบแข็งของครีบหลัง (% dorsal spine length/SL) ในกลุ่มแขยงข้างลายสกุล <i>Mystus</i>	464
6 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวมาตรฐาน (standard length) กับจำนวนซี่กรองเหงือกขวาอันแรก (first right gill arch) ในปลาสกุล <i>Hemibagrus</i>	465
7 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวมาตรฐาน (standard length) กับจำนวนซี่กรองเหงือกขวาอันแรก (first right gill arch) ในปลาสกุล <i>Leiocassis</i>	466
8 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวมาตรฐาน (standard length) กับจำนวนซี่กรองเหงือกขวาอันแรก (first right gill arch) ในปลาสกุล <i>Mystus</i> (ยกเว้นกลุ่มแขยงข้างลาย)	467
9 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวมาตรฐาน (standard length) กับจำนวนซี่กรองเหงือกขวาอันแรก (first right gill arch) ในกลุ่มแขยงข้างลายสกุล <i>Mystus</i>	468
10 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวหัว (Head length) กับเปอร์เซ็นต์ความกว้างของหัวบริเวณตา (% head width at eye/HL) ในปลาสกุล <i>Leiocassis</i>	469
11 ชนิดของปลาในวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย	470

คำอธิบายคำย่อ

Afr	= anterior fontanelle
Bo	= basioccipital
Brst	= branchiostegal ray
Ceh	= ceratohyal
Ds	= dorsal spine
Ect	= ectopterygoid
Ent	= entopterygoid
Eph	= epihyal
Epo	= epiotic
Exp	= exoccipital
Fr	= frontal
Gr	= gill raker
Hcp	= humero-cubital process
Hk	= head kidney
Hyh	= hypohyal
Hyo	= hyomandibular
Imb	= inner mandibular barbel
Inf 1-5	= infraorbital 1-5
Inh	= interhyal
Int	= intestine
Iop	= interopercle
Lac	= lacrymal
Lat	= lateral ethmoid
Mes	= mesethmoid
Met	= metapterygoid
Mul	= müllerian process

คำอธิบายคำย่อ (ต่อ)

Mx	=	maxilla
Mxb	=	maxillary barbel
N	=	nasal
Nsb	=	nasal barbel
Nus	=	neural spine
Omb	=	outter mandibulary barbel
Op	=	opercle
Pfr	=	posterior fontanelle
Pl	=	palatine
Pmx	=	premaxilla
Pop	=	Preopercle
Ppc	=	parapophysis complex
Pro	=	prootic
Ps	=	pectoral spine
Psph	=	parasphinoïd
Pt	=	pterotic
Pt	=	Pterotic
Q	=	quadrato
Snp	=	sensory pore
Sph	=	sphenotic
St	=	stomach
Suo	=	supraoccipital
Sup	=	supraoccipital process
Tk	=	trunk kidney
Tri	=	tripus
Vm	=	vomer

กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและการย้อนบรรยายลักษณะของปลาในวงศ์ Bagridae ที่พบ ในประเทศไทย

Comparative Anatomy and Redescription of Bagrid Catfishes (Pisces: Bagridae) of Thailand

คำนำ

ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของประเทศอยู่ในเขตร้อนใกล้กับแนวเส้นศูนย์สูตรและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ จำนวนชนิดของปลาน้ำจืดที่พบในประเทศไทยเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็นอย่างดี โดยจากการสำรวจทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่าชนิดของปลาน้ำจืดของไทยมีทั้งหมดมากกว่า 600 ชนิด ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศคุ้นเคยและนิยมบริโภคปลาน้ำจืดมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล เพราะมีปลาอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์มากทั้งจำนวนชนิดและปริมาณ ปัจจุบันประชากรของประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นจากอดีตหลายเท่าตัว ความต้องการอาหารโปรตีนจากปลาเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ การจับปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติมีมากขึ้นตลอดทั้งปีไม่เว้นแม้แต่ในช่วงห้ามทำการประมง ซึ่งเป็นช่วงที่ปลาส่วนใหญ่มีการสืบพันธุ์และวางไข่ การพัฒนาด้วยการขยายเมือง แหล่งชุมชน การคมนาคม อุตสาหกรรม และพื้นที่การเกษตร เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ดีให้เสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะการเพิ่มภาวะมลพิษลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งผสมพันธุ์วางไข่ของปลาจึงเสื่อมโทรมลง ส่งผลให้จำนวนชนิดและปริมาณของปลาที่จับได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันลดจำนวนลงจากอดีตเป็นอย่างมาก

ปลากดปลาแขยงวงศ์ Bagridae จัดเป็นกลุ่มปลามีรสชาติดีและเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนทั่วไป มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ควรได้อนุรักษ์และเพิ่มจำนวนประชากรปลาในวงศ์นี้ การที่จะดำเนินการดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จนั้นสิ่งแรกที่จะต้องทำเป็นอย่างยิ่งคือ ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานด้านอนุกรมวิธาน แต่ผลการศึกษาอนุกรมวิธานของปลาวงศ์ Bagridae จากอดีตจนถึงปัจจุบันขาดความสมบูรณ์ ยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องการใช้ชื่อวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ชนิด อาทิ เช่น ปัญหาในการนำชื่อสกุล *Hemibagrus* มาใช้เรียกชื่อแทนสกุล *Mystus* ในกลุ่มปลากดชนิดที่มีขนาดใหญ่ และปัญหาในการพิสูจน์ว่ากลุ่มของปลากดเหลืองที่มีอยู่สองรูปแบบได้แก่ กลุ่มที่มี

ลำตัวขนาดใหญ่ และกลุ่มที่มีลำตัวขนาดเล็กที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า ปลาแคจิ๊ลิง เป็นชนิดเดียวกันหรือไม่ เป็นต้น ปัญหาต่างๆเหล่านี้หากไม่ได้ทำการศึกษาหาคำตอบที่แน่ชัดจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางด้านการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ ดังนั้นจึงสมควรทำการศึกษาด้านอนุกรมวิธานทั้งในเรื่องของลักษณะภายนอกและลักษณะโครงสร้างภายในอย่างละเอียด นำลักษณะดังกล่าวมาใช้ในการจัดจำแนกชนิดของปลาในวงศ์ให้ถูกต้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาถึงชีวประวัติและกลุ่มประชากรปลา รวมทั้งสิ่งแวดล้อมของแหล่งที่ปลาแต่ละชนิดอาศัยอยู่ให้ได้ความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ข้อมูลที่ได้เหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรประมงได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาลักษณะ โครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาในวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย
2. เพื่อคัดเลือกข้อมูลลักษณะ โครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลามาใช้เป็นหลักในการจัดจำแนกทางอนุกรมวิธานให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น
3. จัดทำคู่มือวิเคราะห์ชนิดและย่อนบรรยายลักษณะของปลาในวงศ์ Bagridae

การตรวจเอกสาร

Bleeker (1863) จัดเป็นผู้ศึกษาคนแรกเกี่ยวกับการหาวิธีในการแบ่งกลุ่มของพวกปลาหมอ (catfish) และได้ทำการแยกสกุลของปลากดปลาแขยงออกมาจากปลาหมอในสกุลอื่นๆ แต่รวมปลาหมอทุกสกุลให้อยู่ใน Stirps Bagrini Boulenger (1904) รวมสกุลของกลุ่มปลากดปลาแขยงให้อยู่ในวงศ์ย่อย (subfamily) Bagrinae วงศ์ (family) Siluridae Regan (1911) รวมสกุลของกลุ่มปลากดปลาแขยงให้อยู่ในวงศ์ Bagridae โดย Regan แยกวงศ์ Bagridae ออกเป็น 2 วงศ์ย่อย ได้แก่วงศ์ย่อย Chrysichthyinae และ Bagrinae Jayaram (1966a) ได้ทำการแยกวงศ์ Bagridae ออกเป็น 5 วงศ์ย่อย ได้แก่วงศ์ย่อย Auchenoglanidinae, Bagrinae, Bagroidinae, Chrysichthyinae และ Ritinae Bailey และ Stewart (1984) แยกวงศ์ Bagridae ออกเป็น 5 วงศ์ย่อย ได้แก่ Auchenoglanidinae, Bagrinae, Bagrichthyinae, Clarotinae และ Ritinae Mo (1991) แบ่งกลุ่มปลาวงศ์ Bagridae ออกเป็น 3 วงศ์ ได้แก่วงศ์ Austroglanididae, Bagridae และ Claroteidae โดยวงศ์ Claroteidae แบ่งเป็น 2 วงศ์ย่อย คือวงศ์ย่อย Claroteinae และ Auchenoglaninae Weber และ de Beaufort (1913), Berg (1947), Day (1877), Talwar และ Jhingran (1991) และ Nelson (1994) ได้จัดให้กลุ่มของปลากดปลาแขยงเข้าไว้ในวงศ์ Bagridae โดยไม่แบ่งวงศ์ออกเป็นวงศ์ย่อย

การจัดจำแนกปลาในวงศ์ Bagridae

วิธีการในการจัดจำแนกปลาวงศ์ Bagridae มีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้ทำการจัดระบบในการจัดจำแนก Bleeker (1863) จัดกลุ่มปลากดปลาแขยงให้อยู่ใน Stirps Bagrini, Subfamilia Bagriformes และ Familia Siluroidei Weber และ de Beaufort (1913) จัดวงศ์ Bagridae ให้อยู่ใน Suborder Siluroidei, Order Ostariophysi และ Class Teleostei Berg (1947) ได้ทำการจัดจำแนกกลุ่มปลาโดยอาศัยลักษณะโครงสร้างของกระดูกเป็นสิ่งสำคัญและจัดปลาในวงศ์ Bagridae ให้อยู่ใน Superfamily Siluroidea, Suborder Siluroidei, Division Siluri, Order Cypriniformes, Subclass Actinopterygii, Class Teleostomi, Subphylum Craniata และ Phylum Vertebrata Day (1877) ทำการจัดปลาวงศ์ Bagridae ให้อยู่ Order Physostomi, Subclass Teleostei และ Class Pisces โดยอาศัยลักษณะของกระเพาะลมและรวมเอากลุ่มของปลาดุกและปลาเนื้ออ่อนให้เข้าอยู่ในวงศ์ Bagridae ด้วย Talwar และ Jhingran (1991) จัดปลาในวงศ์นี้ให้อยู่ใน Order Siluriformes, Class Osteichthys และ Grade Pisces Nelson (1994) ทำการรวบรวมข้อมูลของปลาทั่วโลก ทั้งชนิดที่ยังพบในปัจจุบันและชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้วจากผลงานของนักวิทยาศาสตร์หลาย

ท่านที่ได้ทำการศึกษาไว้และรวมถึงผลงานที่ศึกษาโดย Nelson เอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณา ร่วมกับหลักวิวัฒนาการเพื่อจัดระบบในการจำแนกปลาทั่วโลกและจัดปลาวงศ์ Bagridae ให้อยู่ใน Order Siluriformes (Nematognathi), Superorder Ostariophysi, Subdivision Euteleostei, Division Teleostei, Subclass Neopterygii, Class Actinopterygii, Grade Teleostomi, Superclass Gnathostoma และ Subphylum Vertebrata (Craniata)

ลักษณะทั่วไปของปลาวงศ์ Bagridae

Weber และ de Beaufort (1913) ให้คำบรรยายลักษณะของปลาในวงศ์ Bagridae ที่พบในเขต Indo-Australian Archipelago ว่ามีครีบหลัง (dorsal fin) ตื้นและมีก้านครีบแข็งที่ครีบหลัง (dorsal spine) 1 ก้าน มีก้านครีบที่แตกแขนง (branch ray) 6-7 ก้าน ครีบท้อง (ventral fin) มีก้านครีบ 5-6 ก้าน ครีบไขมัน (adipose fin) มีการพัฒนาดีและอยู่ตำแหน่งตรงกันข้ามกับครีบกัน (anal fin) ครีบกันมีก้านครีบที่แตกแขนงน้อยกว่า 20 ก้าน หัวมีลักษณะเป็นรูปกรวยและอาจจะแบนลงมากหรือน้อย หัวถูกปกคลุมด้วยผิวหนังที่หนาหรือบาง รุงมุกคู่หน้าและคู่หลังแยกห่างจากกัน หนวดบริเวณจมูก (nasal barbel) อยู่บริเวณด้านหน้า รุงมุกคู่หลัง หนวดมีทั้งหมด 4 คู่ ได้แก่ หนวดบริเวณจมูก, หนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel), หนวดที่ขากรรไกรล่าง (mandibular barbel) และหนวดที่คาง (mental barbel) ตามีหรือไม่มีผิวหนังคลุมตา (subcutaneous) ปากมีลักษณะโค้งหรือตรง อยู่แนวด้านล่างของจะงอยปาก ขากรรไกรบนยื่นยาวเล็กน้อย บริเวณช่องปากมีฟันแบบ villiform เรียงตัวเป็นแถบอยู่บริเวณกระดูกขากรรไกรและเพดานปาก ในบางชนิดมีฟันที่บริเวณริมฝีปาก เชื่อมหุ้มแผ่นกระดูกปิดเหงือก (gill membrane) อาจเชื่อมหรือไม่เชื่อมติดกัน แต่แยกเป็นอิสระจากคอดคอ (isthmus) กระดูก branchiostegal ray มีจำนวน 7-13 ก้าน

Smith (1945) ให้คำบรรยายลักษณะของปลาวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย โดยกล่าวว่าปลาวงศ์นี้มีหนวดทั้งหมดจำนวน 4 คู่ ได้แก่ หนวดบริเวณจมูก หนวดที่ขากรรไกรบน หนวดที่ขากรรไกรล่างและหนวดที่คาง ในบางชนิดหนวดที่บริเวณขากรรไกรบนยื่นยาวถึงครีบหาง รุงมุกคู่หลังแยกออกจากรุงมุกคู่หน้าและมีหนวดบริเวณจมูกอยู่ด้านหน้าของรุงมุกคู่หลัง ฟันเป็นแบบ villiform แถบฟันบริเวณกระดูก vomeropalatine จัดเรียงตัวเป็นแถบวงกลมหรือแถบโค้ง เชื่อมหุ้มแผ่นกระดูกปิดเหงือกอาจเชื่อมหรือไม่เชื่อมติดกันแต่แยกเป็นอิสระจากคอดคอ ครีบไขมันเจริญดี ในบางชนิดมีความยาวฐานครีบเกือบเท่าครึ่งหนึ่งของความยาวมาตรฐาน (standard length) ครีบหลังอยู่ตำแหน่งด้านหน้าครีบท้อง ก้านครีบแข็งของครีบหลังมีขอบด้านหลังเรียบหรือ

ขุรขระ ก้านครีบท่อกแตกแขนงมีจำนวน 6-7 ก้าน ครีบทหาง (caudal fin) มีการพัฒนาดีและมีลักษณะเว้าลึกคล้ายรูปส้อม (forked)

Misra (1976) ให้คำบรรยายถึงลักษณะของปลาในวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศอินเดียและประเทศใกล้เคียงโดยกล่าวว่าปลาในวงศ์นี้มีลำตัวยาวแบบ elongate ลำตัวส่วนหน้าแบนลงเล็กน้อยแต่จะแบนข้างในบริเวณส่วนท้ายของลำตัว หัวมีลักษณะเป็นรูปกรวยหรือแบนลงและกว้าง จะงอยปากมีลักษณะแหลมแต่มีปลายทู่ (bluntly point) หรือกลม (rounded) หรือคล้ายใบพาย (spatulate) ตามีขนาดใหญ่หรือมีขนาดปานกลางอยู่บริเวณด้านข้างของหัว ตามีหรือไม่มีผิวหนังคลุมตา รุงมูกแยกห่างจากกันและบริเวณด้านหน้า รุงมูกคู่หลังอาจจะมีหรือไม่มีหนวด (ยกเว้นปลาในสกุล *Rita* ที่มีรุงมูกคู่หน้าอยู่เกือบเชื่อมติดกับรุงมูกคู่หลัง) หนวดมี 3 หรือ 4 คู่ ปากอยู่ตำแหน่งตอนปลายของหัว (terminal) หรือค่อนข้างปลายด้านข้าง (subterminal) ปากมีลักษณะตรงหรือโค้งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว (crescentric) ฟันเป็นแบบ villiform บริเวณขากรรไกรล่างอาจมีฟันแบบ molariform ปนอยู่ด้วย ฟันบริเวณกระดูก vomer เป็นแบบ villiform หรือ molariform เรียงตัวเป็นแถบรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวที่อาจเชื่อมติดต่อกัน บริเวณหัวอาจมีหรือไม่มีร่องกึ่งกลางหัว (median longitudinal groove) ส่วนของกระดูก humero-cubital process อาจสั้นหรือยาว เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดเหงือกแยกเป็นอิสระหรือเชื่อมติดกับคอดคอ ก้านครีบแข็งของครีบท้องแข็งแรงหรือสามารถโค้งงอได้ ครีบไขมันอยู่บริเวณตอนท้ายของลำตัวถัดจากครีบท้อง ครีบทอก (pectoral fin) มีก้านครีบแข็งที่แข็งแรงปานกลางหรือแข็งแรงมาก ครีบท้อง (ventral fin) มีก้านครีบจำนวน 6-8 ก้าน ครีบก้นมีก้านครีบจำนวน 9-28 ก้าน ครีบทหางมีลักษณะเว้าเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว (lunate) หรือเว้าเป็นรูปส้อม เส้นข้างตัวสมบูรณ์ กระเพาะลม (air bladder) ไม่ถูกล้อมรอบด้วยกระดูก กระดูก branchiostegal ray มีจำนวน 6-13 ก้าน

Burgess (1989) ให้คำบรรยายลักษณะของปลาในวงศ์ Bagridae ว่าจัดเป็นกลุ่มปลาที่ไม่มีเกล็ดและมีลำตัวยาวปานกลาง ลำตัวส่วนหน้าแบนลงเล็กน้อยแต่แบนข้างในบริเวณส่วนท้ายของลำตัว ส่วนหัวอาจแบนลงและผิวด้านบนอาจขรุขระ ผิวด้านบนของหัวถูกปกคลุมโดยผิวหนังที่มีลักษณะบางหรือหนา ส่วนของจะงอยปากมีลักษณะแหลมแต่มีปลายทู่หรือกลม หรือมีลักษณะคล้ายใบพาย ตามีขนาดเล็กถึงใหญ่และมีหรือไม่มีผิวหนังคลุมตา รุงมูกคู่หน้าและคู่หลังแยกจากกัน (ยกเว้นปลาในสกุล *Rita* ที่มีรุงมูกคู่หน้าอยู่เกือบเชื่อมติดกับรุงมูกคู่หลัง) คู่หน้าอยู่บริเวณตำแหน่งส่วนปลายของจะงอยปาก คู่หลังตั้งอยู่ตำแหน่งใกล้กับตามากกว่าส่วนปลายของจะงอยปาก อาจมีหนวดอยู่บริเวณด้านหน้าของรุงมูกคู่หลัง หนวดมี 3-4 คู่ ได้แก่ หนวดที่ขากรรไกรบน 1 คู่ หนวด

บริเวณจมูก 1 คู่และหนวดที่ขากรรไกรล่าง 2 คู่ เมื่อปลาามีหนวดเพียง 3 คู่ โดยปกติหนวดบริเวณจมูกจะเสื่อมหายไป ปากอยู่ในตำแหน่งปลายสุดของหัวหรือค่อนข้างต่ำทางด้านล่างเล็กน้อยโดยมีลักษณะเป็นรูปโค้งคล้ายกับรูปพระจันทร์เสี้ยว ขากรรไกรมีขนาดเท่ากันหรือขากรรไกรบนยาวกว่าขากรรไกรล่างเล็กน้อย ฟันเป็นแบบ villiform หรือ molariform จัดเรียงตัวเป็นแถวยาว โดยปกติพบแถบฟันบริเวณกระดูก vomer และกระดูกขากรรไกร ฟันจัดเรียงตัวเป็นแถบลมเดียวหรือจัดเรียงตัวกันเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเชื่อมติดต่อกัน ปลาในกลุ่มนี้โดยปกติมีครีบหลังที่พัฒนาดี ครีบหลังมีฐานของครีบสั้นและมีก้านครีบแข็ง 1 ก้าน โดยบริเวณขอบด้านหลังของก้านครีบแข็งอาจมีลักษณะเรียบหรือขรุขระ ครีบหลังโดยปกติมีก้านครีบอ่อนจำนวน 6-7 ก้าน (ยกเว้น ปลาในสกุล *Bagrus* มีก้านครีบอ่อนจำนวน 8-11 ก้าน ปลาในสกุล *Notoglanidium* มีก้านครีบอ่อนจำนวน 14-15 ก้านและปลาในสกุล *Liauchenoglanis* มีก้านครีบอ่อนจำนวน 19-20 ก้าน) ครีบไขมันมีขนาดเล็กหรือค่อนข้างใหญ่ (ในบางชนิดมีความยาวของฐานครีบเกือบเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวมาตรฐาน) และไม่เชื่อมติดกับก้านครีบหลัง ครีบกันมีก้านครีบค่อนข้างสั้นถึงค่อนข้างยาวและมีก้านครีบจำนวน 9-28 ก้าน ขอบของครีบกันอาจโค้งมนหรือเว้าลึก ครีบอกอยู่ในแนวระนาบและอยู่ตำแหน่งตอนล่างของด้านข้างลำตัว ก้านครีบแข็งของครีบอกค่อนข้างแข็งแรงหรือแข็งแรงปานกลางและโดยปกติบริเวณขอบด้านหลังมีซี่จัก ครีบท้องตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของลำตัวและมีก้านครีบจำนวน 6-8 ก้าน เป็นปลาที่มีเส้นข้างตัวที่สมบูรณ์ เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดเหงือกอาจเป็นอิสระจากกันหรือเป็นอิสระจากคอดคอ ช่องเปิดเหงือกมีขนาดปานกลางถึงกว้างและเปิดถึงส่วนบนของฐานครีบอก

Nelson (1994) ให้คำบรรยายลักษณะโดยรวมของปลาในวงศ์ Bagridae ที่พบทั่วโลกว่าจัดเป็นกลุ่มปลาที่ไม่มีเกล็ดและมีหนวด 4 คู่ ที่พัฒนาดี โดยปกติปลามีก้านครีบแข็งของครีบหลัง ครีบหลังมีก้านครีบที่แตกแขนงจำนวน 6-7 ก้าน (ไม่ค่อยพบว่ามี 8-20 ก้าน) ครีบไขมันมีขนาดเล็กและรูปร่างแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของปลา ก้านครีบแข็งที่ครีบอกมีขอบด้านหลังเป็นซี่จัก

Rainboth (1996) ให้คำบรรยายลักษณะของปลาในวงศ์ Bagridae ว่ามีหนวดจำนวน 4 คู่ ผิวหนังเรียบไม่มีเกล็ด และมีครีบไขมัน ก้านครีบแข็งของครีบหลังค่อนข้างแข็งแรง ครีบหางมีลักษณะคล้ายรูปส้อมและแยกออกจากครีบกัน รูจมูกคู่หน้าและรูจมูกคู่หลังแยกห่างจากกัน เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดเหงือกเป็นอิสระจากคอดคอ

การศึกษาปลาวงศ์ Bagridae ที่พบในต่างประเทศ

Boulenger (1909) รายงานถึงปลาวงศ์ Bagridae ที่กระจายพันธุ์อยู่ในทวีปแอฟริกา จำนวน 9 สกุล 43 ชนิด สกุลที่พบได้แก่สกุล *Auchenoglanis*, *Bagrus*, *Chrysichthys*, *Clarotes*, *Gephyroglanis*, *Leptoglanis*, *Notoglanidium* และ *Parachenoglanis* นอกจากนี้ยังจัดทำคู่มือในการวิเคราะห์ชนิดโดยอาศัยลักษณะของความกว้างและความยาวของหัว ตำแหน่งของครีบหลัง ความยาวของหนวด ร่องกึ่งกลางหัว กระดูก occipital process ความยาวครีบไขมัน จำนวนซี่กรองเหงือก (gill raker) และ ลักษณะของสปีบริเวณลำตัว

Volz (1907) รายงานชนิดของปลาในวงศ์ Bagridae ที่พบบริเวณเกาะสุมาตราจำนวน 4 สกุล 8 ชนิด สกุลที่พบได้แก่สกุล *Macrones*, *Leiocassis*, *Bagroides* และ *Bagrichthys* Weber และ de Beaufort (1913) รายงานชนิดของปลาในวงศ์นี้ที่กระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณเขต Indo-Australian Archipelago จำนวน 4 สกุล 28 ชนิด สกุลที่พบได้แก่ *Macrones*, *Leiocassis*, *Bagroides* และ *Bagrichthys* พร้อมทั้งจัดทำคู่มือในการวิเคราะห์ชนิดโดยอาศัยลักษณะของการมีหรือไม่มีผิวหนังคลุมตา การเชื่อมติดของเยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดเหงือกกับคอดคอหรือการเชื่อมติดระหว่างเยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดเหงือกทั้งสองข้าง ก้านครีบแข็งของครีบหลัง ฟันบริเวณริมฝีปาก (labial teeth) ความยาวหนวด ความยาวครีบไขมัน ร่องกึ่งกลางหัว และ กระดูก occipital process Nichol และ Pope (1927) รายงานชนิดของปลาในวงศ์ Bagridae ที่เก็บตัวอย่างจากมณฑลไต้หวันของประเทศจีน และเก็บรักษาไว้ใน American Musuem จำนวน 1 สกุล 2 ชนิด ได้แก่สกุล *Pseudobagrus* Tweedie (1936) รายงานชนิดของปลาในวงศ์นี้ที่เก็บรักษาไว้ใน Raffle Museum ของประเทศสิงคโปร์ จำนวน 2 สกุล 7 ชนิด ได้แก่สกุล *Macrones* และ *Leiocassis*

Hora และ Law (1941) และ Jayaram (1954) รายงานถึงปลาในวงศ์ Bagridae ที่เก็บรักษาไว้ใน Indian Musuem ได้แก่ปลาสกุล *Batasio* 3 ชนิด และ *Mystus* 16 ชนิด Günther (1863) บรรยายลักษณะของปลาในวงศ์นี้ไว้ในหนังสือ *Freshwater fishes of the world* จำนวน 7 สกุล ได้แก่ *Auchenoglanis*, *Bagrus*, *Chrysichthys*, *Gephyroglanis*, *Leiocassis*, *Mystus* และ *Parachenoglanis* Day (1877) รายงานปลาในวงศ์นี้ที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศอินเดียและประเทศใกล้เคียงในหนังสือ *The fishes of India* จำนวน 3 สกุล 23 ชนิด ได้แก่สกุล *Leiocassis*, *Macrones* และ *Rita* Jordon และคณะ (1974) รายงานในหนังสือ *A catalogue of the fish of Japan*

ว่าพบปลาในวงศ์ Bagridae จำนวน 3 สกุล 3 ชนิด สกุลที่พบได้แก่สกุล *Fluvidraco*, *Leiocassis* และ *Pseudobagrus*

Menon (1974) รายงานปลาในวงศ์ Bagridae จำนวน 3 สกุล 9 ชนิด ที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณเทือกเขาหิมาลัยและบริเวณแม่น้ำคงคาในหนังสือ A check-list of fishes of the Himalayan and the Indo-Gangetic plain สกุลที่พบได้แก่สกุล *Mystus*, *Rita* และ *Batasio* Misra (1976) บรรยายถึงจำนวนชนิดและลักษณะของปลาที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศอินเดียและประเทศข้างเคียงในหนังสือ The fauna of India and the adjacent countries และรายงานว่าพบปลาในวงศ์นี้จำนวน 4 สกุล 27 ชนิด ได้แก่สกุล *Mystus*, *Pseudobagrus*, *Rama* และ *Rita* พร้อมทั้งจัดทำคู่มือในการวิเคราะห์ชนิดโดยอาศัยลักษณะการมีหรือไม่มีผิวหนังคลุมตา ก้านครีบแข็งของครีบหลังและครีบอก ชนิดของฟันบริเวณเพดานปากและขากรรไกรล่าง ความยาวครีบไขมัน ลักษณะของจะงอยปาก ความยาวหนวดที่ขากรรไกรบน ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา กระดูก occipital process ร่องกึ่งกลางหัว และลักษณะของสปีบริเวณลำตัว Talwar และ Jhingran (1991) บรรยายลักษณะของปลาในวงศ์นี้ไว้ในหนังสือ A check-list of fishes of the Himalayan and the Indo-Gangetic plain และรายงานว่าพบจำนวน 6 สกุล 30 ชนิด ได้แก่สกุล *Aorichthys*, *Batasio*, *Horabagrus*, *Mystus*, *Rama* และ *Rita* พร้อมทั้งทำการจัดทำคู่มือวิเคราะห์ชนิดโดยอาศัยลักษณะของความยาวของครีบกัน ความยาวของครีบไขมัน ตำแหน่งของตา จำนวนและความยาวของหนวด การมีหรือไม่มีผิวหนังคลุมตา ขนาดของตา กระดูก interneural shield ลักษณะของจะงอยปาก รูปร่างขนาดเล็กบริเวณผิวหนังด้านข้างและผิวหนังด้านล่างของหัว กระดูก occipital process ร่องกึ่งกลางหัว ชนิดของฟัน รูปร่างของแถบฟันบริเวณเพดานปากและขากรรไกร จำนวน branchiostegal ray และลักษณะของสปีบริเวณลำตัว

Burgess (1989) และ Burgess และ Finley (1996) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนชนิดของปลาวงศ์ Bagridae โดยรายงานว่าพบจำนวน 33 สกุล 240 ชนิด สกุลที่รายงานได้แก่สกุล *Aorichthys*, *Amaginops*, *Auchenoglanis*, *Austroglanis*, *Bagrichthys*, *Bagroides*, *Bagrus*, *Batasio*, *Bathybagrus*, *Chandramara*, *Chrysichthys*, *Clarotes*, *Coreobagrus*, *Gephyroglanis*, *Gnathobagrus*, *Hemibagrus*, *Heterobagrus*, *Horabagrus*, *Liauchenoglanis*, *Leiocassis*, *Leptoglanis*, *Lophiobagrus*, *Mystus*, *Notoglanidium*, *Pardiglanis*, *Parauchenoglanis*, *Pelteobagrus*, *Phyllonemus*, *Platyglanis*, *Pseudobagrus*, *Rheoglanis*, *Rita* และ *Zairichthys* Burgess (1989) จัดทำคู่มือในการวิเคราะห์สกุลโดยอาศัยลักษณะของความยาวของหนวด แถบฟัน

บริเวณขากรรไกรและกระดูก vomer ขนาดของตา กระดูก occipital process ลักษณะของจะงอยปาก ตำแหน่งของปาก ความกว้างและความยาวของหัว การยื่นยาวของขากรรไกรบน รูขนาดเล็กบริเวณด้านข้างและด้านล่างของหัว ก้านครีบแข็งของครีบหลังและจำนวนก้านครีบหลัง ความยาวของครีบไขมันและลักษณะของสปีบริเวณลำตัว

Rainboth (1996) ทำการศึกษาจำนวนชนิดและลักษณะของปลาบริเวณแม่น้ำโขงตอนล่างในเขตของประเทศกัมพูชาและรายงานว่าพบปลาในวงศ์นี้จำนวน 4 สกุล 17 ชนิด สกุลที่พบได้แก่สกุล *Bagrichthys*, *Heterobagrus*, *Leiocassis* และ *Mystus* ในการวิเคราะห์สกุลและชนิดอาศัยลักษณะการมีหรือไม่มีผิวหนังคลุมตา การเชื่อมติระหว่างเยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดเหงือก ก้านครีบแข็งของครีบหลัง ความยาวและลักษณะของหนวด จำนวนซี่กรองเหงือก ร่องกึ่งกลางหัว กระดูก occipital process ความแบนของหัว ขนาดของปาก ตำแหน่งและความยาวฐานของครีบไขมันและลักษณะของสปีบริเวณลำตัว

Eschmeyer (1998) ได้รวบรวมรายชื่อสกุลและชนิดปลาที่พบทั่วโลกไว้ในหนังสือ Catalog of fishes จากข้อมูลในหนังสือเล่มนี้สามารถสรุปรายชื่อสกุล สถานภาพ ชนิดต้นแบบสกุล และการกระจายพันธุ์ของปลาวงศ์ Bagridae ได้ตามตารางที่ 1

การศึกษาปลาในวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย

Fowler (1934a) ทำการศึกษาถึงจำนวนชนิดของปลาในประเทศไทยและรายงานว่าพบปลาในวงศ์ Bagridae จำนวน 2 สกุล 8 ชนิด ได้แก่ *Mystus nigriceps*, *M. stigmaturus*, *M. micracanthus*, *M. vittatus*, *M. wolffii*, *M. gulio*, *M. nemurus* และ *Leiocassis bicolor* โดย Fowler รายงานว่า *Mystus stigmaturus* และ *Leiocassis bicolor* เป็นปลาชนิดใหม่ Fowler ได้กล่าวถึงลักษณะเด่นของปลาทั้ง 2 ชนิด ไว้ดังนี้ คือ *M. stigmaturus* จะมีลักษณะคล้ายกับ *M. havmolleri* มาก แต่มีความแตกต่างในด้านรูปแบบของสี โดย *M. stigmaturus* มีจุดสีดำขนาดใหญ่อยู่บริเวณตอนบนหรือคร่อมแนวเส้นข้างตัวโดยจุดอยู่ตรงกับบริเวณครีบไขมันส่วนหน้า สำหรับตัวอย่างปลาที่นำมาตั้งเป็น holotype ได้จากจังหวัดนครศรีธรรมราช *Leiocassis bicolor* มีลักษณะคล้ายกับ *L. leiocanthus* แต่แตกต่างกันในเรื่องรูปแบบของสี ตัวอย่างปลาที่นำมาตั้งเป็น holotype ได้จากจังหวัดเชียงใหม่ Fowler (1935) รายงานจำนวนชนิดของปลาในวงศ์นี้ที่พบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 3 ชนิด ได้แก่ *Mytus rhegma*, *M. planiceps* และ *M. wyckii* โดย Fowler รายงานว่า

Mystus rhegma เป็นปลาชนิดใหม่ Fowler บรรยายลักษณะของ *M. rhegma* ว่าคล้ายกับ *M. nigriceps* แต่ *M. rhegma* มีแถบสีดำในแนวตามยาวลำตัวจำนวน 3 แถบ ระยะห่างระหว่างจุดสิ้นสุดของครีบหลังและจุดเริ่มต้นของครีบไขมันมีความยาวเป็น 1 ใน 7 ของความยาวครีบไขมัน ตัวอย่างปลาที่นำมาตั้งเป็น holotype ได้มาจากกรุงเทพมหานคร Fowler (1937) รายงานชนิดของปลาในวงศ์นี้ที่พบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก 3 ชนิด ได้แก่ *Mystus atrifasciatus*, *Leiocassis albicollaris* และ *Heterobagrus bocourti* โดย Fowler รายงานว่า *Mystus atrifasciatus* เป็นปลาชนิดใหม่ Fowler แยก *M. atrifasciatus* ออกจาก *M. vittatus* โดยอาศัยลักษณะที่สำคัญดังนี้คือ *M. atrifasciatus* มีความยาวครีบไขมันและความยาวหัวมากกว่า *M. vittatus* นอกจากนี้ *M. atrifasciatus* ยังมีแถบสีดำเข้มทอดตามแนวยาวคร่อมแนวเส้นข้างตัวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ตัวอย่างปลาที่นำมาตั้งเป็น holotype ได้มาจากจังหวัดพิษณุโลก

Suvatti (1950) ทำการรวบรวมรายชื่อและแหล่งที่พบปลาในประเทศไทยพร้อมกับได้รายงานว่าพบปลาวงศ์ Bagridae จำนวน 4 สกุล 21 ชนิด ได้แก่ *Bagriodes macracanthus*, *B. macropterus*, *B. melapterus*, *Heterobagrus bocourti*, *Leiocassis albicollaris*, *L. bicolor*, *L. poecilopterus*, *L. siamensis*, *L. stenomus*, *Mystus baramensis*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. havmolleri*, *M. micracanthus*, *M. nemurus*, *M. nudiceps*, *M. planiceps*, *M. tengara*, *M. vittatus*, *M. wolffi* และ *M. wycki* Smith (1945) ได้เขียนหนังสือชื่อ *The freshwater fish of siam, or Thailand* ซึ่งเป็นหนังสือที่ยังคงใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์พรรณปลาน้ำจืดในประเทศไทย พร้อมกับการรายงานการพบปลาในวงศ์นี้จำนวน 4 สกุล 16 ชนิด ได้แก่ *Bagroides melapterus*, *B. macropterus*, *B. macracanthus*, *Leiocassis poecilopterus*, *L. siamensis*, *L. stenomus*, *Mystus wolffii*, *M. gulio*, *M. vittatus*, *M. nemurus*, *M. planiceps*, *M. wyckii*, *M. havmolleri*, *M. cavasius*, *M. micracanthus* และ *Heterobagrus bocourti* พร้อมทั้งจัดทำคู่มือในการวิเคราะห์ชนิดโดยอาศัยลักษณะการมีหรือไม่มีผิวหนังคลุมตา การเชื่อมต่อของเยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดเหงือกกับคอดคอ แถบฟันบนกระดูก vomer ก้านครีบแข็งของครีบหลัง ความยาวของหนวด กระดูก occipital process ร่องกึ่งกลางหัว ความยาวของครีบไขมัน และ รูปแบบของสปีริเวณลำตัว

Roberts (1992) ทำการย้อนศึกษากลุ่มของปลาแขยงข้างลายที่พบในประเทศไทย และได้ทำการศึกษาถึงรูปแบบของแถบสปีริเวณด้านข้างลำตัว จำนวนซี่กรองเหงือกและจำนวนข้อกระดูกสันหลัง พบว่าปลาแขยงข้างลายที่พบในประเทศไทยไม่ใช่ชนิด *Mystus vittatus* ซึ่งมีการกระจายพันธุ์อยู่เฉพาะในแถบประเทศอินเดียและประเทศที่อยู่ใกล้เคียงอินเดีย และรายงานปลา

แขวงช้างลายที่พบทั้งหมดในประเทศไทยมีจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ *Mystus atrifasciatus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus* และ *M. rhegma* ซึ่งมี 2 ชนิด คือ *Mystus multiradiatus* และ *M. mysticetus* เป็นปลาชนิดใหม่ พร้อมกับจัดทำคู่มือในการวิเคราะห์ชนิดโดยอาศัยลักษณะที่สำคัญดังนี้คือ จำนวนซี่กรองเหงือก ตำแหน่งของตา ความยาวของหนวด ร่องกึ่งกลางหัว กระดูก occipital process ความยาวของครีบไขมัน และแถบสีบริเวณลำตัว ตัวอย่างปลาที่นำมาตั้งเป็น holotype ของ *M. multiradiatus* และ *M. mysticetus* ได้มาจากบริเวณปากน้ำโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์และตลาดจังหวัดนครพนม ตามลำดับ Roberts (1994) รายงานชนิดของปลาในวงศ์ Bagridae เพิ่มขึ้นอีก 2 ชนิด คือ *Mystus albolineatus* และ *M. singaringan* โดยรายงานว่า *Mystus albolineatus* เป็นปลาชนิดใหม่ Roberts กล่าวว่า *M. albolineatus* มีลักษณะคล้ายกับ *M. singaringan* แต่ *M. albolineatus* มีแถบสีขาวทอดตามแนวยาวอยู่บริเวณแนวกลางตัว และบริเวณด้านหน้าฐานครีบหลังมีกลุ่มของจุดสีดำจางๆ ตัวอย่างปลาที่นำมาตั้งเป็น holotype ได้มาจาก ตลาดปราจีนบุรี

Sontirat และ คณะ (1995) ทำการสำรวจชนิดปลาของแม่น้ำยมและรายงานว่าพบปลาวงศ์ Bagridae จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ *Mystus nemurus*, *M. planiceps*, *M. rhegma*, *M. wycki* และ *M. wyckioides* สำหรับรายงานชนิดปลาในวงศ์นี้ที่กรมประมงได้ทำการสำรวจพบตามแหล่งน้ำต่างๆ ของประเทศไทยแสดงตามตารางที่ 2

Ferraris และ Runge (1999) ทำการศึกษาของกลุ่มของปลาคอดหัวเหลี่ยมที่พบในเอเชียใต้และพบว่าควรจัดให้อยู่ในสกุล *Sperata* แทนสกุล *Aorichthys* เนื่องจากเป็นชื่อที่รายงานก่อน พร้อมกันนี้ได้รายงานปลาที่พบทั้งหมดในสกุลนี้ทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ *Sperata acicularis*, *S. aorella*, *S. aor* และ *S. seenghala* โดย Ferraris และ Runge รายงาน *Sperata acicularis* ที่มีการแพร่กระจายกว้างในระบบลุ่มน้ำของประเทศพม่าเป็นปลาชนิดใหม่ ตัวอย่างปลาบางตัวได้จากตลาดปลาในประเทศไทย

การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของปลาในวงศ์ Bagridae

Bleeker (1863) ทำการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของแถบพื้นของกลุ่มปลาที่อยู่ในวงศ์ Bagridae ได้แก่ *Bagrichthys hypselopterus*, *Pseudobagrichthys macracanthus*, *P. macropterus*, *Leiocassis stenomus*, *Hemibagrus hoeveni*, *H. nemurus*, *H. wyckii*, *Hypselobagrus macronema*, *H. wolffii*, *H. gulio* และ *H. micracanthus* Hora และ Law (1941) ทำการศึกษาถึงลักษณะของ

แถบฟัน ระบบท่อทางเดินอาหาร และกระเพาะลมในปลาสกุล *Batasio* จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ *Batasio batasio*, *B. tengana* และ *B. travencoria* พบว่าแถบฟันบนเพดานปาก ขากรรไกรบน และขากรรไกรล่างเป็นแถบกว้าง กระเพาะอาหารรูปร่างกลมมน ลำไส้สั้น กระเพาะลมรูปร่างคล้ายรูปหัวใจ Jayaram (1954) ทำการศึกษาถึงลักษณะโครงสร้างภายในเหมือนกับวิธีการของ Hora และ Law ในปลาสกุล *Mystus* จำนวน 11 ชนิด และ 1 ชนิดย่อย ได้แก่ *Mystus (Mystus) bleekeri*, *M. (M.) cavasius*, *M. (M.) vittatus*, *M. (M.) vittatus horai*, *M. (M.) armatus*, *M. (M.) oculatus*, *M. (M.) montanus*, *M. (M.) gulio*, *M. (M.) malabaricus*, *M. (M.) menoda*, *M. (Osteobagrus) aor* และ *M. (O.) leucophasis* พบว่าแถบฟันบนเพดานปากเป็นแถบเชื่อมติดต่อกัน แถบฟันบริเวณขากรรไกรล่างเป็นรูปโค้งมีตอนกลางแยกจากกัน กระเพาะอาหารมีรูปร่างกลมมน ลำไส้มีความยาวปานกลาง กระเพาะลมรูปร่างคล้ายรูปหัวใจและมีลายเส้นกระจายในบริเวณผิวหน้า Saxena และคณะ (1963) ทำการศึกษาโครงสร้างของกระดูกศีรษะใน *Mystus (Osteobagrus) seenghala* พบว่ากะโหลกศีรษะมีรูปร่างยาว ส่วนของกระดูก mesethmoid มีขนาดใหญ่

Tilak (1963) ทำการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของกระดูกศีรษะและกระดูก Weberian apparatus ของปลาในวงศ์ Bagridae จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ *Horabagrus brachysoma*, *Mystus (Mystus) cavasius*, *M. (M.) gulio*, *M. (M.) oculatus*, *M. (M.) vittatus*, *Mystus (Osteobagrus) aor*, *M. (O.) seenghala* และ *Rita rita* พบว่ากะโหลกศีรษะมีขนาดกว้าง กระดูก Mülerrain process เปรี้ยวแหลม กระดูก metapterygoid มีขนาดเล็ก ยกเว้นใน *Mystus (Osteobagrus) aor*, *M. (O.) seenghala*, *Horabagrus brachysoma* กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนกว้าง Jayaram (1966a) ทำการศึกษาลักษณะของแถบฟันและกระเพาะลมใน *Rita chrysea*, *R. kuturnee* และ *R. rita* พบว่าปลาในสกุลนี้มีแถบฟันบริเวณเพดานปากและขากรรไกรขนาดใหญ่ ฟันบริเวณขากรรไกรบนเป็นแบบ villiform ฟันบริเวณเพดานปากเป็นแบบ molariform ฟันบริเวณขากรรไกรล่างมีทั้งแบบ villiform และ molariform กระเพาะลมมี 2 ตอน ตอนแรกมีขนาดใหญ่รูปร่างกลม ตอนหลังมีขนาดเล็กรูปร่างยาวรี Jayaram (1968) ทำการศึกษาลักษณะของกระเพาะลมใน *Pelteobagrus nitidus* พบว่ามีรูปร่างของกระเพาะลมคล้ายรูปหัวใจและบริเวณขอบด้านข้างมีสันนูนขนาดเล็กจำนวนมาก

Mo (1991) ทำการศึกษาลักษณะโครงสร้างของกระดูกปลาในวงศ์ Bagridae พร้อมกับได้แสดงภาพลักษณะโครงสร้างกระดูกศีรษะบางส่วนของ *Aorichthys aor*, *Auchenoglanis*

fasciatus, *Bagrichthys macropterus*, *Bagrus bajad*, *B. docmak*, *B. meridionalis*, *Chrysichthys sianena*, *Clarotes laticeps*, *Leiocassis leiocanthus*, *L. micropogon*, *Lophiobagrus equilus*, *Mystus cavasius*, *M. wyckii* และ *Pseudobagrus meridionalis* แสดงภาพลักษณะโครงสร้างระบบกล้ามเนื้อบางส่วนของ *Auchenoglanis occidentalis*, *Bagrus docmak*, *Chrysichthys auratus*, *C. brachynemus*, *Notoglanidium thomasi* และ *Notoglanidium* sp. นอกจากนี้ Mo ได้แบ่งวงศ์ Bagridae ออกเป็น 3 วงศ์ คือวงศ์ Bagridae, Claroteidae และ Austroglanididae โดยอาศัยลักษณะของกระดูกและมัดกล้ามเนื้อที่สำคัญได้แก่ กระดูก posttemporal, Müllerian process, vomer, parasphenoid, cleithrum, pharyngobranchial, hypobranchial, maxilla, metapterygoid, entopterygoid และมัดกล้ามเนื้อ levator operculi และนำชื่อสกุล *Hemibagrus* ที่ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Bleeker ในปี ค.ศ. 1862 ซึ่งมี *Bagrus nemurus* Val. in Cuv. And Val., 1839 เป็นชนิดต้นแบบกลับมาใช้อีกครั้งโดยอาศัยลักษณะของซี่กระดูก metapterygoid ที่มีขนาดใหญ่และมีลักษณะเป็นแผ่นแบนบาง Ng และ Ng (1995) ทำการศึกษาลักษณะของแถบฟันใน *Hemibagrus gracilis* ที่เป็นปลาชนิดใหม่ที่พบในประเทศมาเลเซีย

ประไพศิริ (2511) ทำการศึกษาลักษณะและหน้าที่ของกระเพาะลมในปลาพวกแคทพิชหลายชนิดพบว่ากระเพาะลมของปลาในวงศ์ Bagridae ได้แก่ *Mystus cavasius*, *M. nemurus*, *M. vittatus* และ *M. wolffi* มีลักษณะคล้ายรูปหัวใจหรือรูปสามเหลี่ยม ภายในกระเพาะลมแบ่งออกเป็นห้องๆ โดยมีผนังกั้นกลางจากรูเปิดของท่อนิวเมติกไปยังปลายสุดของกระเพาะลมและยังมีผนังที่ยึดหยุ่นได้คล้ายฟองน้ำกั้นตามขวางแบ่งกระเพาะลมออกเป็นห้องๆ โดยแต่ละห้องมีทางติดต่อถึงกันได้ ส่วนตอนหน้าของรูเปิดของท่อนิวเมติกเป็นห้องกว้างไม่มีผนังกั้น

การกระจายพันธุ์ของปลาในวงศ์ Bagridae

Berra (1981) และ Burgess (1989) รายงานว่าปลาในวงศ์ Bagridae มีการกระจายพันธุ์เป็นบริเวณกว้างจากทวีปแอฟริกาและประเทศซีเรียถึงประเทศปากีสถาน อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา พม่า ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ด้านตะวันออกของอินเดีย จีน ไต้หวัน เกาหลี และญี่ปุ่น Jayaram (1968) รายงานว่าปลาในวงศ์ Bagridae ไม่มีการกระจายพันธุ์ในคาบสมุทรอาหรับ Nelson (1994) กล่าวว่าปลาในวงศ์นี้พบมากทั้งในบริเวณน้ำกร่อยและน้ำจืด จำนวนชนิดทั้งหมดที่พบมีประมาณ 200 กว่าชนิด จำนวนชนิดที่พบในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียมีจำนวนใกล้เคียงกัน

Smith (1945) กล่าวถึงแหล่งที่พบปลาในวงศ์ Bagridae ในประเทศไทยโดยรายงานว่า *Bagroides melapterus* พบในบริเวณแม่น้ำน่าน *B. macropterus* พบในบริเวณเขาใหญ่และแม่น้ำเจ้าพระยา *Leiocassis siamensis* มีการกระจายพันธุ์กว้างโดยพบในบริเวณปากน้ำโพธิ์ แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำมูล แม่น้ำปาดานี แม่น้ำจันทบุรี และแม่น้ำปิง *L. stenomus* พบบริเวณแม่น้ำจันทบุรี *Mystus wolffi* พบบริเวณแม่น้ำปาดานี แม่น้ำตาปี แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และแม่น้ำปิง *M. gulio* พบในบริเวณแม่น้ำปาดานี แม่น้ำจันทบุรี และ แม่น้ำจันทบุรีตอนล่าง *M. vittatus* พบในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ปึงบอระเพ็ด แม่น้ำปิง แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำแม่กลอง *M. nemurus* พบในบริเวณแม่น้ำน่าน แม่น้ำปิง แม่น้ำโขง แม่น้ำมูล แม่น้ำตาปี แม่น้ำปาดานี และแม่น้ำจันทบุรี *M. planiceps* เก็บตัวอย่างได้จากบริเวณภาคกลางและบริเวณภาคใต้ *M. wycki* พบในบริเวณแม่น้ำยม แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำปิง *M. havmolleri* พบบริเวณลำธารขนาดเล็กในอำเภอร้อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช *M. cavasius* พบในบริเวณแม่น้ำตาปี แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำโขง และแม่น้ำพอง *M. micracanthus* พบในบริเวณแม่น้ำจันทบุรี *Heterobagrus bocourti* พบในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำมูล และแม่น้ำน่าน

แหล่งที่อยู่อาศัยและอุปนิสัยในการกินอาหารของปลาในวงศ์ Bagridae

Burgess (1989) รายงานว่าปลาในวงศ์ Bagridae ชอบหลบซ่อนตัวภายในโพรงหรือรอยแยกของหินในช่วงเวลากลางวันและออกหากินเวลากลางคืน ปลาในวงศ์นี้หลายชนิดเป็นผู้ล่า (predator) และมีบางชนิดที่สามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์ (omnivorous) โดยปลาออกหากินอาหารในบริเวณบนหรือใกล้พื้น อาหารที่ปลากินเป็นพวกลูกปลาที่มีขนาดเล็ก หนอนตัวกลม ตัวอ่อนแมลงและพวกครัสเตเชียนที่มีขนาดเล็ก

Roberts (1992) ทำการศึกษาถึงส่วนประกอบของอาหารภายในกระเพาะของกลุ่มปลาแขยงข้างลายที่พบในประเทศไทยจำนวน 4 ชนิดและรายงานว่าพบเกล็ดปลาขนาดเล็กภายในกระเพาะของ *Mystus rhegma* และ *M. atrifasciatus* กุ้งเป็นอาหารสำคัญใน *M. atrifasciatus* เมล็ดข้าวพบภายในกระเพาะของ *M. rhegma* และ *M. atrifasciatus* เลนส์ตาของปลาพบมากในกระเพาะของ *M. rhegma* และ *M. multiradiatus* ฝาปิดปากของหอยขนาดเล็ก ostracod และ cladocera พบเป็นปริมาณมากภายในกระเพาะของ *M. multiradiatus* และ *M. mysticetus* Roberts (1994) ทำการศึกษาถึงส่วนประกอบของอาหารภายในกระเพาะของ *M. pelusius* และรายงานว่า

พบเกล็ดปลาในกลุ่มตะเพียนและเลนส์ตาของปลา Rainboth (1996) รายงานว่า *Bagrichthys macracanthus* และ *B. macropterus* ชอบอาศัยอยู่ตามแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่และน้ำขุ่น ชอบกินอาหารที่เป็นพวกครัสเตเชียน สัตว์หน้าดินขนาดเล็ก และลูกปลา *Heterobagrus bocourti* ชอบกินอาหารที่เป็นพวกครัสเตเชียนและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าดิน *Leiocassis siamensis* กินพวกตัวอ่อนแมลงที่อาศัยอยู่ในน้ำ *Mystus mysticetus*, *M. albolineatus*, *M. filamentus*, *M. singaringan*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. nemurus*, *M. rhegma*, *M. wolffi*, *M. wycki* และ *M. wyckioides* ชอบอาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำ ลำธาร หรืออ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ ชนิดของอาหารที่พบภายในกระเพาะได้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ ตัวอ่อนของแมลงรวมทั้งพวก หนอนแดง ลูกปลานขนาดเล็ก และกุ้ง

ชีววิทยาในการสืบพันธุ์วางไข่ของปลาในวงศ์ Bagridae

Burgess (1989) รายงานว่า *Rita rita* วางไข่แบบติดและไข่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มิลลิเมตร ไข่ฟักออกเป็นตัวภายในเวลา 20 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส *Auchenoglanis occidentalis* ชอบวางไข่ในพื้นที่น้ำท่วมในบริเวณแม่น้ำไนล์และทะเลสาบแองกานิกา สันทนาและทัสพล (2537) รายงานว่า *Mystus nemurus* เพศเมียที่มีความยาวเฉลี่ย 43.5 เซนติเมตร ที่สำรวจพบในบริเวณเขื่อนรัชชประภา มีความคกของไข่ประมาณ 16,261 ฟอง ไข่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.35 มิลลิเมตร ปลาชนิดนี้มีฤดูวางไข่ในเดือนกรกฎาคมและตุลาคม Rainboth (1996) รายงานว่า *Bagrichthys macracanthus* และ *B. macropterus* วางไข่ในช่วงต้นฤดูฝนและลูกปลาอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมในบริเวณป่า ปลาในระยะ juvenile ปรากฏให้เห็นในเดือนสิงหาคม *Leiocassis siamensis* มีรังไข่พัฒนาในเดือนกุมภาพันธ์ และจะเริ่มวางไข่ในช่วงต้นฤดูฝน ลูกปลาปรากฏให้เห็นในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม โยธินและรังสิต (2524) ทำการศึกษาชีววิทยาของปลากดเหลืองในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และรายงานว่าฤดูวางไข่ของปลากดเหลืองอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกันยายน และระยะที่วางไข่มากที่สุดคือเดือน พฤษภาคมและกันยายน อำนวยและวสันต์ (2525) ได้ทดลองเพาะพันธุ์ปลากดเหลืองโดยวิธีผสมเทียม โดยรวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแม่น้ำเจ้าพระยามาเลี้ยงไว้ในบ่อดินและทำการตรวจสอบรังไข่และถุงน้ำเชื้อของปลากดเหลืองที่เลี้ยงไว้ในบ่อดิน จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ารังไข่และน้ำเชื้อของปลากดเหลืองพร้อมผสมเทียมได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม ศาสวัต (2539) ทำการศึกษาชีวประวัติบางประการของปลากดเหลืองในบริเวณลำน้ำเจ้าพระยานับแต่บริเวณใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงไปจนสุดเขตบ้านคอนกระเบื้อง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พบว่าปลาเต็มวัยเพศผู้รูปร่างเรียวยาว

อวัยวะเพศภายนอกเป็นติ่งแหลมยาว อันตะเป็นพวงสีขาว ปลาเต็มวัยเพศเมียรูปร่างป้อม ในฤดูผสมพันธุ์วางไข่ส่วนท้องจะขยายใหญ่ ไข่ปลากดเหลืองเป็นประเทจมติด ไข่แก่ลักษณะกลม สีน้ำตาลใส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไข่ 0.97 ± 0.12 มิลลิเมตร ไข่ที่ปฏิสนธิฟักออกเป็นตัวในเวลา 17 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ± 0.5 องศาเซลเซียส โดยมีการเจริญสู่ระยะคลีเวล บลาสตูลา แกสตรูลาตอนต้น แกสตรูลาตอนปลาย คัพพะตอนต้น และคัพพะตอนปลายภายใน 30 นาที, 2 ชั่วโมง 50 นาที, 4 ชั่วโมง 25 นาที, 6 ชั่วโมง 10 นาที, 7 ชั่วโมง 15 นาที และ 12 ชั่วโมง 25 นาที หลังปฏิสนธิ ตามลำดับ

ตารางที่ 1 รายชื่อสกุล สถานภาพ ชนิดต้นแบบสกุลและการกระจายพันธุ์ของปลาวงศ์ Bagridae ที่พบใน โลกตาม Eschmeyer (1998)

สกุล (Genus)	ต้นแบบของสกุล (type species of Genus)	การกระจายพันธุ์ (distribution)
1. <i>Amarginops</i> Nichols & Griscom, 1917	<i>Amarginops platatus</i> Nichol & Griscom, 1917	Stanlayville, Lower Zaire, Boma, Congo, Quanza River and Bengo River, Tanganyika, Lualaba system, Zaire Riversystem, Buzi Ri system, Zaire-Lualaba River system, Gabon, Congo, River Nile
2. <i>Anaspidoglanis</i> Teugels, Risch, de Vos & Thys van den Audenaerde, 1991	<i>Auchenoglanis macrostoma</i> Pellegrin, 1909	Ogowe River at Ngamo, Gabon
3. <i>Aria</i> Jordan, 1919 (Synonym of Genus <i>Sperata</i>)	<i>Bagrus lamarrii</i> Val. in Cuv. & Val., 1846	เหมือนสกุล <i>Sperata</i>
4. <i>Aorichthys</i> Wu, 1939 (Synonym of Genus <i>Sperata</i>)	<i>Bagrus lamarrii</i> Val. in Cuv. & Val., 1846	เหมือนสกุล <i>Sperata</i>
5. <i>Aspidobagrus</i> Bleeker, 1862 (Synonym of Genus <i>Mystus</i>)	<i>Bagrus gulio</i> Hamilton, 1822	เหมือนสกุล <i>Mystus</i>
6. <i>Auchenaspis</i> Bleeker, 1858 (Synonym of Genus <i>Auchenoglanis</i>)	<i>Pimelodus biscutatus</i> Geoffroy St. Hilaire, 1809	เหมือนสกุล <i>Auchenoglanis</i>

ตารางที่ 1 ต่อ

สกุล (Genus)	ต้นแบบของสกุล (type species of Genus)	การกระจายพันธุ์ (distribution)
7. <i>Auchenoglanis</i> Günther, 1865	<i>Pimelodus biscutatus</i> Geoffroy St. Hilaire, 1809	Nigeria, South Cameroon, Gabon, Zaire, River Nile, Niger, Senegal and Lake Chad basin, Nigeria, S. Benin, S. Nigeria, Nola, Middle Congo, Cameroon, Upper Zambesi River system, West Africa, Zaire-Lualaba River system, East Africa Lake, Omo River, Giuba River, River Ntem
8. <i>Austroglanis</i> Skelton, Risch & de Vos, 1984	<i>Gephyroglanis sclateri</i> Boulenger, 1901	Southern African
9. <i>Bagrichthys</i> Bleeker, 1858	<i>Bagrus hyalopecterus</i> Bleeker, 1852	Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Sumatra, Borneo, Java
10. <i>Bagroides</i> Bleeker, 1851	<i>Bagroides melapterus</i> Bleeker, 1851	Borneo, Sumatra
11. <i>Bagrus</i> Bosc, 1816	<i>Silurus bajad</i> Forsskal, 1775	River Nile, Lake Chad, River Niger, River Senegal, Lake Mobutu & Turkana, Zaire, Lake Victoria, Senegal Volta, East African Rift Lake, Shire River, Lake Malawi, River Pangani (Tanzania), Giuba River (Somalia)
12. <i>Batasio</i> Blyth, 1860	<i>Batasio buchanani</i> Blyth, 1860 (= <i>Pimelodus batasio</i> Hamilton, 1822)	Bangladesh, Myanmar, Thailand, Malaysia

ตารางที่ 1 ต่อ

สกุล (Genus)	ต้นแบบของสกุล (type species of Genus)	การกระจายพันธุ์ (distribution)
13. <i>Bathybagnus</i> Bailey & Stewart, 1984	<i>Bathybagnus tetranema</i> Bailey & Stewart, 1984	Lake Tanganyika
14. <i>Brachymystus</i> (subgenus of <i>Mystus</i>) Fowler, 1937 (Synonym of Genus <i>Hemibagnus</i>)	<i>Bagnus nemurus</i> Val. in Cuv. & Val., 1839	เหมือนสกุล <i>Hemibagnus</i>
15. <i>Chandramara</i> Jayaram, 1972	<i>Pimelodus chandramara</i> Hamilton, 1822	East Africa, Nile, Niger, Volta River and Senegal River, Lake Chad, Giuba River (Somalia), Gelib, Fleuve Juba, somalie Meridionale
16. <i>Chrysichthys</i> Bleeker, 1858	<i>Pimelodus auratus</i> Geoffroy St. Hilaire, 1809	River Nile, Lake Turkana, River Niger, Volta River, Senegal, Lake Chad, Zaire River system, Luabala River system, West Africa, Zaire, Upper Guinea Rivers, River Nyong (Cameroon), West Africa from Senegal to Cabinda, Lake Mwero, Ivory Coast, Ogowe-Nyanga River, Gabon, Poko Uele
17. <i>Chrysobagnus</i> Boulenger, 1899 (Synonym of Genus <i>Chrysichthys</i>)	<i>Chrysobagnus brevibarbis</i> Boulenger, 1899	เหมือนสกุล <i>Chrysichthys</i>

สกุล (Genus)	ต้นแบบของสกุล (type species of Genus)	การกระจายพันธุ์ (distribution)
18. <i>Clarotes</i> Kner, 1855	<i>Clarotes heuglini</i> Kner, 1855	East Africa, Nile, Niger River and Senegal River, Lake Chad, Giuba River (Somalia), Volta River
19. <i>Coreobagrus</i> Mori, 1936(Synonym of Genus <i>Pseudobagrus</i>)	<i>Coreobagrus brevicorpus</i> Mori, 1936	เหมือนสกุล <i>Pseudobagrus</i>
20. <i>Dermocassis</i> (subgenus of <i>Leiocassis</i>) Nichols, 1925 (Synonym of Genus <i>Leiocassis</i>)	<i>Bagrus ussuriensis</i> Dybowski, 1872	เหมือนสกุล <i>Leiocassis</i>
21. <i>Duxordia</i> Tickell in Day, 1888 (Synonym of Genus <i>Leiocassis</i>)	<i>Leiocassis fluviatilis</i> Day, 1888	เหมือนสกุล <i>Leiocassis</i>
22. <i>Fluviadraco</i> Jordan & Fowler, 1903 (Synonym of Genus <i>Pelteobagrus</i>)	<i>Pseudobagrus ransonnetii</i> Steindachner, 1887)	เหมือนสกุล <i>Pelteobagrus</i>
23. <i>Gephyrogalanis</i> Boulenger, 1899	<i>Gephyrogalanis congicus</i> Boulenger, 1899	Zaire-Lualaba River system, Arawimi River and Port Congo, Cameroon, Nigeria, Coastal River from Liberia to Cabinda (Angola), Zaire-Lualaba River system, Ogowe-Nyanga River basin (Gabon) Ivory Coast and Ghana, Cabinda

ตารางที่ 1 ต่อ

สกุล (Genus)	ต้นแบบของสกุล (type species of Genus)	การกระจายพันธุ์ (distribution)
24. <i>Gnathobagrus</i> Nichols & Griscom, 1917 (Synonym of Genus <i>Amarginops</i>)	<i>Gnathobagrus depressus</i> Nichols & Griscom, 1917	เหมือนสกุล <i>Amarginops</i>
25. <i>Gogrius</i> Day, 1867 (Synonym of Genus <i>Rita</i>)	<i>Gogrius sykesi</i> Day, 1867 (= <i>Pimelodus gogra</i> Sykes, 1834)	เหมือนสกุล <i>Rita</i>
26. <i>Gonocephalus</i> Kner, 1855 (Synonym of Genus <i>Clarotes</i>)	<i>Clarotes heuglini</i> Kner, 1855	เหมือนสกุล <i>Clarotes</i>
27. <i>Hemibagrus</i> Bleeker, 1862	<i>Bagrus nemurus</i> Val. in Cuv. & Val., 1839	China, Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Malay peninsular, Singapore, Japan, Borneo, Southeast Asia, Westward to Myanmar and northward to South China
28. <i>Heterobagrus</i> Bleeker, 1864 (Synonym of Genus <i>Mystus</i>)	<i>Heterobagrus bocourti</i> Bleeker, 1864	เหมือนสกุล <i>Mystus</i>
29. <i>Horabagrus</i> Jayaram, 1955	<i>Pseudobagrus brachysoma</i> Günther, 1864	India: Kerala backwater
30. <i>Hypselobagrus</i> Bleeker, 1862 (Synonym of Genus <i>Mystus</i>)	<i>Bagrus macronema</i> Bleeker, 1846	เหมือนสกุล <i>Mystus</i>

ตารางที่ 1 ต่อ

สกุล (Genus)	ต้นแบบของสกุล (type species of Genus)	การกระจายพันธุ์ (distribution)
31. <i>Leiocassis</i> Bleeker, 1858	<i>Bagrus poecilopterus</i> Kühl & van Hasselt in Cuv. & Val., 1839	Thailand, Laos, Cambodia, Veitnam, Borneo, Hong Kong, China, Korea
32. <i>Liauchenoglanis</i> Boulenger, 1916	<i>Liauchenoglanis maculatus</i> Boulenger, 1916	Sierra Leone
33. <i>Lophiobagrus</i> Pall, 1942	<i>Lophiobagrus lestradei</i> Poll, 1942	Lake Tanganyika
34. <i>Macrones</i> Dumeril, 1856(Synonym of Genus <i>Mystus</i>)	<i>Bagrus lamarrii</i> Val. in Cuv. & Val., 1840	เหมือนสกุล <i>Mystus</i>
35. <i>Macronichthys</i> White & Moy-Thomas, 1940 (Synonym of Genus <i>Sperata</i>)	<i>Bagrus lamarii</i> Val. in Cuv. & Val., 1840	เหมือนสกุล <i>Sperata</i>
36. <i>Macronoides</i> (subgenus of <i>Macrones</i>) Hora, 1921 (Synonym of Genus <i>Batasio</i>)	<i>Batasio affinis</i> Blyth, 1861	เหมือนสกุล <i>Batasio</i>
37. <i>Macropterochanna</i> (subgenus of <i>Hemibagrus</i>) Nichols, 1925 (Synonym of Genus <i>Mystus</i>)	<i>Hemibagrus macropterus</i> Bleeker, 1870	เหมือนสกุล <i>Mystus</i>

สกุล (Genus)	ต้นแบบของสกุล (type species of Genus)	การกระจายพันธุ์ (distribution)
38. <i>Melanodactylus</i> Bleeker, 1858 (Synonym of Genus <i>Chrisichthys</i>)	<i>Arius acutivelis</i> Val. in Cuv. & Val., 1840	เหมือนสกุล <i>Chrisichthys</i>
39. <i>Mystus</i> Gronow, 1763	Masc. Not available, published in reject work on official Index (Opinion 261)	เหมือนกับ <i>Mystus</i> Scopoli, 1777
40. <i>Mystus</i> Scopoli (ex Gronow), 1777	<i>Bagrus halapensis</i> Val. in Cuv. & Val., 1839	India, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Nepal, China Sri Lanka, Thailand, Laos, Veitnam, Cambodia, Malay peninsula, Sumatra, Borneo, Java, Singapore, Tigris-Euphrates basin
41. <i>Nanobagrus</i> Mo, 1991 (Synonym of Genus <i>Leiocassis</i>)	<i>Akysis armatus</i> Vaillant, 1902	Borneo
42. <i>Nasocassis</i> (subgenus of <i>Leiocassis</i>) Nichols, 1925 (Synonym of Genus <i>Leiocassis</i>)	<i>Leiocassis longirostris</i> Günther, 1864	เหมือนสกุล <i>Leiocassis</i>
43. <i>Notoglanidium</i> Günther, 1903	<i>Notoglanidium walkeri</i> Günther, 1903	Ghana, Ivory Coast (Agneby)
44. <i>Octonemataichthys</i> Bleeker, 1858 (Synonym of Genus <i>Clarotes</i>)	<i>Bagrus nigrita</i> Val. in Cuv. & Val., 1839	เหมือนสกุล <i>Clarotes</i>

สกุล (Genus)	ต้นแบบของสกุล (type species of Genus)	การกระจายพันธุ์ (distribution)
45. <i>Osteobagrus</i> (subgenus of <i>Mystus</i>) Jayaram, 1954 (Synonym of Genus <i>Sperata</i>)	<i>Pimelodus aor</i> Hamilton, 1822	เหมือนสกุล <i>Sperata</i>
46. <i>Oxyglanis</i> Vinciguerra, 1898 (Synonym of Genus <i>Auchenoglanis</i>)	<i>Oxyglanis sacchii</i> Vinciguerra, 1898	เหมือนสกุล <i>Auchenoglanis</i>
47. <i>Parachenoglanis</i> Boulenger, 1911	<i>Pimelodus guttatus</i> Lönnerberg, 1895	Lower zaire River system, Angola, Gabon, Aquatorial Africa, S.Cameroon, Congo
48. <i>Pardiglanis</i> Poll, Lanza & Romoli Sassi, 1972 (Synonym of Genus <i>Clarotes</i>)	<i>Pardiglanis tarabinii</i> Poll, Lanza & Romoli Sassi, 1972	เหมือนสกุล <i>Clarotes</i>
49. <i>Pelteobagrus</i> Bleeker, 1865	<i>Silurus calvarius</i> Basilewsky, 1855	Siberia, China, Japan, Hainan, Taiwan, Malaysia
50. <i>Phyllonemus</i> Boulenger, 1906	<i>Phyllonemus typus</i> Boulenger, 1906	Zaire, Lake Tanganyika
51. <i>Platyglanis</i> Daget, 1979	<i>Platyglanis depierrei</i> Daget, 1979	South Cameroon, Lower Zaire
52. <i>Porcus</i> Geoffroy St. Hilaire, 1808 (Synonym of Genus <i>Bagrus</i>)	<i>Silurus bajad</i> Forsskal, 1776	เหมือนสกุล <i>Bagrus</i>

สกุล (Genus)	ต้นแบบของสกุล (type species of Genus)	การกระจายพันธุ์ (distribution)
53. <i>Prajadhipokia</i> Fowler, 1934 (Synonym of Genus <i>Mystus</i>)	<i>Prajadhipokia rex</i> Fowler, 1934	เหมือนสกุล <i>Mystus</i>
54. <i>Pseudobagrichthys</i> Bleeker, 1862 (Synonym of Genus <i>Bagrichthys</i>)	<i>Bagriodes macropterus</i> Bleeker, 1853	เหมือนสกุล <i>Bagrichthys</i>
55. <i>Pseudobagrus</i> Bleeker, 1859	<i>Bagrus aurantiacus</i> Temminck & Schlegel, 1846	Korea, China, Taiwan, Japan, Yunnan
56. <i>Pseudomystus</i> (subgenus of <i>Leiocassis</i>) Jayaram, 1968 (Synonym of Genus <i>Leiocassis</i>)	<i>Bagrus stenomus</i> Val. in Cuv. & Val., 1839	เหมือนสกุล <i>Leiocassis</i>
57. <i>Rama</i> Bleeker, 1858 (Synonym of Genus <i>Batasio</i>)	<i>Rama buchani</i> Bleeker, 1858 (= <i>Pimelodus rama</i> Hamilton, 1822)	เหมือนสกุล <i>Batasio</i>
58. <i>Rheoglanis</i> Poll, 1966 (Synonym of Genus <i>Amarginops</i>)	<i>Rheoglanis dendrophorus</i> Poll, 1966	เหมือนสกุล <i>Amarginops</i>
59. <i>Rhinobagrus</i> Bleeker, 1865 (Synonym of Genus <i>Leiocassis</i>)	<i>Rhinobagrus dumerili</i> Bleeker, 1865	เหมือนสกุล <i>Leiocassis</i>

ตารางที่ 1 ต่อ

สกุล (Genus)	ต้นแบบของสกุล (type species of Genus)	การกระจายพันธุ์ (distribution)
60. <i>Rita</i> Bleeker, 1853	<i>Rita buchanani</i> Bleeker, 1853 (= <i>Pimelodus rita</i> Hamilton, 1822)	India, Pakistan, Bangladesh, Myanmar
61. <i>Sperata</i> Holly, 1939	<i>Bagrus lamarrii</i> Val. in Cuv. & Val., 1840	Ayeyarwaddy, Bago River and Tenasserim River systems of Myanmar, Thailand, Salween River, Ganges River System of India, Bangladesh and Nepal, Peninsular India south to the Cauvery River, Krishna River

ตารางที่ 2 ต่อ

สถานที่	ชนิดที่พบ																						จำนวน (ชนิด)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
แม่น้ำมูล (ใบไม้ทะเลสาบ, 2535)		X			X		X			X			X			X		X		X		8	
เขื่อนบางลาง (กักเก็บทะเลสาบ, 2536)													X									1	
เขื่อนป่าสัก (เก็บกักน้ำทะเลสาบ, 2536)		X					X						X							X		4	
แม่น้ำบางซัด อ.นครสวรรค์ (ใบไม้ทะเลสาบ, 2536)							X	X		X	X		X					X		X		7	
เขื่อนกระเสียว (เขื่อนวัดทะเลสาบ, 2536)							X						X		X							3	
เขื่อนพระปักษี (สุโขทัย, 2537)			X										X					X				3	
เขื่อนกสิกรรม (เขื่อนวัดทะเลสาบ, 2537)			X										X									2	
แม่น้ำท่าหลวง (กักเก็บทะเลสาบ, 2537)							X			X			X				X					4	
เขื่อนศรีนครินทร์ (กักเก็บน้ำชลประทาน, 2537)				X			X						X		X						X	5	
คลองเปรมประชา (กักเก็บน้ำชลประทาน, 2538)							X	X								X		X				3	
เขื่อนพระปักษี (สุโขทัย, 2538)										X			X				X					3	
เขื่อนศรีนครินทร์ (กักเก็บน้ำชลประทาน, 2538)							X	X		X			X				X		X	X	X	7	
แม่น้ำปิตุคง (กักเก็บน้ำชลประทาน, 2538)													X									2	
เขื่อนศรีนครินทร์ (กักเก็บน้ำชลประทาน, 2538)						X							X									3	
เขื่อนศรีนครินทร์ (กักเก็บน้ำชลประทาน, 2539)			X	X									X							X		4	
เขื่อนศรีนครินทร์ (กักเก็บน้ำชลประทาน, 2541)	X								X									X				4	

หมายเหตุ : 1. *Aorichthys seenghala* (Sykes, 1841) 2. *Bagrioides macracanthus* (Bleeker, 1854) 3. *B. macropterus* (Bleeker, 1853)

4. *Batasio tengana* (Hamilton, 1822) 5. *Heterobagrus bocourti* Bleeker, 1864 6. *Leiocassis poecilopterus* (Val. in Cuv. & Val., 1839)
7. *L. siamensis* (Regan, 1913) 8. *L. stenopus* (Val. in Cuv. & Val., 1839) 9. *Mystus albolineatus* Roberts, 1994 10. *M. cavasius* (Hamilton, 1822)
11. *M. gulio* (Hamilton, 1822) 12. *M. nemurus* (Val. in Cuv. & Val., 1839) 13. *M. micracanthus* (Bleeker, 1846)
14. *M. microphthalmus* (Day, 1877) 15. *M. pluniceps* Val. in Cuv. & Val., 1839) 16. *M. pulcher* Chaudhuri, (1911) 17. *M. rhegma* Fowler, 1935
18. *M. rufescens* (Vinciguerra, 1890) 19. *M. vittatus* (Bloch, 1794) 20. *M. wolffi* (Bleeker, 1851) 21. *M. wycki* (Bleeker, 1858)
22. *M. wyckioides* Fang & Chaux, 1949

อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา

1. กล้องถ่ายรูปพร้อมขาตั้งกล้อง
2. ฟิล์มถ่ายรูป และฟิล์มเอกซเรย์
3. อุปกรณ์ในการเซ็ทครีปลา เช่น เข็มขนาดเล็ก และ แผ่นโฟม เป็นต้น
4. กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์วาดภาพ (camera lucida)
5. ชุดเครื่องมือผ่าตัด
6. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดนับ
7. ภาชนะที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง
8. ป้ายขนาดเล็กสำหรับใช้บันทึกวัน เวลา สถานที่ และข้อมูลอื่นๆ ในการเก็บ

ตัวอย่าง

9. ตารางบันทึกข้อมูล
10. น้ำยาและสารเคมีที่ใช้ในการเก็บรักษาตัวอย่าง การดองใส และการทำโครง

กระดูก

11. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ เช่น กระดาษวาดรูปและดินสอ เป็นต้น

แหล่งที่มาของตัวอย่าง

1. ตัวอย่างปลาในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUMF) และ สถาบันพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง (NIFI)
2. ตัวอย่างปลาจากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มน้ำต่างๆ

ตัวอย่างปลาที่ใช้ศึกษาเหล่านี้มีแหล่งที่เก็บจากกลุ่มน้ำต่างๆ ตามภาพที่ 1

***Bagrichthys macracanthus* (Bleeker, 1854)**

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 30 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 55.2-172.2 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 0915 (1 ตัวอย่าง, 72.2 mm SL) แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ H.M Smith
5 มกราคม 2469

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 0916 (1 ตัวอย่าง, 172.2 mm SL) แม่น้ำนครนายก อยุธยา
แสงสุวรรณ 12 มกราคม 2473; NIFI 2904 (6, 82.9-106.4) แม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ชวลิต วิทยานนท์, date unknown

ลุ่มน้ำแม่โขง NIFI 00474 (2 ตัวอย่าง, 100.8-115.8 mm SL) แม่น้ำมูล จ.อุบลราชธานี ปรีชา
เชียรเจริญ 11 มกราคม 2511; KUMF 00461 (2, 76.8-88.2) แม่น้ำโขง บ้านห้วยคอกไม้ อ.บึงกาฬ
จ.หนองคาย จรัสธาดา กรรณสูต 2 มีนาคม 2519

ตัวอย่างที่รวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 6500 (6 ตัวอย่าง, 55.2-77.2 mm SL) แม่น้ำบางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 15 ตุลาคม 2539

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 6501 (12 ตัวอย่าง, 132.8-137.8 mm SL) อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ชัยวุฒิ
กรุดพันธ์ 16, 23 กรกฎาคม 2541

***Bagrichthys macropterus* (Bleeker, 1853)**

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 46 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 44.1-213.4 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา NIFI 00472 (2 ตัวอย่าง, 78.1-86.3 mm SL) พวงคลองหนองหม้อ จ.อยุธยา
มะลิ ศรีรุ่งโรจน์ 15 มีนาคม 2514

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 0920 (1 ตัวอย่าง, 110.9 mm SL) แม่น้ำนครนายก สรวง
บุญสันทพบ 5 สิงหาคม 2472; KUMF 0917 (1, 134.1) แม่น้ำบางปะกงตอนบน H.M. Smith
4 มิถุนายน 2471; KUMF 0918 (1, 171.8) แม่น้ำนครนายก H.M. Smith 6 มิถุนายน 2471;
NIFI 2905 (3, 65.3-80.8) แม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ชวลิต วิทยานนท์, date unknown

ตัวอย่างที่รวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 6502 (12 ตัวอย่าง, 178.8-213.4 mm SL) ตลาดปทุมธานี ภาสกร
แสนจันแดง 10 ตุลาคม 2540

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 6503 (6 ตัวอย่าง, 44.1-76.2 mm SL) แม่น้ำบางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 15 กันยายน 2539

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 6504 (9 ตัวอย่าง, 115.2-197.3 mm SL) อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ภาสกร
แสนจันแดง 23 กรกฎาคม 2541; KUMF 6505 (11, 73.4-115.2) ตลาดริมมูล จ.อุบลราชธานี ภาสกร
แสนจันแดง 3 กันยายน 2540

Batasio blythi (Day, 1877)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 57 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 29.1-79.3 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 6506 (11 ตัวอย่าง, 54.2-63.9 mm SL) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สืบสิน สนธิรัตน์ 1 มิถุนายน 2540

ตัวอย่างที่รวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำภาคใต้ KUMF 6507 (19 ตัวอย่าง, 29.1-63.8 mm SL) จ.สุราษฎร์ธานี ชัยวุฒิ กรุดพันธ์

4 กันยายน 2539; KUMF 6509 (3, 72.2-79.3) อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ภาสกร แสนจันแดง

8 กรกฎาคม 2541; KUMF 6510 (5, 56.8-64.3) อ.สุคีริน จ.นราธิวาส ภาสกร แสนจันแดง

5 กรกฎาคม 2541

ลุ่มน้ำตะนาวศรี KUMF 6508 (19 ตัวอย่าง, 42.2-77.8 mm SL) อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ภาสกร

แสนจันแดง 20 มกราคม 2541

Hemibagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 75 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 62.3-454.3 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 2609 (1 ตัวอย่าง, 105.9 mm SL) ตลาดอยุธยา จ.อยุธยา 25 มกราคม 2517;

KUMF 0969 (1, 163.8) แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขาใหญ่ H.M. Smith 24 เมษายน 2471; KUMF

0962 (1, 173.8) แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณลานเท H.M. Smith 19 พฤศจิกายน 2466; KUMF 6513

(1, 365.3) ตลาดสะพานใหม่ กรุงเทพฯ ศาสวัต วรรณวิสันต์ มกราคม 2537; KUMF 6514

(1, 454.3) ตลาดปทุมธานี จ.ปทุมธานี ศาสวัต วรรณวิสันต์ 15 มกราคม 2538

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 0967 (1 ตัวอย่าง, 103.2 mm SL) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา H.M. Smith

19 มกราคม 2468

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 0973 (1 ตัวอย่าง, 102.8 mm SL) แม่น้ำจันทบุรี หลวงมัศยจิตรการ 4 มิถุนายน 2477

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 0961 (2 ตัวอย่าง, 146.2-150.3 mm SL) แม่น้ำปาดตานี H.M. Smith 15 ตุลาคม 2466; KUMF 6522 (9, 62.3-192.4) เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ทศพล กระจ่างดารา มิถุนายน 2537

ตัวอย่างที่รวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 6511 (5 ตัวอย่าง, 217.3-240.3 mm SL) ตลาดปทุมธานี จ.ปทุมธานี ภาสกร แสนจันแดง 16 มิถุนายน 2541; KUMF 6512 (1, 220.3) อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาสกร แสนจันแดง 28 มีนาคม 2541; KUMF 6515 (4, 314.8-424.8) ตลาดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ภาสกร แสนจันแดง 23 ธันวาคม 2541; KUMF 6516 (2, 281.8-316.6) ตลาดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ภาสกร แสนจันแดง 5 มกราคม 2542

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 6517 (5 ตัวอย่าง, 105.8-150.4 mm SL) ตลาดนครพนม จ.นครพนม ภาสกร แสนจันแดง 8 พฤศจิกายน 2541 ; KUMF 6518 (1, 282.3) อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ภาสกร แสนจันแดง 31 มีนาคม 2541

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 6519 (19 ตัวอย่าง, 87.8-315.8 mm SL) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ภาสกร แสนจันแดง 6,7 ธันวาคม 2540; KUMF 6520 (4, 141.2-292.6) ตลาดกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ภาสกร แสนจันแดง 5 ธันวาคม 2540

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 6521 (8 ตัวอย่าง, 147.8-194.2 mm SL) พรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส ภาสกร แสนจันแดง 9 กรกฎาคม 2541; KUMF 6523 (6, 137.3-222.8) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาสกร แสนจันแดง 30 มิถุนายน 2541; KUMF 6524 (1, 320.8) ตลาดยะลา จ.ยะลา ภาสกร แสนจันแดง 25 ธันวาคม 2540; KUMF 6525 (1, 213.4) ตลาดภูเก็จ จ.ภูเก็ต (ปลารับมาจาก ทะเลน้อย จ.พัทลุง) ภาสกร แสนจันแดง 22 กุมภาพันธ์ 2541

Hemibagrus microphthalmus (Day, 1877)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 51 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 56.2-524.3 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 1010 (1 ตัวอย่าง, 122.8 mm SL) แม่น้ำลพบุรี จ.ลพบุรี H.M. Smith 22 ตุลาคม 2469; KUMF 6527 (2, 308.1-342.3) ตลาดชัยนาท จ.ชัยนาท ศาสวัต วรรณวิสัย 8 ธันวาคม 2537

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 1012 (2 ตัวอย่าง, 122.8-124.1 mm SL) จ.กาญจนบุรี H.M. Smith

12 กันยายน 2471; KUMF 6537 (2, 313.6–314.2) อ.ท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี ศาสตราจารย์ วรควาวิสันต์
23 ธันวาคม 2537; KUMF 6538 (1, 363.8) เชื้อนครินทร์ ศาสตราจารย์ วรควาวิสันต์ 2536

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 6539 (1 ตัวอย่าง, 227.2 mm SL) เชื้อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ทศพล
กระจำจคารา กันยายน 2536

ตัวอย่างที่รวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำสาละวิน KUMF 6526 (2 ตัวอย่าง, 415.6–515.8 mm SL) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาสกร
แสนจันแดง 31 มีนาคม 2541

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 6528 (1 ตัวอย่าง, 524.3 mm SL) ตลาดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ภาสกร
แสนจันแดง 5 มกราคม 2542

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 6529 (15 ตัวอย่าง, 56.2–75.6 mm SL) ตลาดจตุจักร (รับมาจาก จ.ยโสธร)

ภาสกร แสนจันแดง 11 กรกฎาคม 2541; KUMF 6530 (3, 182.8–256.9) เชื้อนสิรินธร

จ.อุบลราชธานี ภาสกร แสนจันแดง 11 ธันวาคม 2540; KUMF 6531 (1, 250.2) อ.พิบูลมังสาหาร

จ.อุบลราชธานี ภาสกร แสนจันแดง 12 ตุลาคม 2540; KUMF 6532 (5, 229.2–334.2) ตลาด

นครพนม จ.นครพนม ภาสกร แสนจันแดง 8 พฤศจิกายน 2541; KUMF 6533 (3, 170.2–220.8)

อ.ปากคาด จ.อุบลราชธานี ภาสกร แสนจันแดง 18 ตุลาคม 2540; KUMF 6534 (2, 373.8–480.9)

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ภาสกร แสนจันแดง 26 ตุลาคม 2541

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 6535 (8 ตัวอย่าง, 173.3–203.8 mm SL) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ภาสกร
แสนจันแดง 16 มีนาคม 2541; KUMF 6536 (1, 180.8) ตลาดกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ภาสกร

แสนจันแดง 5 ธันวาคม 2540; KUMF 6538 (1, 363.8) เชื้อนครินทร์ ศาสตราจารย์ วรควาวิสันต์
พ.ศ. 2536

Hemibagrus nemurus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1839)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 158 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 70.8–237.4 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 0964 (2 ตัวอย่าง, 165.4–173.4 mm SL) แม่น้ำกก จ.เชียงราย H.M. Smith
2 มีนาคม 2467

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 6549 (19 ตัวอย่าง, 131.6–175.2 mm SL) ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด

จ. กาญจนบุรี ศาสตราจารย์ วรควาวิสันต์ 3 ธันวาคม 2534

ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 6540 (41 ตัวอย่าง, 87.2-245.0 mm SL) ตลาดปทุมธานี จ.ปทุมธานี ภาสกร แสนจันแดง 12 ตุลาคม 2541; KUMF 6541 (8, 139.8-210.1) ตลาดแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (ปลา รับมาจากคอยเต่า จ.เชียงใหม่) ภาสกร แสนจันแดง 31 มีนาคม 2541

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 6542 (3 ตัวอย่าง, 122.8-148.9 mm SL) ตลาดนครนายก จ.นครนายก ภาสกร แสนจันแดง 19 พฤศจิกายน 2540

ลุ่มน้ำแม่โจ้ KUMF 6543 (34 ตัวอย่าง, 155.1-199.9 mm SL) อ.โจ้เจียม จ.อุบลราชธานี ภาสกร แสนจันแดง 23 กรกฎาคม 2541; KUMF 6544 (53, 70.8-200.3) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาสกร แสนจันแดง 26 ตุลาคม 2541; KUMF 6545 (21, 88.8-193.3) อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ภาสกร แสนจันแดง 31 พฤษภาคม 2541; KUMF 6546 (2, 182.2-189.9) ตลาดอินโดจีน จ.นุกดาหาร ภาสกร แสนจันแดง 19 ตุลาคม 2540; KUMF 6547 (1, 237.4) ตลาดอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ภาสกร แสนจันแดง 19 ตุลาคม 2540; KUMF 6548 (5, 167.8-217.9) ตลาดสกลนคร จ.สกลนคร ภาสกร แสนจันแดง 28 พฤษภาคม 2541

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 6550 (4 ตัวอย่าง, 83.8-211.8 mm SL) ตลาดกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ภาสกร แสนจันแดง 5 ธันวาคม 2540; KUMF 6551 (3, 196.2-221.2) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ภาสกร แสนจันแดง 7 ธันวาคม 2540

Hemibagrus wycki (Bleeker, 1858)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 28 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 125.8-436.6 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 1009 (1 ตัวอย่าง, 125.8 mm SL) แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบ้านโพธิ์ H.M. Smith 26 พฤศจิกายน 2466; KUMF 1014 (1, 263.8) แม่น้ำเจ้าพระยา ลานเท H.M. Smith 11 ตุลาคม 2466; KUMF 1013 (1, 352.3) แม่น้ำ บ้านวังแพน เมษายน 2472; KUMF 6552 (1, 436.6) ตลาดอยุธยา จ.อยุธยา ศาสวัด วรรณวิสันต์ สิงหาคม 2537

ลุ่มน้ำแม่โจ้ KUMF 6554 (1 ตัวอย่าง, 352.8 mm SL) ตลาดหนองคาย จ.หนองคาย T.R. Robert 19 ตุลาคม 2511; NIFI 2562 (1, 159.9) ตลาดหนองคาย จ.หนองคาย ขวลิขิต วิทยานนท์ 2530

ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 6553 (2 ตัวอย่าง, 416.8-418.8 mm SL) ตลาดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ภาสกร แสนจันแดง 5 มกราคม 2542

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 6555 (17 ตัวอย่าง, 132.8-409.8 mm SL) อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ภาสกร แสงจันทร์แดง 19 ตุลาคม 40, 24 ตุลาคม และ 23 พฤศจิกายน 2541; KUMF 6556 (1, 267.8) ตลาดอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ภาสกร แสงจันทร์แดง 19 ตุลาคม 2540; KUMF 6557 (1, 295.8) ตลาดนครพนม จ.นครพนม ภาสกร แสงจันทร์แดง 8 พฤศจิกายน 2541

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 6558 (1 ตัวอย่าง, 261.1 mm SL) ตลาดกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ภาสกร แสงจันทร์แดง 15 ธันวาคม 2540

Hemibagrus mekongensis n.sp.

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 57 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 138.4-280.2 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำแม่โขง NIFI UNCAT. (2 ตัวอย่าง, 176.1-256.8 mm SL) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ขวลิขิต วิทยานนท์ 7-8 เมษายน 2533

ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้จากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 6559 (1 ตัวอย่าง, 280.2 mm SL) ตลาดอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ภาสกร แสงจันทร์แดง 19 ตุลาคม 2540; KUMF 6560 (54, 138.4-261.2) อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ภาสกร แสงจันทร์แดง 23 - 25 ตุลาคม 2541

Hemibagrus elegans n.sp.

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 13 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 106.3-239.4 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำตะนาวศรี NIFI 2583 (12 ตัวอย่าง, 106.3-239.4 mm SL) แม่น้ำตะนาวศรี ติดกับเขต จ.ราชบุรี ขวลิขิต วิทยานนท์ และ กิตติพงษ์ จารุชานินทร์ 20-21 ธันวาคม 2536; NIFI 2597 (1, 153.2) แม่น้ำตะนาวศรี ติดกับเขต จ.ราชบุรี ขวลิขิต วิทยานนท์ และ กิตติพงษ์ จารุชานินทร์ 20-21 ธันวาคม 2536

***Leiocassis micropogon* (Bleeker, 1858)**

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 3 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 58.1-122.2 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำภาคใต้ NIFI UNCAT. (3 ตัวอย่าง, 58.1-122.2 mm SL) ต้นน้ำสายบุรี จ.นราธิวาส ขวลิขิต
วิทยานนท์ มีนาคม 2541

***Leiocassis poecilopterus* (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1839)**

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 10 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 24.6-45.9 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำภาคใต้ KUMF 6561 (6 ตัวอย่าง, 33.9-45.9 mm SL) พรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส ประจิตร
วงศ์รัตน์ 29 พฤษภาคม 2531; NIFI 2702 (3, 24.6-30.5) คลองโต๊ะแดง จ.นราธิวาส ขวลิขิต
วิทยานนท์ 6-8 กุมภาพันธ์ 2537

ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำภาคใต้ KUMF 6562 (1 ตัวอย่าง, 45.8 mm SL) พรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส กิตติพงษ์
จารุธานินทร์ 5 มีนาคม 2541

***Leiocassis siamensis* (Regan, 1913)**

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 73 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 44.8-138.2 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 0930 (2 ตัวอย่าง, 107.2-130.3 mm SL) ตลาดปากน้ำโพธิ์ H.M. Smith
20 พฤศจิกายน 2466; KUMF 2732 (1, 77.2) จ.สุโขทัย สมบูรณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2517; KUMF 6564
(5, 63.4-91.2) อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 27 มิถุนายน 2541

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 0937 (2 ตัวอย่าง, 86.8-107.6 mm SL) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา H.M. Smith
19 พฤศจิกายน 2468

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 6568 (1 ตัวอย่าง, 80.3 mm SL) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาฤๅณ
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี สืบสิน สนธิรัตน์ 1 พฤษภาคม 2540; NIFI 00470 (6, 53.8-96.8) น้ำตก
กระทิง จ.จันทบุรี จรัสธาดา กรรณสูต 16 มกราคม 2514

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 0939 (1 ตัวอย่าง, 96.3 mm SL) แม่กลอง จ.ราชบุรี H.M. Smith 9 มิถุนายน
2470; KUMF 2478 (1, 79.4) จ.กาญจนบุรี ธงชัย 19 มกราคม 2517; KUMF 6569 (1, 70.8) เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สืบสิน สนธิรัตน์ 22 กุมภาพันธ์ 2541; NIFI 00467 (1, 138.2) เชื้อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี จรัลธาดา กรรณสูต 5 พฤษภาคม 2521

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 0943 (1 ตัวอย่าง, 101.9 mm SL) คลองสก บ้านสก อ.พนม แม่น้ำตาปัดตอนบน R. Havmollerli ตุลาคม-ธันวาคม 2472; NIFI 02159 (3, 58.3-101.2) เชื้อนเขียวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี รังสันต์ ไชยบุญทัน 26 สิงหาคม 2530; KUMF 00473 (2, 68.2-96.3) แม่น้ำหลังสวน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร จรัลธาดา กรรณสูต กันยายน 2521; KUMF 00471 (3, 93.2-102.8) แม่น้ำปัดตานี อ.บันนังสตา จ.ยะลา จรัลธาดา กรรณสูต 14-24 มีนาคม 2519

ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 6563 (4 ตัวอย่าง, 81.4-103.1 mm SL) ตลาดปทุมธานี จ.ปทุมธานี ภาสกร แสงจันแดง 10 ตุลาคม 2540; KUMF 6564 (5, 63.4-91.2) อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 27 มิถุนายน 2541

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 6565 (7 ตัวอย่าง, 44.8-67.2 mm SL) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี กิตติพงษ์ จารุธานินทร์ 20 มกราคม 2541

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 6566 (12 ตัวอย่าง, 87.2-122.8 mm SL) อ.ไชยบุรี จ.นครพนม ภาสกร แสงจันแดง 30 พฤษภาคม 2541; KUMF 6567 (9, 72.3-107.3) บ้านอ้วน อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ภาสกร แสงจันแดง 30 พฤษภาคม 2541

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 6570 (6 ตัวอย่าง, 87.2-114.1 mm SL) ตลาดยะลา จ.ยะลา ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 19 กุมภาพันธ์ 2541

Leiocassis stenomus (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1839)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 48 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 28.3-78.8 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก NIFI 00496 (2, 65.8-66.3) น้ำตกกระทิง จ.จันทบุรี จรัลธาดา กรรณสูต 16 มกราคม 2541; NIFI 00466 (6, 54.9-75.3) น้ำตกกระทิง จ.จันทบุรี ปรีชา เขียวเจริญ 4 มิถุนายน 2509

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ NIFI 01915 (2 ตัวอย่าง, 53.3-69.2 mm SL) คลองสก จ.สุราษฎร์ธานี M. Kottelat และ T.R. Roberts 5 เมษายน 2528; NIFI 3060 (9, 55.2-78.3) แม่น้ำปัดตานี เขษรพงศ์ พ.ศ. 2540; NIFI 00463 (3, 51.8-63.2) แม่น้ำปัดตานี อ.บันนังสตา จ.ยะลา จรัลธาดา กรรณสูต 14-24 มีนาคม 2519; NIFI 2979 (6, 57.8-78.8) ภาคใต้ สมเกียรติ 2539; NIFI UNCAT. (6, 57.3-74.8) เชื้อนเขียวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี จรัลธาดา กรรณสูต 20 เมษายน 2526; NIFI UNCAT. (3, 28.3-52.8) บริเวณ

เหนือเขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี ทรงพรรณ ลำเลียง 16-17 เมษายน 2529; NIFI UNCAT. (10, 44.5-72.8) ภาควิชา สมเกียรติ 15 กุมภาพันธ์ 2539

ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 6571 (1 ตัวอย่าง, 60.3 mm SL) จ.จันทบุรี กิตติพงษ์ จารุณนรินทร์ 19 มกราคม 2542

Mystus atrifasciatus Fowler, 1937

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 47 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 55.3-127.4 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 0933 (1 ตัวอย่าง, 127.4 mm SL) ปากน้ำโพธิ์ แม่น้ำเจ้าพระยา H.M. Smith 18 พฤศจิกายน 2466

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 2716 (1 ตัวอย่าง, 89.2 mm SL) จ.นครพนม วราวัตรและคณะ 16 ธันวาคม 2516; NIFI 02085 (2, 55.3-73.4) ลำโดมใหญ่ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี รังสรรค์ ไชบุญญทัน 13 มกราคม 2530

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 0992 (1 ตัวอย่าง, 114.2 mm SL) คลองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี H.M. Smith 9 ตุลาคม 2473

ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 6576 (42 ตัวอย่าง, 76.8-108.2 mm SL) ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ภาสกร แสนจินแดง 30 พฤษภาคม 2541

Mystus bocourti (Bleeker, 1864)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 50 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 83.8-212.3 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 0923 (1 ตัวอย่าง, 149.6 mm SL) ปากน้ำโพธิ์ H.M. Smith 6 มิถุนายน 2468; KUMF 0921 (2, 121.2-143.4) แม่น้ำป่าสัก H.M. Smith 20 สิงหาคม 2466

ลุ่มน้ำแม่โขง NIFI 02026 (2 ตัวอย่าง, 184.9-212.3 mm SL) บ้านโนนกาดำ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ทรงพรรณ ลำเลียง 13 กุมภาพันธ์ 2528

ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 6577 (8 ตัวอย่าง, 138.6-185.2 mm SL) ตลาดหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ภาสกร แสนจินแดง 9 ตุลาคม 2540

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 6578 (4 ตัวอย่าง, 83.8-110.8 mm SL) ตลาดนครนายก ภาสกร แสงจันทร์แดง 9 พฤศจิกายน 2540

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 6579 (30 ตัวอย่าง, 91.1-155.5 mm SL) บ้านอ้วน ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ภาสกร แสงจันทร์แดง 30 พฤษภาคม 2541; KUMF 6580 (3, 142.3-163.8) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ภาสกร แสงจันทร์แดง 30 พฤษภาคม 2541

***Mystus cavasius* (Hamilton, 1822)**

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 7 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 76.6-203.9 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำสาละวิน NIFI 2938 (4 ตัวอย่าง, 76.6-96.7 mm SL) สาละวิน ขวาลิต วิทยานนท์ 3-6 ธันวาคม 2537; KUMF 2558 (1, 184.2) แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สมโภชน์ อัคระทวีวัฒน์ 21 มีนาคม 2524; KUMF 6582 (1, 133.4) แม่น้ำเมข จ.ตาก กิตติพงษ์ จารุธานินทร์ มกราคม 2532

ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำสาละวิน KUMF 6581 (1 ตัวอย่าง, 203.9 mm SL) ตลาดแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาสกร แสงจันทร์แดง 30 มีนาคม 2541

***Mystus gulio* (Hamilton, 1822)**

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 62 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 63.2-120.4 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 0956 (1 ตัวอย่าง, 98.2 mm SL) บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา H.M. Smith 21 ธันวาคม 2466; KUMF 0951 (1, 104.8) คลองสำโรง H.M. Smith 12 กุมภาพันธ์ 2467; KUMF 0950 (1, 88.3) บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา H.M. Smith 8 พฤศจิกายน 2466

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 0952 (3 ตัวอย่าง, 98.3-99.2 mm SL) บริเวณชายฝั่ง จ.สมุทรสงคราม P. Prayceran 4 มิถุนายน 2479

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 0955 (1 ตัวอย่าง, 102.3 mm SL) ปากพูน จ.นครศรีธรรมราช H.M. Smith 20 ตุลาคม 2466

ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 6583 (16 ตัวอย่าง, 73.1-116.8 mm SL) ตลาดหน้าศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด จ.ปัตตานี ภาสกร แสงจันทร์แดง 23 ธันวาคม 2540; KUMF 6584 (6, 82.6-120.4) อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ภาสกร แสงจันทร์แดง 27 ธันวาคม 2540

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 6586 (17 ตัวอย่าง, 63.2-90.6 mm SL) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
สมหมาย เจนกิจการ 24 มกราคม 2542

ลุ่มน้ำตะนาวศรี KUMF 6585 (16 ตัวอย่าง, 66.8-89.8 mm SL) แม่น้ำกระบือ อ.กระบือ จ.ระนอง
ภาสกร แสนจันแดง 6 มกราคม 2541

Mystus micracanthus (Bleeker, 1846)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 44 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 49.8-171.8 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 6587 (2 ตัวอย่าง, 109.1-111.2 mm SL) อ.ท่าตะเกียบ จ.
ฉะเชิงเทรา สืบสิน สนธิรัตน์ เมษายน 2540; KUMF 6588 (3, 49.9-81.3) เขาตอยดาว อ.มะขาม จ.
จันทบุรี สืบสิน สนธิรัตน์ 7 พฤษภาคม 2541

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 0951 (1 ตัวอย่าง, 97.1 mm SL) จ.นครศรีธรรมราช H.M. Smith
14 กรกฎาคม 2471; KUMF 6589 (29, 80.2-111.4) พรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส ประจิตร วงศ์รัตน์
พฤษภาคม 2531

ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 6590 (9 ตัวอย่าง, 91.8-17.8 mm SL) ตลาดสุโขทัย อ.สุโขทัย
จ.นราธิวาส ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 12 กุมภาพันธ์ 2540

Mystus multiradiatus Roberts, 1992

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 60 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 61.2-175.3 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 0993 (1 ตัวอย่าง, 127.4 mm SL) ปากน้ำโพธิ์ แม่น้ำเจ้าพระยา H.M. Smith
18 พฤศจิกายน 2466; NIF 3043 (1, 169.8) อ.บางไทร จ.อยุธยา ชวลิต วิทยานนท์, date unknown

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 6598 (9 ตัวอย่าง, 70.8-114.3 mm SL) ตลาดราชบุรี ชัยวุฒิ กรุดพันธ์
สิงหาคม 2536

ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 6591 (1 ตัวอย่าง, 109.9 mm SL) ตลาดหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
ภาสกร แสนจันแดง 4 พฤศจิกายน 2540; KUMF 6592 (3, 82.3-109.3) ตลาดนนทบุรี จ.นนทบุรี
ภาสกร แสนจันแดง 6 ตุลาคม 2540; KUMF 6593 (1, 84.2) คลองบางยี่หน จ.สุพรรณบุรี ภิภา

ลิเจริญ มกราคม 2541 ; KUMF 6594 (1, 175.3) ตลาดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ชัยวุฒิ กรุดพันธ์
พ.ศ. 2540; KUMF 6595 (19, 90.2-123.3) ตลาดสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ภาสกร แสนจันแดง
24 พฤศจิกายน 2541; KUMF 6596 (11, 103.4-125.8) ตลาดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ชัยวุฒิ
กรุดพันธ์ 13 มกราคม 2540
ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 6597 (4 ตัวอย่าง, 77.8-91.3 mm SL) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
กิตติพงษ์ จารุณานินทร์ 20 มกราคม 2542
ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 6598 (9 ตัวอย่าง, 70.8-114.3 mm SL) ตลาดราชบุรี ชัยวุฒิ กรุดพันธ์
สิงหาคม 2536

Mystus mysticetus Roberts, 1992

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 75 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 60.8-182.3 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 1000 (2 ตัวอย่าง, 71.8-83.9 mm SL) แม่น้ำสุพรรณบุรี โชติ สุวดี
19 กันยายน. 2477; KUMF 0997 (2, 73.2-76.1) ปากน้ำโพธิ์ แม่น้ำเจ้าพระยา H.M. Smith
24 พฤศจิกายน 2466; KUMF 0998 (2, 80.3-93.2) บ้านโพธิ์ แม่น้ำเจ้าพระยา H.M. Smith
8 ธันวาคม 2466;

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 2716 (1 ตัวอย่าง, 84.9 mm SL) จ.นครพนม วราวุธและคณะ 29 ธันวาคม
2516

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 0999 (1 ตัวอย่าง, 87.8 mm SL) คลองบางปลาสร้อย จ.ราชบุรี โชติ สุวดี
8 ธันวาคม 2475

ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 6599 (17 ตัวอย่าง, 60.8-118.3 mm SL) ตลาดสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ภาสกร
แสนจันแดง 24 พฤศจิกายน 2541; KUMF 6600 (1, 182.3) ตลาดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ชัยวุฒิ
กรุดพันธ์ 2540

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 6601 (3 ตัวอย่าง, 70.8-89.2 mm SL) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
กิตติพงษ์ จารุณานินทร์ 20 มกราคม 2541

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 6602 (31 ตัวอย่าง, 83.2-109.8 mm SL) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาสกร
แสนจันแดง 17, 30 พฤษภาคม 2539; KUMF 6603 (15, 99.6-139.9) ตลาดสกกลนคร จ.สกกลนคร
ภาสกร แสนจันแดง 28 พฤษภาคม 2541

Mystus rhegma Fowler, 1935

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 9 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 61.2-107.2 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 6604 (7 ตัวอย่าง, 61.2-85.1 mm SL) แม่น้ำเจ้าพระยา จ.อุทัยธานี ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3 กันยายน 2536; KUMF 6605 (1, 78.3) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ประจิตร วงศ์รัตน์ 2539

ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 6606 (1 ตัวอย่าง, 107.2 mm SL) อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ภาณุพันธ์ พันธุ์นิตย์ 28 ธันวาคม 2541

Mystus singaringan (Bleeker, 1846)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 116 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 56.8-209.4 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 2686 (1 ตัวอย่าง, 149.2 mm SL) คอยเต่า ธงชัย จ.ตาก 5 กุมภาพันธ์ 2517; KUMF 0979 (1, 107.3) อ.บางไทร จ.อยุธยา H.M. Smith 17 พฤศจิกายน 2466; KUMF 0989 (1, 139.9) แม่น้ำลพบุรี H.M. Smith 22 ตุลาคม 2469; KUMF 0981 (1, 91.2) แม่น้ำเจ้าพระยา H.M. Smith 17 พฤศจิกายน 2466; KUMF 2608 (1, 124.9) จ.อยุธยา พรชัยและคณะ 25 มกราคม 2517

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก NIFI 0985 (1 ตัวอย่าง, 90.1 mm SL) คลองบางขนาก จ.ฉะเชิงเทรา H.M. Smith, date unknown

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 0988 (1 ตัวอย่าง, 111.6 mm SL) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี H.M. Smith 16 ธันวาคม 2468; KUMF 0983 (1, 93.2) คลองบางปลาสร้อย จ.ราชบุรี H.M. Smith ธันวาคม 2466; NIFI 2415 (2, 95.3-105.2) แม่น้ำแม่กลอง T.R. Roberts, date unknown

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 0975 (1 ตัวอย่าง, 111.2 mm SL) แม่น้ำตาปี บ้านคอน H.M. Smith 30 กันยายน 2466; KUMF 0977 (1, 96.2) แม่น้ำปัตตานี จ.ปัตตานี H.M. Smith 15 ตุลาคม 2466; KUMF 0990 (1, 138.9) จ.นครศรีธรรมราช H.M. Smith 4 กรกฎาคม 2471; NIFI UNCAT. (2, 76.3-98.2) แม่น้ำตาปี โกสัพพะแสง L. Sonkphan, M. Kottelate and T.R. Roberts 3 เมษายน 2528

ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 6607 (10 ตัวอย่าง, 111.2-160.2 mm SL) ตลาดหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ภาสกร แสงจันทร์แดง 9 ตุลาคม 2540 KUMF 6572 (2, 84.2-106.8) จ.เพชรบูรณ์ ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 27 มิถุนายน 2541; KUMF 6573 (20, 86.2-122.4) ตลาดสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ภาสกร

แสนจันแดง 24 พฤศจิกายน 2541

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 6608 (3 ตัวอย่าง, 76.9-81.3 mm SL) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

กิตติพงษ์ จารุธานินทร์ 20 มกราคม 2542; KUMF 6574 (14, 58.2-79.2) ตลาดปราจีนบุรี

จ.ปราจีนบุรี ภาสกร แสนจันแดง 22 พฤศจิกายน 2540; KUMF 6575 (20, 68.8-134.9)

ตลาดนครนายก จ.นครนายก ภาสกร แสนจันแดง 19 พฤศจิกายน 2540

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 6609 (11 ตัวอย่าง, 56.8-126.3 mm SL) อ.โพธิ์พิสัย จ.หนองคาย ภาสกร

แสนจันแดง 18 ตุลาคม 2540; KUMF 6610 (1, 90.4) อ.ปากคาด จ.หนองคาย ภาสกร แสนจันแดง

18 ตุลาคม 2540; KUMF 6611 (1, 104.2) อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ภาสกร แสนจันแดง

20 ตุลาคม 2540; KUMF 6612 (2, 115.3-127.8) อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ภาสกร แสนจันแดง

19 ตุลาคม 2540

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 6613 (8 ตัวอย่าง, 129.2-209.4 mm SL) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ภาสกร

แสนจันแดง 7 ธันวาคม 2540

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 6614 (8 ตัวอย่าง, 95.4-122.3 mm SL) ตลาดปาลัส อ.มายอ จ.ปัตตานี

ภาสกร แสนจันแดง 24 ตุลาคม 2540; KUMF 6615 (1, 132.9) อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ภาสกร

แสนจันแดง 16 กุมภาพันธ์ 2540

Mystus wolffi (Bleeker, 1851)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 68 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 95.4-158.8 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 1005 (1 ตัวอย่าง, 107.9 mm SL) ลานเท แม่น้ำเจ้าพระยา H.M. Smith

7 ธันวาคม 2466; KUMF 1007 (1, 122.2) แม่น้ำเจ้าพระยา อ.บางไทร จ.อยุธยา H.M. Smith

6 กุมภาพันธ์ 2470; KUMF 1001 (1, 106.1) แม่น้ำเจ้าพระยา อ.ปากเกร็ด H.M. Smith 29 มิถุนายน

2466

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 1003 (1 ตัวอย่าง, 158.8 mm SL) ตลาดปัตตานี จ.ปัตตานี H.M. Smith

14 ตุลาคม 2466; KUMF 1006 (1, 140.2) แม่น้ำตาปี บ้านคอน H.M. Smith 4 มกราคม 2470

ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 6616 (15 ตัวอย่าง, 97.2-119.2 mm SL) อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ภาสกร

แสนจันแดง 25 ธันวาคม 2540; KUMF 6617 (7, 95.4-112.2) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ชัยวุฒิ

กรุดพันธ์ 20 กันยายน 2540; KUMF 6618 (22, 97.6-133.1) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาสกร

แสนจันแดง 30 มิถุนายน 2541; KUMF 6619 (7, 115.8-152.4) ตลาดนราทัศน์ จ.นราธิวาส ภาสกร
แสนจันแดง 7 กรกฎาคม 2541; KUMF 6620 (12, 113.4-126.1) ตลาดนราธิวาส จ.นราธิวาส
ภาสกร แสนจันแดง 14 กุมภาพันธ์ 2541

Rita sacerdotum Anderson, 1879

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 1 ตัวอย่าง ความยาวมาตรฐาน 670.5 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำสาละวิน NIFI UNCAT. (1 ตัวอย่าง: 670.5 mm SL) อ.แม่สอด จ.ตาก Kubota 15 กรกฎาคม
2543

Sperata acicularis Ferralis and Runge, 1999

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 15 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 103.5-570.4 mm SL

ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ลุ่มน้ำสาละวิน NIFI 01135 (2 ตัวอย่าง, 181.3-190.2 mm SL) น้ำขม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
สมโภชน์ อัคระทวีวัฒน์ 21 มีนาคม 2524

ลุ่มน้ำตะนาวศรี NIFI 2560 (3 ตัวอย่าง, 103.5-260.2 mm SL) แม่น้ำตะนาวศรี บริเวณชายแดน พม่า
ตรงข้ามกับ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ชวลิต วิทยานนท์ และ กิตติพงษ์ จารุธานินทร์ 12 พฤษภาคม 2537

ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากลุ่มน้ำต่างๆ

ลุ่มน้ำสาละวิน KUMF 6621 (10 ตัวอย่าง, 225.9-570.4 mm SL) ตลาดแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ภาสกร แสนจันแดง 30 มี.ค 2541

ตัวอย่างปลากดปลาแขยงวงศ์ Bagridae ที่ใช้ศึกษาทั้งหมดจำนวน 1,203 ตัว ช่วงความ
ยาวมาตรฐาน 28.3-670.5 mm SL จำนวน 7 สกุล ได้แก่สกุล *Bagrichthys* (2 ชนิด), *Batasio* (1
ชนิด), *Hemibagrus* (6 ชนิด), *Leiocassis* (4 ชนิด), *Mystus* (10 ชนิด), *Rita* (1 ชนิด) และ *Sperata* (1
ชนิด) รวม 25 ชนิด

การจัดแบ่งลุ่มน้ำของไทย

ชวลิต และคณะ (2540) ได้แบ่งลุ่มน้ำต่าง ๆ ของไทยตามลักษณะของสัตวภูมิศาสตร์ โดยอ้างอิงการแบ่งเขตตาม Kottelat (1984) ได้ 6 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่โขง ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำสาละวิน ลุ่มน้ำภาคใต้ และ ลุ่มน้ำภาคตะวันออก ในการศึกษาครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนการแบ่งลุ่มน้ำต่างออกไปจาก Kottelat (1984) บางส่วนคือ ลุ่มน้ำแม่กลองได้รวมแม่น้ำเพชรบุรีเข้าไว้ด้วย และจากหลักฐานข้อมูลชนิดพรรณปลาที่เก็บได้จากแหล่งน้ำต่างๆ รวมทั้งตัวอย่างปลาที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ พบว่าแหล่งน้ำจืดที่อยู่ในแนวชายฝั่งอันดามันจากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา รวมถึงภูเก็ต มีชนิดของปลาน้ำจืดที่แตกต่างจากลุ่มน้ำภาคใต้แต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรณปลาในลุ่มน้ำตะนาวศรีซึ่งอยู่บริเวณตอนใต้ของพม่า จึงได้จัดแบ่งลุ่มน้ำตะนาวศรีออกเป็นลุ่มน้ำหลักอีกลุ่มน้ำหนึ่ง ในส่วนของแม่น้ำบางปะกงจากเดิมจัดให้อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาควรเปลี่ยนให้อยู่ร่วมกับลุ่มน้ำทางภาคตะวันออกเพราะว่าชนิดปลาน้ำจืดมีความสัมพันธ์กับแม่น้ำต่างๆ ทางภาคตะวันออกมากกว่าชนิดปลาในแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงแม้ว่าบริเวณตอนล่างของแม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีชนิดปลาที่คล้ายกันก็ตาม แต่อาจมีสาเหตุมาจากการขุดคลองเชื่อมต่อระหว่างสองแม่น้ำนี้เพื่อใช้ในการชลประทาน และคมนาคม

จากข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปการจัดแบ่งลุ่มน้ำของไทยในการศึกษานี้ออกเป็น 7 ลุ่มน้ำ (ภาพที่ 2) คือ

- 1.ลุ่มน้ำสาละวิน (SW)
- 2.ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (CP)
- 3.ลุ่มน้ำภาคตะวันออก (Se)
- 4.ลุ่มน้ำแม่โขง (MK)
- 5.ลุ่มน้ำแม่กลอง (Mkl)
- 6.ลุ่มน้ำตะนาวศรี (Tn)
- 7.ลุ่มน้ำภาคใต้ (Ma)

1. ลุ่มน้ำสาละวิน (SW)

แม่น้ำสาละวินมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัยในบริเวณทิเบตและผ่านประเทศไทยตั้งแต่เขตของ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ถึง อ.สบเมย จ.ตาก ความยาวช่วงที่ไหลผ่านประเทศไทยประมาณ 120 กิโลเมตร แม่น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำสาละวิน ได้แก่ น้ำแม่ปายและน้ำแม่ขวมในเขต จ.แม่ฮ่องสอน แม่น้ำเมยในเขต จ.ตาก ห้วยแม่กะสะและแม่น้ำสุริยะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

2. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (CP)

ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีระบบแม่น้ำที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือและพื้นที่ทั้งหมดของภาคกลาง มีต้นกำเนิดจากทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาผีปันน้ำ แม่น้ำที่สำคัญของภาคเหนือได้แก่แม่น้ำปิง วัง ยม และน่าน แม่น้ำวังไหลมาบรรจบกับแม่น้ำปิงที่ อ.บ้านตาก จ.ตาก รวมเรียกแม่น้ำปิง แม่น้ำยมไหลมาบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ รวมเรียกแม่น้ำน่าน ทั้งแม่น้ำปิงและน่านไหลมาบรรจบกันที่ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กลายเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลมาบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาได้แก่ แม่น้ำสะแกกรังไหลมาบรรจบที่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี แม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบที่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา แม่น้ำที่แยกออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้แก่ แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มต้นที่ ต.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ไหลผ่านจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ ไหลลงอ่าวไทยที่ จ.สมุทรปราการ รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 380 กิโลเมตร

3. ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก (Se)

แม่น้ำบางปะกงเป็นแม่น้ำสายเดียวกับแม่น้ำปราจีนบุรี แต่เรียกแยกเป็นสองตอนตอนที่ไหลอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีเรียกว่า แม่น้ำปราจีนบุรี แต่เมื่อไหลเข้าเขตจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วเรียก แม่น้ำบางปะกง ต้นน้ำเกิดจากแม่น้ำสองสายคือ แม่น้ำหनुมานและแม่น้ำพระปรัง แม่น้ำบางปะกงไหลลงทะเลอ่าวไทยระหว่าง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.เมือง จ.ชลบุรี รวมความยาวทั้งสิ้น 230 กิโลเมตร

นอกจากแม่น้ำบางปะกงแล้วระบบแม่น้ำในเขตนี้จะเป็นแม่น้ำสายสั้นๆ ได้แก่ แม่น้ำระยอง แม่น้ำประแส แม่น้ำพังราด แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำเวฬุ และแม่น้ำเมืองตราด โดยมีต้นน้ำส่วนใหญ่เกิดจากทิวเขาจันทบุรี และบางส่วนของทิวเขาบรรทัด

4.ลุ่มน้ำแม่โจง (MK)

แม่น้ำโจงมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนจีน - ธิเบต ไหลผ่านตอนบนของประเทศไทยผ่านเขตของจังหวัดเชียงราย โดยมีแม่น้ำที่ไหลลงได้แก่ น้ำรวก น้ำแม่สาย น้ำแม่กก และน้ำแม่อิง ไหลผ่านชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีแม่น้ำสาขาสายสำคัญได้แก่ แม่น้ำเหือง แม่น้ำเลย ห้วยน้ำสวย ห้วยหลวง แม่น้ำสงคราม แม่น้ำมูล และแม่น้ำชี นอกจากนี้ลำธารของทิวเขาสอยดาวฝั่งตะวันออกของจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีระบบแม่น้ำต่อเนื่องกับด้านของทะเลสาบเขมรก็จัดอยู่ในระบบแม่น้ำโจงเช่นกัน

5.ลุ่มน้ำแม่กลอง (Mkl)

แม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำเพชรบุรีมีต้นน้ำเกิดมาจากเทือกเขาตะนาวศรี แม่น้ำแม่กลอง เกิดจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่บรรจบกันที่ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ไหลผ่านเข้าเขต จ.ราชบุรี จนไปออกทะเลที่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ส่วนแม่น้ำเพชรบุรี มีต้นน้ำอยู่ในเขต ต.สองพี่น้อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ไหลผ่าน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ก่อนออกสู่อ่าวไทยที่ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี นอกจากนี้ระบบแม่น้ำของลุ่มน้ำแม่กลองยังได้รวมถึงแม่น้ำสายอื่นๆ ที่อยู่เหนือเขตจังหวัดชุมพรด้วย

6.ลุ่มน้ำตะนาวศรี (Tn)

ต้นน้ำอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งแบ่งพรมแดนทางทิศตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร นอกจากนี้ยังรวมถึงแม่น้ำและลำคลองทางทิศตะวันตกของเทือกเขาตะนาวศรีในเขตประเทศไทย ได้แก่ แม่น้ำกระบุรี บริเวณต้นแม่น้ำชุมพร รวมทั้งลำคลองต่างๆ ในเขตจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต เนื่องจากการเก็บตัวอย่างพบว่ามีพรรณปลาคล้ายคลึงกับพรรณปลาในลุ่มน้ำตะนาวศรีในพม่าและลุ่มน้ำสาละวิน

7.ลุ่มน้ำทางภาคใต้ (Ma)

ลุ่มน้ำนี้เริ่มตั้งแต่คอคอดกระจังหวัดระนองลงมาถึงคาบสมุทรมลายู มีแม่น้ำที่สำคัญหลายสายได้แก่ แม่น้ำชุมพร คลองชุมพร คลองหลังสวน แม่น้ำกระบือ แม่น้ำตาปี แม่น้ำตรัง แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี คลองอุตะเกา และแม่น้ำโกลก แม่น้ำในภาคใต้ส่วนมากเป็นแม่น้ำสายสั้นๆ และได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ำทะเลยกเว้นแม่น้ำตาปีที่มีระบบของแม่น้ำค่อนข้างยาวและมีต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาหลายแห่งใน จ.สุราษฎร์ธานี ระนองและพังงา แม่น้ำตาปีมีแกวที่สำคัญไหลมาบรรจบคือ แม่น้ำคีรีรัฐ (หรือแม่น้ำพุมดวง)

วิธีการศึกษา

1. การศึกษาในภาคสนาม

1.1 การออกเก็บตัวอย่าง ทำการเก็บตัวอย่างปลาคลแคยงวงศ์ Bagridae จาก 7 ลุ่มน้ำทั่วประเทศไทย โดยรวบรวมตัวอย่างปลาจากตลาด และจ้างชาวประมงท้องถิ่นเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาด้วยเครื่องมือประมงชนิดต่างๆ จำนวนครั้งในการออกเก็บตัวอย่างปลาแต่ละลุ่มน้ำ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 จำนวนครั้งการเก็บตัวอย่างจาก 7 ลุ่มน้ำของไทยในช่วงปี 2540-2541

ลุ่มน้ำ	จำนวนครั้งที่เก็บ		
	พ.ศ. 2540	พ.ศ.2541	จำนวนครั้งที่เก็บตัวอย่างทั้งหมด
เจ้าพระยา	2	2	4
แม่กลอง	1	1	2
ภาคตะวันออก	2	1	3
ภาคใต้	1	1	2
แม่โขง	2	3	5
สาละวิน	-	1	1
ตะนาวศรี	1	-	1
รวม	9	9	18

1.2 การจดบันทึกข้อมูล ทำการจดบันทึก วัน เวลา สถานที่ ในการเก็บตัวอย่าง รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น ลักษณะสีสันของปลา แหล่งที่อยู่อาศัย และเครื่องมือประมงที่ใช้จับ เป็นต้น

1.3 การเก็บรักษาตัวอย่าง เก็บรักษาตัวอย่างปลาในน้ำยาฟอร์มาลินที่มีความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ คณาไปศึกษาในห้องปฏิบัติการ

2. การศึกษาในห้องปฏิบัติการ

2.1 การศึกษาลักษณะ โครงสร้างภายนอก

นำตัวอย่างปลาที่เก็บรักษาไว้มาทำการวิเคราะห์สกลและชนิดของปลาโดยใช้หนังสือของ Hamilton (1822), Fowler (1934b, 1935, 1937), Talwar และ Jhingran (1991), Smith (1945), Roberts (1989, 1992, 1994), Rainboth (1996) รวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นนำตัวอย่างปลาแต่ละชนิดมาทำการศึกษาลักษณะต่างๆ ที่นับวัดได้ (Meristic และ Morphometric characters) (ภาพที่ 3) พร้อมทั้งทำการจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้ลงในตารางบันทึกข้อมูล

ทำการวาดรูปปลาในวงศ์นี้ทุกชนิดที่ศึกษาพร้อมกับการเปรียบเทียบลักษณะรูปร่างภายนอกตามวิธีที่นำเสนอโดย Vidthayanon (1993)

2.2 การศึกษาทางกายวิภาค

นำปลาแต่ละสกลมาจำนวน 1 ชนิด ทำการดองใสเพื่อศึกษาโครงกระดูกและทำการศึกษาระบบอวัยวะภายในตามวิธีการของ Mo (1991) หลังจากนั้นพิจารณาลักษณะโครงสร้างภายในที่สามารถนำมาใช้ประกอบกับลักษณะโครงสร้างภายนอกในการจัดจำแนกกลุ่มของปลาในวงศ์ออกเป็นสกลต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เมื่อทราบถึงลักษณะโครงสร้างภายในของชนิดที่คัดเลือกมาแล้ว จากนั้นได้ทำการศึกษาลักษณะดังกล่าวกับปลาทุกชนิดในวงศ์ (ยกเว้นชนิดที่เป็นตัวอย่างหายาก ได้แก่ตัวอย่าง 3 ชนิด ที่เก็บรักษาไว้ในสถาบันพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง คือ *Hemibagrus elegans* n.sp., *Leiocassis micropogon* และ *Rita sacerdotum*) การเรียกชื่อขึ้นกระดูกใช้ตาม Mo (1991) (ภาพที่ 4, 5 และ 6)

2.3 การทำคู่มือวิเคราะห์สกุลและชนิด

นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างภายนอกและลักษณะทางกายวิภาค มาจัดทำเป็นคู่มือวิเคราะห์สกุลและชนิด พร้อมกับแสดงภาพประกอบ

2.4 การย่อนบรรยายลักษณะของปลาในวงศ์

ทำการย่อนบรรยายลักษณะของปลาในวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย โดยอาศัย ข้อมูลจากผลของการศึกษาลักษณะ โครงสร้างภายนอกและทางกายวิภาค

สถานที่และระยะเวลาทำการวิจัย

สถานที่ทำการวิจัย

- พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สถาบันพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง


ระยะเวลาทำการวิจัย

ในการเก็บตัวอย่างและทำการศึกษาร่วมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2540 ถึงเดือนพฤษภาคม 2542 รวมระยะเวลา 24 เดือน

คำอธิบายประกอบการวัดและนับลักษณะต่างๆ ในปลาเทศบาลแขวง (ภาพที่ 3)

1. ความยาวมาตรฐาน (Standard length = SL): วัดความยาวในแนวระนาบจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดปลายสุดของกระดูก hypural plate
2. ความยาวหัว (Head length = HL): วัดความยาวในแนวระนาบจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงขอบท้ายสุดของแผ่นกระดูกปิดเหงือก
3. ความยาวจะงอยปาก (Snout length): วัดความยาวในแนวระนาบจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงขอบด้านหน้าของตา
4. ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา (Eye-diameter length): วัดความยาวในแนวระนาบจากขอบด้านหน้าถึงขอบด้านหลังของตา
5. ความลึกของหัวบริเวณตา (Head depth at eye): วัดในแนวตั้งฉากจากส่วนบนสุดถึงส่วนล่างสุดของส่วนหัวโดยให้แนวที่วัดอยู่ในแนวเดียวกับบริเวณตาสองข้าง
6. ความกว้างของหัวบริเวณตา (Head width at eye): วัดความกว้างของหัวในแนวระนาบโดยให้แนวที่วัดอยู่ในแนวเดียวกับบริเวณตาสองข้าง
7. ระยะห่างระหว่างตา (Interorbital length): วัดในแนวระนาบ โดยวัดระยะห่างระหว่างขอบด้านในสุดของตาสองข้าง
8. ความกว้างฐานกระดูก Supraoccipital process (Supraoccipital-base width): วัดความกว้างในแนวระนาบของฐานกระดูก supraoccipital process
9. ความยาวกระดูก Supraoccipital process (Supraoccipital length): วัดความยาวในแนวระนาบจากฐานถึงปลายสุดของกระดูก supraoccipital process
10. ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก (Prepectoral-fin length): วัดความยาวในแนวระนาบจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก
11. ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบท้อง (Predorsal-fin length): วัดความยาวในแนวระนาบจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบท้อง
12. ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบท้อง (Prepelvic-fin length): วัดความยาวในแนวระนาบจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบท้อง
13. ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบก้น (Preadipose-fin length): วัดความยาวในแนวระนาบจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบก้น


14. ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงรูก้น (Prenus length): วัดความยาวในแนวระนาบจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงรูก้น
15. ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบกัน (Prenal-fin length): วัดความยาวในแนวระนาบจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบกัน
16. ความยาวก้านครีบแข็งของครีบอก (Pectoral-spine length): วัดความยาวจากโคนถึงปลายสุดของก้านครีบแข็งของครีบอก
17. ความยาวก้านครีบแข็งของครีบหลัง (Dorsal-spine length): วัดความยาวจากโคนถึงปลายสุดของก้านครีบแข็งของครีบหลัง
18. ความยาวฐานครีบหลัง (Dorsal fin-base length): วัดความยาวจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดของฐานครีบหลัง
19. ความยาวฐานครีบไขมัน (Adipose fin-base length): วัดความยาวจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดของฐานครีบไขมัน
20. ความยาวฐานครีบกัน (Anal-fin-base length): วัดความยาวจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดของฐานครีบกัน
21. ความยาวคอดหาง (Caudal-peduncle length): วัดความยาวในแนวระนาบจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบกันถึงฐานครีบหาง
22. ระยะห่างระหว่างจุดสิ้นสุดของฐานครีบไขมันถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบหาง
23. จำนวนก้านครีบหลัง (Dorsal-fin ray) แบ่งเป็นก้านครีบแข็งของครีบหลัง (DS: dorsal spine) และก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง (BSR: branched soft ray)
24. จำนวนก้านครีบอก (Pectoral-fin ray) แบ่งเป็นก้านครีบแข็งของครีบอก (PS: pectoral spine) และก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง (BSR: branched soft ray)
25. จำนวนก้านครีบท้อง (Pelvic-fin ray) แบ่งเป็นก้านครีบอ่อนที่ไม่แตกแขนง (SSR: simple-soft ray) และก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง (BSR: branched soft ray)
26. จำนวนก้านครีบกัน (Anal-fin ray) แบ่งเป็นก้านครีบอ่อนที่ไม่แตกแขนง (SSR: simple-soft ray) และก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง (BSR: branched soft ray)
27. จำนวนก้านครีบหาง (Caudal-fin ray) นับจำนวนก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง (BSR: branched soft ray) ของครีบหางตอนบนและตอนล่าง
28. จำนวนซี่กรองเหงือกของแกนเหงือกด้านขวาอันนอกสุด (First right gill arch)



ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างปลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้


● = ตัวอย่างปลาที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มน้ำต่างๆ

○ = ตัวอย่างปลาที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์




ภาพที่ 2 แผนที่การจัดแบ่งลุ่มน้ำของประเทศไทย

(SW : ลุ่มน้ำสาละวิน; CP : ลุ่มน้ำเจ้าพระยา; Se : ลุ่มน้ำภาคตะวันออก; MK : ลุ่มน้ำแม่โขง; Mkl : ลุ่มน้ำแม่กลอง; Tn : ลุ่มน้ำตะนาวศรี; Ma : ลุ่มน้ำภาคใต้)




ภาพที่ 3 วิธีการวัดและนับที่ใช้ในการศึกษาปลากดปลาแขวงวงศ์ Bagridae




ภาพที่ 4 ชั้นกระดูกด้านบนของกะโหลกศีรษะ

ที่มา : Mo (1991)



ภาพที่ 5 ชั้นกระดูกด้านล่างของกะโหลกศีรษะ
ที่มา : Mo (1991)



ภาพที่ 6 ส่วนประกอบของกระดูก a. ชุดกระดูก suspensorium และชุดกระดูกปิดเหงือก,
b. ชุดกระดูก Weberian apparatus, c. ชุดกระดูก hyal และกระดูก branchiostegal ray
และ d. กระดูก cleithrum

ที่มา : Mo (1991)

ผลการศึกษา

จากการศึกษาตรวจสอบตัวอย่างปลากดปลาแขยงวงศ์ Bagridae ที่ได้จากการเก็บรวบรวมใหม่และตัวอย่างเดิมที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์พบปลาสกุล *Bagrichthys* 2 ชนิด คือ *Bagrichthys macracanthus* และ *B. macropterus* สกุล *Batasio* 1 ชนิด คือ *Batasio blythi* สกุล *Hemibagrus* 6 ชนิด คือ *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp. และ *H. elegans* n.sp. สกุล *Leiocassis* 4 ชนิด คือ *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus*, *L. siamensis* และ *L. stenomus* สกุล *Mystus* 10 ชนิด คือ *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan* และ *M. wolffi* สกุล *Sperata* 1 ชนิด คือ *Sperata acicularis* และสกุล *Rita* 1 ชนิด คือ *Rita sacerdotum* (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ชนิดของปลากดปลาแขยงวงศ์ Bagridae ที่พบในไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทยและอังกฤษ	ลุ่มน้ำที่พบ
1. <i>Bagrichthys macracanthus</i> (Bleeker, 1854)	แขยงหมู กดหมู ดุกมุลเกสูง ยางบอน Black lancer catfish	MK; CP; Se
2. <i>Bagrichthys macropterus</i> (Bleeker, 1853)	กดหมู ดุกมุล Black lancer catfish	MK; CP; Se
3. <i>Batasio blythi</i> (Day, 1877)	แขยงเขา Tannasserim batasio; Batashi	Mkl; Ma; Tn
4. <i>Hemibagrus filamentus</i> (Fang and Chaux, 1949)	กดเหลือง กดขงโรง กด Yellow mystus; Yellow bagrid catfish	CP; Se; MK; Mkl; Ma
5. <i>Hemibagrus microphthalmus</i> (Day, 1877)	กดคัง กดแก้ว กัง กิ่ง เคิง Irrawaddy mystus; Red tail catfish	SW; MK; CP; Mkl; Ma

ตารางที่ 4 ต่อ

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทยและอังกฤษ	ลุ่มน้ำที่พบ
6. <i>Hemibagrus nemurus</i> (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1839)	กตเหลือง กตจี๋ลิง กต Yellow mystus; Yellow bagrid catfish	MK; CP; Se; Mkl
7. <i>Hemibagrus wycki</i> (Bleeker, 1858)	กตดำ กตหางคอก กตหม้อ Pot-side catfish; White tail catfish	MK; CP; Mkl
8. <i>Hemibagrus mekongensis</i> n.sp.	กตขาว Bagrid catfish	MK
9. <i>Hemibagrus elegans</i> n.sp.	กต Bagrid catfish	Tn
10. <i>Leiocassis micropogon</i> (Bleeker, 1858)	แขวงหิน Asian bumblebee catfish; Siamese rock catfish	Ma
11. <i>Leiocassis poecilopterus</i> (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1839)	แขวงหิน Asian bumblebee catfish; Siamese rock catfish	Ma
12. <i>Leiocassis siamensis</i> (Regan, 1913)	แขวงหิน Asian bumblebee catfish; Siamese rock catfish	MK; CP; Se; Mkl; Ma
13. <i>Leiocassis stenomus</i> (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1839)	แขวงขี้ด Asian bumblebee catfish; Siamese rock catfish	Se; Ma
14. <i>Mystus atrifasciatus</i> Fowler, 1937	แขวง แขวงข้างลาย Striped catfish	MK; CP; Mkl
15. <i>Mystus bocourti</i> (Bleeker, 1864)	แขวงธง แขวงชายธง เกตุ คันธง Bocourt's river catfish	MK; CP; Se

ตารางที่ 4 ต่อ

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อไทยและอังกฤษ	ลุ่มน้ำที่พบ
16. <i>Mystus cavasius</i> (Hamilton, 1822)	แขงปลาข้างสาละวิน แขง Gangetic mystus	SW
17. <i>Mystus gulio</i> (Hamilton, 1822)	อีกง Long whiskered catfish	CP; MK; Ta; Ma
18. <i>Mystus micracanthus</i> (Bleeker, 1846)	แขงหางจุด Bagrid catfish	Se; Ma
19. <i>Mystus multiradiatus</i> Roberts, 1992	แขง แขวงข้างลาย Striped mystus	CP; Se; Mkl
20. <i>Mystus mysticetus</i> Roberts, 1992	แขง แขวงข้างลาย Striped mystus	CP; MK; Se; Mkl
21. <i>Mystus rhegma</i> Fowler, 1935	แขงข้างลาย แขวงทราย แขง Striped mystus	CP
22. <i>Mystus singaringan</i> (Bleeker, 1846)	แขงปลาขาว แขวงใบขาว Bagrid catfish; Long fin mystus	CP; MK; Se; Mkl; Ma
23. <i>Mystus wolffi</i> (Bleeker, 1851)	แขงนวล Bagrid catfish; Estuarine catfish	CP; Ma
24. <i>Rita sacerdotum</i> Anderson, 1879	กตหมู Rita	SW
25. <i>Sperata acicularis</i> Ferralis and Runge, 1999	กตหัวเสียม Long whiskered catfish	SW; Ta

หมายเหตุ : SW = ลุ่มน้ำสาละวิน; CP = ลุ่มน้ำเจ้าพระยา; Se = ลุ่มน้ำภาคตะวันออก;

MK = ลุ่มน้ำแม่โขง; Mkl = ลุ่มน้ำแม่กลอง; Tn = ลุ่มน้ำตะนาวศรี; Ma = ลุ่มน้ำภาคใต้

ผลการศึกษาครั้งนี้โดยสรุปคือ พบปลาในวงศ์นี้รวม 7 สกุล 25 ชนิด ในจำนวนนี้เป็นปลาชนิดใหม่ (new species) 2 ชนิด คือ *Hemibagrus mekongensis* n.sp. จากลุ่มน้ำโขงและ *Hemibagrus elegans* n.sp. จากลุ่มน้ำตะนาวศรี นอกจากนี้ได้รายงานการพบปลา 2 ชนิด เป็นครั้งแรกในประเทศไทยคือ *Leiocassis micropogon* จากลุ่มน้ำภาคใต้และ *Rita sacerdotum* จากลุ่มน้ำสาละวิน

ผลการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาค

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างภายนอก

ปลาคดปลาแขยงจัดอยู่ในกลุ่มของปลาหนัง มีรูปร่างลำตัวยาวแบบ elongate ลำตัวไม่มีเกล็ด บริเวณตอนหน้าของลำตัวแบนลงและตอนท้ายของลำตัวแบนข้าง สำหรับการแบ่งกลุ่มโดยอาศัยลักษณะความเหมือนและความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาสามารถแสดงโดยเรียงลำดับจากส่วนหัว ลำตัว และหาง ได้แก่ รูปร่างของส่วนหัว ขนาดและรูปร่างของปาก การมีและไม่มีผิวหนังปกคลุมแผ่นกระดูกบริเวณตอนบนส่วนท้ายของหัว การซ้อนหรือไม่ซ้อนทับกันของเยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอ ตำแหน่งของตา การมีหรือไม่มีรูรับความรู้สึกบริเวณหัว ลักษณะของซี่กรองเหงือก การมีหรือไม่มีผิวหนังคลุมตา จำนวนและความยาวหนวด ขอบด้านหลังและขอบด้านหน้า ก้านครีบแข็งของครีบหลัง ขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอก ลักษณะของกระดูก humero-cubital process ความยาวก้านครีบแข็งของครีบหลัง ความยาวฐานครีบไขมัน ลักษณะของสปีบริเวณลำตัว การมีหรือไม่มีจุดหรือแถบขวางสีดำบริเวณครีบหาง และลักษณะของปลายครีบหาง ได้ผลดังนี้

1. ส่วนหัว (head)

1.1 แบ่งกลุ่มตามลักษณะรูปร่างของส่วนหัวออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 7) คือ

1.1.1 กลุ่มมีส่วนหัวรูปร่างแบนลง

- หัวแบนลงมาก ยาวคล้ายใบพาย (ภาพที่ 7.1) คือ *Sperata acicularis*
- หัวแบนลงตลอดแนวของหัวและกว้างค่อนข้างมากหรือปานกลาง (ภาพที่ 7.2) คือ *Hemibagrus microphthalmus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *H. nemurus*, *H. filamentus* และ *H. elegans* n.sp.

- หัวแบนลงเล็กน้อย โดยเฉพาะบริเวณตอนหน้าของส่วนหัว (ภาพที่ 7.3)

คือ *Leiocassis poecilopterus*, *L. stenomus*, *L. siamensis*, *Mystus gulio*, *M. mysticetus*, *M. multiradiatus*, และ *Rita sacerdotum*

1.1.2 กลุ่มมีส่วนหัวรูปร่างแบนข้าง

- หัวแบนข้าง (ภาพที่ 7.4) คือ *Bagrichthys macracanthus*, *B.*

macropterus, *Batasio blythi*, *Leiocassis micropogon*, *Mystus atrifasciatus*, *M. rhegma*, *M. wolffi*, *M. micracanthus*, *M. bocourti*, *M. cavasius* และ *M. singaringan*

1.2 แบ่งกลุ่มตามขนาดและรูปร่างของปากออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 8) คือ

1.2.1 กลุ่มมีปากขนาดเล็ก

- ปากรูปร่างคล้ายวงรีขนาดเล็กตามขนาดของปลายจะงอยปาก (ภาพที่ 8.1)

คือ *Bagrichthys macropterus* และ *B. macracanthus*

1.2.2 กลุ่มมีปากขนาดใหญ่

- ปากรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว มีขนาดใหญ่ตามขนาดของปลายจะงอยปาก (ภาพที่ 8.2) คือ *Batasio blythi*, *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *H. elegans* n.sp., *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus*, *L. siamensis*, *L. stenomus*, *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi*, *Sperata acicularis* และ *Rita sacerdotum*

1.3 แบ่งกลุ่มตามลักษณะการมีและไม่มีผิวหนังปกคลุมแผ่นกระดูกบริเวณด้านบนบนส่วนท้ายของหัว ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 9) คือ

1.3.1 กลุ่มไม่มีผิวหนังปกคลุมแผ่นกระดูกบริเวณตอนบนส่วนท้ายของหัว

- ส่วนท้ายของหัวไม่มีผิวหนังปกคลุม (ภาพที่ 9.1) คือ *Rita sacerdotum*

1.3.2 กลุ่มมีผิวหนังปกคลุมแผ่นกระดูกบริเวณตอนบนส่วนท้ายของหัว

- ส่วนท้ายของหัวมีผิวหนังปกคลุม (ภาพที่ 9.2) คือ *Bagrichthys macropterus*, *B. macracanthus*, *Batasio blythi*, *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus*, *L. stenomus*, *L. siamensis*, *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *H. elegans* n.sp., *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M.*

micracanthus, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi* และ *Sperata acicularis*

1.4 แบ่งกลุ่มตามลักษณะการซ่อนหรือไม่ซ่อนทับกันของเชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอกออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 10) คือ

1.4.1 กลุ่มแผ่นกระดูกปิดคอดคอกไม่ซ่อนทับกัน

- แผ่นกระดูกปิดคอดคอกไม่ซ่อนทับกัน (ภาพที่ 10.1) คือ *Bagrichthys macropterus*, *B. macracanthus* และ *Rita sacerdotum*

1.4.2 กลุ่มแผ่นกระดูกปิดคอดคอกซ่อนทับกัน

- แผ่นกระดูกปิดคอดคอกซ่อนทับกัน (ภาพที่ 10.2) คือ *Batasio blythi*, *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus*, *L. stenomus*, *L. siamensis*, *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *H. elegans* n.sp., *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi* และ *Sperata acicularis*

1.5 แบ่งกลุ่มตามตำแหน่งของตาออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 11) คือ

1.5.1 กลุ่มสามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว

- มองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว (ภาพที่ 11.1) คือ *Mystus mysticetus*

1.5.2 กลุ่มไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว

- ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว (ภาพที่ 11.2) คือ

Bagrichthys macropterus, *B. macracanthus*, *Batasio blythi*, *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus*, *L. stenomus*, *L. siamensis*, *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *H. elegans* n.sp., *M. atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi*, *Rita sacerdotum* และ *Sperata acicularis*

1.6 แบ่งกลุ่มตามการมีหรือไม่มีรูรับความรู้สึกบริเวณหัว (sensory pore) ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 12) คือ

1.6.1 กลุ่มมีรูรับความรู้สึกบริเวณหัว

- มีรูรับความรู้สึกรอบบริเวณหัว (ภาพที่ 12.1) คือ *Batasio blythi*, *Leiocassis poecilopterus* และ *L. stenomus*

1.6.2 กลุ่มไม่มีรูรับความรู้สึกรอบบริเวณหัว

- ไม่มีรูรับความรู้สึกรอบบริเวณหัว (ภาพที่ 12.2) คือ *Bagrichthys macracanthus*, *B. macropterus*, *Hemibagrurus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *H. elegans* n.sp., *Leiocassis micropogon*, *L. siamensis*, *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi*, *Rita sacerdotum* และ *Sperata acicularis*

1.7 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของซี่กรองเหงือก (gill raker) ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 13) คือ

1.7.1 กลุ่มมีซี่กรองเหงือกเป็นเส้นหนา

- ซี่กรองเหงือกเป็นเส้นหนา สั้น (ภาพที่ 13.1) คือ *Bagrichthys macracanthus*, *B. macropterus*, *Batasio blythi*, และ *Mystus bocourti*
 - ซี่กรองเหงือกเป็นเส้นหนา ยาวปานกลาง (ภาพที่ 13.2) คือ *Leiocassis poecilopterus*, *L. siamensis*, *L. stenomus*, *Hemibagrurus filamentus*, *H. nemurus*, *H. microphthalmus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp. และ *Sperata acicularis*

1.7.2 กลุ่มมีซี่กรองเหงือกเป็นเส้นเรียวยาว

- ซี่กรองเหงือกเป็นเส้นเรียวยาว มีจำนวน 15-45 อัน (ภาพที่ 13.3) คือ *Leiocassis micropogon*, *Mystus atrifasciatus*, *M. cavasius*, *M. micracanthus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi*, *Mystus gulio* และ *Hemibagrurus elegans* n.sp.
 - ซี่กรองเหงือกเป็นเส้นเรียวยาว มีจำนวน 51-85 อัน (ภาพที่ 13.4) คือ *Mystus mysticetus* และ *M. multiradiatus*

1.8 แบ่งกลุ่มตามการมีหรือไม่มีผิวหนังคลุมตา (subcutaneous) ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 14) คือ

1.8.1 กลุ่มมีผิวหนังคลุมตา

- มีพืชน้ำคลุมตา (ภาพที่ 14.1) คือ *Bagrichthys macropterus*, *B. macracanthus*, *Batasio blythi*, *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus*, *L. stenomus*, *L. siamensis* และ *Rita sacerdotum*

1.8.2 กลุ่มไม่มีพืชน้ำคลุมตา

- ไม่มีพืชน้ำคลุมตา (ภาพที่ 14.2) คือ *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *H. elegans* n.sp., *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi*, *Rita sacerdotum* และ *Sperata acicularis*

1.9 แบ่งกลุ่มตามจำนวนของหนวดออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 15) คือ

1.9.1 กลุ่มที่มีหนวด 2 คู่ ได้แก่ หนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel) และ หนวดที่ขากรรไกรล่าง (mandibular barbel)

- หนวดมี 2 คู่ (ภาพที่ 15.1) คือ *Rita sacerdotum*

1.9.2 กลุ่มที่มีหนวด 4 คู่ ได้แก่ หนวดที่ขากรรไกรบน, หนวดบริเวณจมูก (nasal barbel), หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่าง (outer mandibular barbel) และหนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่าง (inner mandibular barbel)

- หนวดมี 4 คู่ (ภาพที่ 15.2) คือ *Bagrichthys macropterus*, *B. macracanthus*, *Batasio blythi*, *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus*, *L. stenomus*, *L. siamensis*, *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *H. elegans* n.sp., *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi* และ *Sperata acicularis*

1.10 แบ่งกลุ่มตามความยาวของหนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel) ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 16) คือ

1.10.1 กลุ่มมีหนวดที่ขากรรไกรบนสั้น

- หนวดบริเวณขากรรไกรบนยาวไม่เกินตอนกลางของครีบอก (ภาพที่ 16.1) คือ *Bagrichthys macropterus*, *B. macracanthus*, *Batasio blythi*, *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus*, *L. stenomus*, *L. siamensis* และ *Rita sacerdotum*

1.10.2 กลุ่มมีหนวดที่ขากรรไกรบนยาว

- หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงบริเวณตอนปลายของครีบอก (ภาพที่

16.2) คือ *Hemibagrus wycki*

- หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงบริเวณครีบท้อง (ภาพที่ 16.3) คือ *Mystus gulio* และ *Sperata acicularis*

- หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงบริเวณครีบก้นหรือยาวเลยเล็กน้อย (ภาพที่ 16.4) คือ *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. mekongensis* n.sp., *H. elegans* n.sp., *Mystus atrifasciatus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma* และ *M. wolffi*

- หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงบริเวณครีบท่าง (ภาพที่ 16.5) คือ *Mystus bocourti*, *M. cavasius*, *M. micracanthus* และ *M. singaringan*

1.11 แบ่งกลุ่มตามความยาวหนวดบริเวณจมูก (nasal barbel) ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 17) คือ

1.11.1 กลุ่มมีหนวดบริเวณจมูกสั้น

- หนวดบริเวณจมูกยาวไม่ถึงขอบด้านหน้าของตา (ภาพที่ 17.1) คือ *Hemibagrus wycki* และ *Sperata acicularis*
- หนวดบริเวณจมูกยาวถึงบริเวณขอบด้านหน้าของตา (ภาพที่ 17.2) คือ *Batasio blythi*, *Hemibagrus filamentus*, *Leiocassis micropogon* และ *H. microphthalmus*
- หนวดบริเวณจมูกยาวถึงบริเวณขอบด้านหลังของตา (ภาพที่ 17.3) คือ *Hemibagrus nemurus*, *H. mekongensis* n.sp., *H. elegans* n.sp., *Mystus gulio* และ *Bagrichthys macracanthus*

1.11.2 กลุ่มมีหนวดบริเวณจมูกยาว

- หนวดบริเวณจมูกยาวถึงส่วนท้ายของหัว (ภาพที่ 17.4) คือ *Bagrichthys macropterus*, *Leiocassis poecilopterus*, *L. siamensis*, *L. stenopus*, *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. rhegma* และ *M. singaringan*
- หนวดบริเวณจมูกยาวเกือบถึงบริเวณฐานครีบท่าง (ภาพที่ 17.5) คือ *Mystus mysticetus* และ *M. wolffi*

1.12 แบ่งกลุ่มตามความยาวหนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่าง (outer mandibular barbel) ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 18) คือ

1.12.1 กลุ่มมีหนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างสั้น

- หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวไม่ถึงคอดคอ (ภาพที่ 18.1) คือ *Rita sacerdotum* (มีหนวดบริเวณขากรรไกรล่างเพียง 1 คู่), *Bagrichthys macracanthus*, *Batasio blythi*, *Bagrichthys macropterus*, *Leiocassis micropogon* และ *L. siamensis*

1.12.2 กลุ่มมีหนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาว

- หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณครีบอก (ภาพที่ 18.2) คือ *Sperata acicularis*, *Leiocassis stenomus*, *L. poecilopterus*, *Hemibagrus microphthalmus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *Mystus cavasius*, *Hemibagrus nemurus*, *H. elegans* n.sp., *H. filamentus*, *Mystus bocourti*, *M. singaringan*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. gulio*, *M. atrifasciatus*, *M. rhegma*, *M. wolffi* และ *M. mysticetus*

1.13 แบ่งกลุ่มตามความยาวหนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่าง (inner mandibular barbel) ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 19) คือ

1.13.1 กลุ่มมีหนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างสั้น

- หนวดบริเวณขากรรไกรล่างคู่ในยาวไม่ถึงบริเวณกึ่งกลางหัว (ภาพที่ 19.1) คือ *Rita sacerdotum* (มีหนวดบริเวณขากรรไกรล่างเพียง 1 คู่), *Bagrichthys macracanthus*, *B. macropterus*, *Batasio blythi*, *Leiocassis micropogon*, *L. siamensis* และ *Hemibagrus wycki*

1.13.2 กลุ่มมีหนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาว

- หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณคอดคอ (ภาพที่ 19.2) คือ *Sperata acicularis*, *Hemibagrus microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. mekongensis* n.sp., *H. elegans* n.sp., *Mystus bocourti*, *Leiocassis poecilopterus*, *L. stenomus*, *Mystus cavasius*, *M. micracanthus* และ *Hemibagrus filamentus*

- หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณส่วนต้นของครีบอก (ภาพที่ 19.3) คือ *Mystus gulio*, *M. atrifasciatus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan* และ *M. wolffi*

2. ส่วนลำตัว (trunk)

2.1 แบ่งกลุ่มตามลักษณะขอบด้านหลังก้านครีบกึ่งแข็งของครีบท้อง (dorsal spine) ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 20) คือ

2.1.1 กลุ่มมีขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังเรียบ

- ขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังเรียบ (ภาพที่ 20.1) คือ

Hemibagrus microphthalmus

2.1.2 กลุ่มมีขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จัก

- ขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จักซี่สั้น (ภาพที่ 20.2) คือ

Bagrichthys macracanthus และ *B. macropterus*

- ขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จักซี่ลง (ภาพที่ 20.3) คือ

Batasio blythi, *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus*, *L. siamensis*, *L. stenomus*, *Hemibagrus filamentus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *H. elegans* n.sp., *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi*, *Rita sacerdotum* และ *Sperata acicularis*

2.2 แบ่งกลุ่มตามลักษณะขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบหลังออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 21) คือ

2.2.1 กลุ่มขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบหลังไม่เป็นซี่จัก

- ขอบด้านหน้าของก้านครีบแข็งของครีบหลังไม่เป็นซี่จัก (ภาพที่ 21.1) คือ

Bagrichthys macracanthus, *B. macropterus*, *Batasio blythi*, *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *H. elegans* n.sp., *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus*, *L. siamensis*, *L. stenomus*, *Mystus bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wycki*, *Rita sacerdotum* และ *Sperata acicularis*

2.2.2 กลุ่มขอบด้านหน้าบริเวณปลายก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จัก

- ขอบด้านหน้าบริเวณปลายก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จัก (ภาพที่

21.2) คือ *Mystus atrifasciatus*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus* และ *M. mysticetus*

2.3 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของซี่จักบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของกรีบอก (pectoral spine) ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 22) คือ

2.3.1 กลุ่มมีซี่จักขนาดใหญ่บริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของกรีบอก

- ซี่จักอันสุดท้ายที่อยู่ปลายสุดของก้านครีบแข็งมีขนาดใหญ่กว่าซี่อื่นๆ

และมีลักษณะโค้งงอคล้ายตะขอ (ภาพที่ 22.1) คือ *Hemibagrus microphthalmus* และ *Mystus rhegma*

- ซึ่งจักมีความยาวไล่เลี่ยกัน และอันสุดท้ายไม่โค้งงอคล้ายตะขอ (ภาพที่

22.2) คือ *Leiocassis stenomus*, *L. poecilopterus*, *L. micropogon*, *Batasio blythi*, *Mystus gulio*, *M. micracanthus*, *Mystus wolffi* และ *Hemibagrus elegans* n.sp.

2.3.2 กลุ่มมีซี่จักขนาดเล็กบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอก

- ซึ่งจักมีขนาดเล็กถึงเล็กมาก มีความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดเล็กไล่เลี่ยกัน (ภาพที่ 22.3) คือ *Mystus atrifasciatus*, *M. multiradiatus*, *M. cavasius*, *M. singaringan*, *M. bocourti*, *M. mysticetus*, *Leiocassis siamensis*, *Bagrichthys macracanthus*, *B. macropterus*, *Hemibagrus wycki*, *H. nemurus*, *H. mekongensis* n.sp., *H. filamentus*, *Sperata acicularis* และ *Rita sacerdotum*

2.4 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก humero-cubital process ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 23) คือ

2.4.1 กลุ่มมีฐานของกระดูก humero-cubital process แคบ

- กระดูก humero-cubital process มีฐานแคบ มีความยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน (ภาพที่ 23.1) คือ *Leiocassis stenomus*, *Batasio blythi*, *Mystus bocourti*, *M. cavasius* และ *M. rhegma*

- กระดูก humero-cubital process มีฐานแคบ มีความยาว 2-3 เท่าของความกว้างของฐาน (ภาพที่ 23.2) คือ *Hemibagrus microphthalmus*, *Mystus gulio* และ *M. wolffi*

2.4.2 กลุ่มมีฐานของกระดูก humero-cubital process กว้าง

- กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้าง ความยาวน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างของฐาน (ภาพที่ 23.3) คือ *Hemibagrus mekongensis* n.sp., *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. filamentus*, *Sperata acicularis*, *Mystus multiradiatus*, *M. singaringan*, *M. micracanthus*, *M. mysticetus*, *M. atrifasciatus*, *Bagrichthys macracanthus*, *Leiocassis poecilopterus* และ *L. siamensis*

- กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้าง มีความยาว 2 เท่าของความกว้างของฐาน (ภาพที่ 23.4) คือ *Bagrichthys macropterus*

2.5 แบ่งกลุ่มตามความยาวก้านครีบแข็งของครีบหลัง (dorsal spine) ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 24) คือ

2.5.1 กลุ่มมีก้านครีบแข็งของครีบหลังยาว

- ก้านครีบแข็งของครีบหลังยาวมาก ยาวเกือบเท่ากับความยาวของลำตัว (ภาพที่ 24.1) คือ *Mystus bocourti*

- ก้านครีบแข็งของครีบหลังยาว ยาวเกือบเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัว (ภาพที่ 24.2) คือ *Bagrichthys macracanthus*

2.5.2 กลุ่มมีก้านครีบแข็งของครีบหลังสั้น

- ก้านครีบแข็งของครีบหลังยาวไม่ถึง 1 ใน 4 ของความยาวลำตัว (ภาพที่ 24.3) คือ *Bagrichthys macropterus*, *Batasio blythi*, *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus*, *L. stenomus*, *L. siamensis*, *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *H. elegans* n.sp., *Mystus atrifasciatus*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi*, *Rita sacerdotum* และ *Sperata acicularis*

2.6 แบ่งกลุ่มตามความยาวฐานของครีบไขมัน (adipose fin) ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 25) คือ

2.6.1 กลุ่มมีฐานของครีบไขมันยาว

- ครีบไขมันมีฐานยาวเกินครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัว (ภาพที่ 25.1) คือ *Bagrichthys macracanthus*, *B. macropterus*, *Mystus cavasius*, *M. bocourti* และ *M. singaringan*

- ครีบไขมันยาวเกือบถึงครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัว (ภาพที่ 25.2) คือ *Batasio blythi*, *Hemibagrus wycki*, *H. elegans* n.sp., *Mystus atrifasciatus*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. rhegma* และ *Sperata acicularis*

2.6.2 กลุ่มมีฐานของครีบไขมันสั้น

- ครีบไขมันมีฐานยาวไม่ถึง 1 ใน 4 ของความยาวลำตัว (ภาพที่ 25.3) คือ *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. elegans* n.sp., *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus*, *L. siamensis*, *L. stenomus*, *Mystus gulio*, *M. mysticetus*, *M. wolffi* และ *Rita sacerdotum*

2.7 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของสีบริเวณลำตัว (color pattern) ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 26) คือ

2.7.1 กลุ่มมีแถบขนาดใหญ่บริเวณลำตัว

- บริเวณลำตัวมีแถบสีเข้มหรือสีดำพาดขวาง มีจำนวนแถบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิด (ภาพที่ 26.1) คือ *Bagrichthys macropterus*, *B. macracanthus*, *Batasio blythi*, *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus*, *L. siamensis* และ *L. stenomus*
- บริเวณลำตัวมีแถบสีเข้มหรือสีดำพาดในแนวตามยาว สามแถบ (ภาพที่ 26.2) คือ *Mystus atrifasciatus*, *M. mysticetus*, *M. multiradiatus*, *M. rhegma* และ *M. bocourti* (สำหรับ *M. bocourti* พบมีตัวอย่างบางตัวไม่ปรากฏแถบสีดังกล่าว)

2.7.2 กลุ่มมีจุดสีบริเวณลำตัว

- บริเวณลำตัวมีจุดเรียงตัวเป็นแถบขวาง (ภาพที่ 26.3) คือ *Hemibagrus elegans* n.sp.
- บริเวณจุดเริ่มต้นของฐานครีบหลังมีจุดสีดำขนาดใหญ่ (ภาพที่ 26.4) คือ *Mystus cavasius*
- บริเวณฐานครีบหางมีจุดสีดำขนาดใหญ่ (ภาพที่ 26.5) คือ *M. micracanthus*

2.7.3 กลุ่มไม่มีจุดขนาดใหญ่หรือแถบบริเวณลำตัว

- บริเวณลำตัวไม่มีจุดขนาดใหญ่หรือแถบ (ภาพที่ 26.6) คือ *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *Mystus gulio*, *M. singaringan*, *M. wolffi*, *Rita sacerdotum* และ *Sperata acicularis*

3. ส่วนหาง (tail)

3.1 แบ่งกลุ่มตามการมีหรือไม่มีจุดหรือแถบขวางสีดำบริเวณครีบหางออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 27) คือ

3.1.1 กลุ่มมีจุดหรือแถบสีดำบริเวณครีบหาง

- ครีบหางมีแถบสีดำพาดขวาง (ภาพที่ 27.1) คือ *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus* และ *L. siamensis*

3.1.2 กลุ่มไม่มีจุดหรือแถบสีดำบริเวณครีบหาง

- ครีบหางไม่มีจุดหรือแถบสีดำพาดขวาง (ภาพที่ 27.2) คือ *Bagrichthys macropterus*, *B. macracanthus*, *Batasio blythi*, *Leiocassis stenomus*, *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *H. elegans* n.sp., *Sperata*

acicularis, *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi* และ *Rita sacerdotum*

3.2 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของปลายครีบหางออกเป็น 3 กลุ่ม (ภาพที่ 28) คือ

3.2.1 กลุ่มมีปลายครีบหางกลมมน

- ปลายครีบหางแบนบนและล่างกลมมน (ภาพที่ 28.1) คือ *Batasio blythi* และ *Leiocassis poecilopterus*

3.2.2 กลุ่มมีปลายครีบหางแบนบนแหลม ปลายแบนล่างค่อนข้างกลมมน

- ปลายครีบหางแบนบนเพรียวแหลม ปลายแบนล่างค่อนข้างกลมมน (ภาพที่ 28.2) คือ *Mystus gulio*, *M. micracanthus*, *M. atrifasciatus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus* และ *M. wolffi*, *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. mekongensis* n.sp. และ *H. elegans* n.sp.

3.2.3 กลุ่มมีปลายครีบหางแหลม

- ปลายครีบหางแบนบนและล่างแหลม (ภาพที่ 28.3) คือ *Hemibagrus wycki*, *Leiocassis micropogon*, *L. siamensis*, *L. stenomus*, *Bagrichthys macropterus*, *B. macracanthus*, *Mystus cavasius*, *M. bocourti*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *Rita sacerdotum* และ *Sperata acicularis*

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะกายวิภาค

ด้านกายวิภาคได้เลือกศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของระบบโครงสร้างและระบบอวัยวะภายในได้แก่ รูปร่างด้านบนของกระดูก mesethmoid ลักษณะของร่องกึ่งกลางหัว ลักษณะของกระดูก supraoccipital process ขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid การโค้งงอลงด้านล่างของขอบกระดูก lateral ethmoid แฉกฟัน vomerine teeth แฉกฟัน mandibular teeth กระดูก maxilla กระดูก nasal กระดูก lacrymal และ infraorbital กระดูก metapterygoid กระดูก interopercle กระดูก urohyal กระดูก branchiostegal ray และ ชุดกระดูก hyal กระดูก Weberian apparatus กระดูก posttemporal กระดูก pelvic girdle ลักษณะของกระเพาะอาหาร ความยาวลำไส้ รูปร่างของไตส่วนหลัง และลักษณะของกระเพาะลม สำหรับการแบ่งกลุ่มตามลักษณะความเหมือนและความแตกต่างทางกายวิภาคได้ผลดังนี้

1. แบ่งกลุ่มตามรูปร่างด้านบนของกระดูก mesethmoid ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 29) คือ

1.1 กลุ่มมีกระดูก mesethmoid รูปร่างเป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ความกว้างของกระดูกใกล้เคียงกัน ตอนหน้ามีส่วนที่ยื่นออกด้านข้างขนาดแตกต่างกัน

- ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวไม่เกินปลายของกระดูก lateral ethmoid (ภาพที่ 29.1) คือ *Bagrichthys macropterus*, *B. macracanthus*, *Batasio blythi*, *Leiocassis siamensis*, *L. stenomus*, *L. poecilopterus* และ *Mystus bocourti*, *M. atrifasciatus*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. myticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi* และ *Hemibagrus mekongensis* n.sp

- ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวเลยปลายของกระดูก lateral ethmoid (ภาพที่ 29.2) คือ *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus* และ *H. wycki*

1.2 กลุ่มมีกระดูก mesethmoid รูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยม ตอนหน้าหลังส่วนที่ยื่นออกแผ่กว้างออกและตอนท้ายค่อนข้างแหลม

- กระดูก mesethmoid ขนาดใหญ่ ส่วนหน้าที่ยื่นออกทั้งสองข้างกว้างและสั้น ตอนท้ายยาวไม่เลยปลายของกระดูก lateral ethmoid (ภาพที่ 29.3) คือ *Sperata acicularis*

2. แบ่งกลุ่มตามลักษณะของร่องกึ่งกลางหัว (fontanelle) ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 30) คือ

2.1 กลุ่มมีร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้า (anterior fontanelle) แยกออกจากร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลัง (posterior fontanelle)

- ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเป็นร่องยาว ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังลดรูปเหลือเป็นเพียงแอ่งรูปวงรีขนาดเล็ก (ภาพที่ 30.1) คือ *Leiocassis poecilopterus* และ *L. stenomus*

2.2 กลุ่มมีร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเชื่อมติดต่อกับร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลัง

- ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเป็นร่องยาว ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังลดรูปเหลือเป็นเพียงร่องขนาดเล็ก (ภาพที่ 30.2) คือ *Mystus atrifasciatus*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus* และ *M. mysticetus*

- ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าและร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องยาว (ภาพที่ 30.3) คือ *Bagrichthys macracanthus*, *B. macropterus*, *Batasio blythi*, *Leiocassis siamensis*, *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. mekongensis* n.sp., *H. wycki*, *Sperata acicularis*, *Mystus bocourti*, *M. cavasius*, *M. rhegma*, *M. singaringan* และ *M. wolffi*

3. แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก supraoccipital process ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 31) คือ

3.1 กลุ่มมีกระดูก supraoccipital process สั้น

- กระดูก supraoccipital process ยาวไม่เกิน 2 เท่าของความกว้างฐานกระดูก (ภาพที่ 31.1) คือ *Leiocassis poecilopterus*, *Hemibagrus wycki* และ *Leiocassis stenomus*

3.2 กลุ่มมีกระดูก supraoccipital process ยาว

- กระดูก supraoccipital process ยาวประมาณ 3 เท่าของความกว้างฐานกระดูก (ภาพที่ 31.2) คือ *Sperata acicularis*, *Hemibagrus microphthalmus*, *H. filamentus*, *Batasio blythi*, *Mystus rhegma*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. atrifasciatus* และ *Leiocassis siamensis*

- กระดูก supraoccipital process ยาวมากกว่า 4 เท่าของความกว้างฐาน (ภาพที่ 31.3) คือ *Bagrichthys macropterus*, *B. macracanthus*, *Mystus bocourti*, *M. cavasius*, *M. singaringan*, *M. wolffi*, *Hemibagrus nemurus* และ *H. mekongensis* n.sp.

4. แบ่งกลุ่มจากลักษณะของขอบด้านนอกกระดูก lateral ethmoid ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 32) คือ

4.1 กลุ่มที่ขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid มี process

- ขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid มี process ขนาดเล็ก 1 อัน (ภาพที่ 32.1) คือ *Hemibagrus wycki* และ *H. microphthalmus*

- ขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid มี process ขนาดเล็ก 2 อัน (ภาพที่ 32.2) คือ *Leiocassis siamensis*

4.2 กลุ่มขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process

- ขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process (ภาพที่ 32.3) คือ *Bagrichthys macracanthus*, *B. macropterus*, *Batasio blythi*, *Leiocassis poecilopterus*, *L. stenomus*, *Hemibagrus filamentus*, *H. nemurus*, *H. mekongensis* n.sp., *Sperata acicularis*, *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan* และ *M. wolffi*

5. แบ่งกลุ่มจากลักษณะของการโค้งงอลงด้านล่างของขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 33) คือ

5.1 กลุ่มมีขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid โค้งงอลงด้านล่าง

- ขอบกระดูก lateral ethmoid มีขอบโค้งงอลงด้านล่าง (ภาพที่ 33.1) คือ *Mystus atrifasciatus* และ *M. wolffi*

5.2 กลุ่มมีขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid ไม่โค้งงอลงด้านล่าง

- กระดูก lateral ethmoid ไม่โค้งงอลงด้านล่าง (ภาพที่ 33.2) คือ *Bagrichthys macracanthus*, *B. macropterus*, *Batasio blythi*, *Leiocassis siamensis*, *L. stenomus*, *L. poecilopterus*, *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *Sperata acicularis*, *Mystus bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma* และ *M. singaringan*

6. แบ่งกลุ่มตามขนาดของแถบฟัน vomerine teeth ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 34) คือ

6.1 กลุ่มมีแถบฟัน vomerine teeth ขนาดเล็ก

- แถบฟัน vomerine teeth แคบและสั้น (ภาพที่ 34.1) คือ *Bagrichthys macropterus* และ *B. macracanthus*

- แถบฟัน vomerine teeth สั้นกว้าง (ภาพที่ 34.2) คือ *Leiocassis siamensis* และ *Batasio blythi*

- แถบฟัน vomerine teeth แคบและโค้งยาวปานกลาง (ภาพที่ 34.3) คือ *Leiocassis poecilopterus*, *L. stenomus*, *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan* และ *M. wolffi*

6.2 กลุ่มมีแถบฟัน vomerine teeth ขนาดใหญ่

- แถบฟัน vomerine teeth กว้างและโค้งยาว (ภาพที่ 34.4) คือ *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp. และ *Sperata acicularis*

7. แบ่งกลุ่มตามลักษณะของแถบฟัน mandibular teeth ออกเป็น 3 กลุ่ม (ภาพที่ 35) คือ

7.1 กลุ่มมีแถบฟัน mandibular teeth สั้น

- แถบฟัน mandibular teeth รูปร่างคล้ายกระสวย (ภาพที่ 35.1) คือ *Bagrichthys macracanthus*, *Batasio blythi* และ *Leiocassis siamensis*

7.2 กลุ่มมีแถบฟัน mandibular teeth ยาว

- แถบฟัน mandibular teeth โค้งยาว (ภาพที่ 35.2) คือ *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *Leiocassis poecilopterus*, *L. stenomus*, *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi* และ *Sperata acicularis*

7.3 กลุ่มไม่มี mandibular teeth

- ไม่มีฟัน mandibular teeth (ภาพที่ 35.3) คือ *Bagrichthys macropterus*

8. แบ่งกลุ่มตามขนาดของกระดูก maxilla ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 36) คือ

8.1 กลุ่มมีกระดูก maxilla เล็กและสั้น

- กระดูก maxilla เล็กและสั้น (ภาพที่ 36.1) คือ *Bagrichthys macracanthus*, *B. macropterus*, *Batasio blythi*, *Leiocassis poecilopterus*, *L. siamensis* และ *L. stenomus*

8.2 กลุ่มมีกระดูก maxilla ยาว

- กระดูก maxilla ยาว (ภาพที่ 36.2) คือ *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi* และ *Sperata acicularis*

9. แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก nasal ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 37) คือ

9.1 กลุ่มมีกระดูก nasal สั้น

- กระดูก nasal สั้น ส่วนต้นไม่แผ่ขยายออก (ภาพที่ 37.1) คือ *Batasio blythi*.

Leiocassis poecilopterus และ *L. stenomus*

- กระดูก nasal สั้น ส่วนต้นแผ่ขยายออก (ภาพที่ 37.2) คือ *Leiocassis siamensis*

9.2 กลุ่มมีกระดูก nasal ขาว

- กระดูก nasal ขาว (ภาพที่ 37.3) คือ *Bagrichthys macracanthus*, *B.*

macropterus, *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi* และ *Sperata acicularis*

10. แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก lacrymal และ infraorbital ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 38) คือ

10.1 กลุ่มที่กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้น และมีปลายเรียวแหลม (ยกเว้นของ *Sperata acicularis*)

- กระดูก infraorbital ชั้นที่ 2 และ 5 ยาวกว่าที่ 1, 3 และ 4 (ภาพที่ 38.1) คือ

Hemibagrus filamentus, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki* และ *H. mekongensis* n.sp.

- กระดูก infraorbital ชั้นที่ 1 และ 5 ยาวกว่าชั้นอื่นๆ (ภาพที่ 38.2) คือ *Sperata*

acicularis

- กระดูก infraorbital ทุกชั้นมีความยาวใกล้เคียงกัน (ภาพที่ 38.3) คือ

Bagrichthys macracanthus, *B. macropterus*, *Batasio blythi*, *Leiocassis poecilopterus*, *L. stenomus* และ *L. siamensis*

10.2 กลุ่มที่กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process ค่อนข้างยาว และมีปลายแหลม

- กระดูก infraorbital ทุกชั้นมีความยาวใกล้เคียงกัน (ภาพที่ 38.4) คือ

Mystus atrifasciatus, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. singaringan* และ *M. rhegma*

- กระดูก infraorbital ชั้นที่ 2 ยาวกว่าชั้นอื่นๆ มาก (ภาพที่ 38.5) คือ *Mystus*

wolffi

11. แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก metapterygoid ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 39) คือ

11.1 กลุ่มมีกระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนกว้าง

- กระดูก metapterygoid เชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และ hyomandibular (ภาพที่ 39.1) คือ *Hemibagrus filamentus*, *H. micracanthus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *Sperata acicularis*, *Bagrichthys macropterus*, *B. macracanthus*, *Leiocassis siamensis*, *L. stenomus*, และ *L. poecilopterus*

- กระดูก metapterygoid เชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate แต่ไม่ติดต่อกับกระดูก hyomandibular (ภาพที่ 39.2) คือ *Batasio blythi*

11.2 กลุ่มมีกระดูก metapterygoid มีลักษณะเป็นแท่งคล้ายรูปทรงกระบอกและมีขนาดเล็ก

- กระดูก metapterygoid เชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และแยกห่างจากกระดูก hyomandibular (ภาพที่ 39.3) คือ *Mystus atrifasciatus*, *M. cavasius*, *M. bocourti*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan* และ *M. wolffi*

12. แบ่งตามลักษณะของกระดูก interopercle ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 40) คือ

12.1 กลุ่มมีกระดูก interopercle ขนาดเล็ก

- กระดูก interopercle มีขนาดเล็ก (ภาพที่ 40.1) คือ *Bagrichthys macropterus*

12.2 กลุ่มมีกระดูก interopercle ขนาดใหญ่

- กระดูก interopercle แบนและมีความกว้างใกล้เคียงกันทั้งขึ้น (ภาพที่ 40.2) คือ *Batasio blythi*

- กระดูก interopercle แบนและกว้างกว่าทางตอนท้าย รูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยม (ภาพที่ 40.3) คือ *Bagrichthys macracanthus*, *Leiocassis siamensis*, *L. poecilopterus*, *L. stenomus*, *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi*, *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp. และ *Sperata acicularis*

13. แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก urohyal ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 41) คือ

13.1 กลุ่มมีส่วนท้ายของกระดูก urohyal ลักษณะเป็น process ยาว

- ส่วนท้ายของกระดูก urohyal ยาวเป็น 2-2.5 เท่าของความกว้างฐาน process

(ภาพที่ 41.1) คือ *Sperata acicularis*, *Hemibagrur filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki* และ *H. mekongensis* n.sp.

13.2 กลุ่มมีส่วนท้ายของกระดูก urohyal ลักษณะเป็น process สั้น

- ส่วนท้ายของกระดูก urohyal ยาวไม่ถึง 1 เท่าความกว้างฐานของ process

(ภาพที่ 41.2) คือ *Bagrichthys macracanthus*, *B. macropterus*, *Batasio blythi*, *Leiocassis poecilopterus*, *L. siamensis*, *L. stenomus*, *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. micracanthus*, *M. gulio*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan* และ *M. wolffi*

14. แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก branchiostegal ray และชุดกระดูก hyal ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 42) คือ

14.1 กลุ่มมีกระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นยาวทั้งหมดทุกด้าน

- กระดูก ceratohyal และ epihyal ขนาดเล็ก (ภาพที่ 42.1) คือ *Bagrichthys macropterus*

14.2 กลุ่มมีกระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้น ด้านสุดท้ายและรอบสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน

- กระดูก ceratohyal และ epihyal มีขนาดเล็ก ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal ไม่แผ่กว้าง (ภาพที่ 42.2) คือ *Batasio blythi*

- กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แผ่กว้าง (ภาพที่ 42.3) คือ *Bagrichthys macracanthus*, *Hemibagrur filamentus*, *H. nemurus*, *H. microphthalmus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *Leiocassis poecilopterus*, *L. siamensis*, *L. stenomus*, *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi* และ *Sperata acicularis*

15. แบ่งกลุ่มกระดูก Weberian apparatus ตามลักษณะของกระดูก neural spine ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 43) คือ

15.1 กลุ่มมีกระดูก neural spine สั้น

- กระดูก neural spine ยาวเท่ากับความกว้างของฐาน spine (ภาพที่ 43.1) คือ

Leiocassis stenomus

- กระดูก neural spine ยาวไม่ถึง 3 เท่าของความกว้างของฐาน spine (ภาพที่ 43.2) คือ *Leiocassis poecilopterus*, *Batasio blythi*, *Mystus atrifasciatus*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus* และ *M. mysticetus*

15.2 กลุ่มมีกระดูก neural spine ยาว

- กระดูก neural spine ยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน spine (ภาพที่ 43.3) คือ *Bagrichthys macracanthus*, *B. macropterus*, *Leiocassis siamensis*, *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *Sperata acicularis*, *Mystus bocourti*, *M. singaringan*, *M. rhegma* และ *M. wolffi*

16. แบ่งกลุ่มกระดูก Weberian apparatus ตามลักษณะของกระดูก Müllerian process ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 44) คือ

16.1 กลุ่มมีกระดูก Müllerian process มีรูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอกสั้น มีปลายทู่

- กระดูก Müllerian process ลักษณะคล้ายแท่งทรงกระบอกสั้น มีปลายทู่ (ภาพที่ 44.1) คือ *Bagrichthys macropterus* และ *B. macracanthus*

16.2 กลุ่มมีกระดูก Müllerian process เรียวยาว มีปลายแหลม

- กระดูก Müllerian process เรียวยาว มีปลายแหลม (ภาพที่ 44.2) คือ *Batasio blythi*, *Leiocassis poecilopterus*, *L. siamensis*, *L. stenomus*, *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *Sperata acicularis*, *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan* และ *M. wolffi*

17. แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก posttemporal ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 45) คือ

17.1 กลุ่มมีส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process ไม่มีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ใต้ process

- ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal ไม่เป็นแผ่นแบน (ภาพที่ 45.1) คือ *Leiocassis stenomus* และ *Bagrichthys macropterus*

17.2 กลุ่มมีส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process และมีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ใต้ process

- ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal มีแผ่นแบนอยู่ใต้ process

(ภาพที่ 45.2) คือ *Batasio blythi*, *Bagrichthys macracanthus*, *Leiocassis poecilopterus*, *L. siamensis*, *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi*, *Hemibagrus filamentus*, *H. nemurus*, *H. microphthalmus*, *H. mekongensis* n.sp., *Sperata acicularis* และ *Hemibagrus wycki*

18. แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก pelvic girdle ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 46) คือ

18.1 กลุ่มมีกระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างมากที่ส่วนท้ายของ girdle และแผ่ไปถึงส่วนหน้า

- กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างมากที่ส่วนท้ายของ girdle และแผ่ไปถึงส่วนหน้า (ภาพที่ 46.1) คือ *Bagrichthys macracanthus*, *B. macropterus*, *Leiocassis poecilopterus* และ *L. siamensis*

18.2 กลุ่มมีกระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบน กว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle เท่านั้น

- กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบน กว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle เท่านั้น (ภาพที่ 46.2) คือ *Leiocassis stenomus*, *Batasio blythi*, *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *Sperata acicularis*, *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. micracanthus*, *M. gulio*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan* และ *M. wolffi*

19. แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระเพาะอาหาร (stomach) ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 47) คือ

19.1 กลุ่มมีกระเพาะอาหารรูปร่างคล้ายรูปทรงกระบอก

- กระเพาะอาหารยาวรูปร่างคล้ายรูปทรงกระบอก (ภาพที่ 47.1) คือ *Sperata acicularis*

19.2 กลุ่มมีกระเพาะอาหารรูปร่างยาวรี หรือ กลมมน

- กระเพาะอาหารรูปร่างยาวรี หรือ กลมมน (ภาพที่ 47.2) คือ *Batasio blythi*, *Hemibagrus nemurus*, *H. wycki*, *Leiocassis siamensis*, *L. stenomus*, *Mystus cavasius*, *M. singaringan*, *M. micracanthus*, *M. rhegma*, *Bagrichthys macropterus*, *B. macracanthus*, *Hemibagrus filamentus*, *H. mekongensis* n.sp., *H. microphthalmus*, *Mystus atrifasciatus*, *M. gulio*, *M. bocourti*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus* และ *M. wolffi*

20. แบ่งกลุ่มตามลักษณะของความยาวลำไส้ (intestine) ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 48) คือ

20.1 กลุ่มมีลำไส้สั้น

- ลำไส้ยาวไม่เกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร (ภาพที่ 48.1) คือ

Batasio blythi, *Leiocassis stenomus*, *Hemibagrus mekongensis* n.sp., *H. filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *Mystus rhegma*, *M. atrifasciatus*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus* และ *M. wolffi*

20.2 กลุ่มมีลำไส้ยาว

- ลำไส้ยาวเกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร (ภาพที่ 48.2) คือ *Sperata*

acicularis, *Bagrichthys macracanthus*, *B. macropterus*, *Leiocassis siamensis*, *Mystus bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio* และ *M. singaringan*

21. แบ่งกลุ่มตามลักษณะรูปร่างของไตส่วนหลัง (trunk kidney) ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 49) คือ

21.1 กลุ่มมีไตรูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยม

- ไตรูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยม (ภาพที่ 49.1) คือ *Batasio blythi*, *Mystus*

gulio และ *M. wolffi*

21.2 กลุ่มมีไตรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย (Y)

- ไตรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย (ภาพที่ 49.2) คือ *Bagrichthys macropterus*,

Mystus singaringan, *M. multiradiatus*, *M. micracanthus*, *M. bocourti*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *Hemibagrus wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *H. filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *Leiocassis stenomus*, *L. siamensis*, *Bagrichthys macracanthus*, *Mystus atrifasciatus*, *M. cavasius* และ *Sperata acicularis*

22. แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระเพาะลม (air bladder) ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 50) คือ

22.1 กลุ่มไม่มีลายเส้นกระจายบริเวณผิวของกระเพาะลม

- กระเพาะลมไม่มีลายเส้นบริเวณผิว ตอนกลางมีรูปร่างคล้ายอักษรตัวที

(T) (ภาพที่ 50.1) คือ *Bagrichthys macropterus*, *Batasio blythi*, *Leiocassis stenomus* และ *L. siamensis*















22.2 กลุ่มมีลายเส้นกระจายทั่วบริเวณผิวของกระเพาะลม

- กระเพาะลมมีลายเส้นกระจายทั่วบริเวณผิว (ภาพที่ 50.2) คือ *Bagrichthys*

macracanthus, *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi* and *Speratu acicularis*

ภาพที่ 7 แบ่งกลุ่มตามลักษณะรูปร่างของส่วนหัว

- 7.1 หัวแบนลงมาก ยาวคล้ายใบพาย คือ a. *Sperata acicularis*
- 7.2 หัวแบนลงตลอดแนวของหัวและกว้างค่อนข้างมากหรือปานกลาง คือ
b. *Hemibagrus microphthalmus*, c. *H. wycki*, d. *H. mekongensis* n.sp.,
e. *H. nemurus*, f. *H. filamentus* และ g. *H. elegans* n.sp.
- 7.3 หัวแบนลงเล็กน้อย โดยเฉพาะบริเวณตอนหน้าของส่วนหัว คือ h. *Leiocassis poecilopterus*, i. *L. stenomus*, j. *L. siamensis*, k. *Mystus gulio*, l. *M. mysticetus*,
m. *M. multiradiatus*, และ n. *Rita sacerdotum*
- 7.4 หัวแบนข้าง คือ o. *Bagrichthys macracanthus*, p. *B. macropterus*, q. *Batasio blythi*, r. *Leiocassis micropogon*, s. *Mystus atrifasciatus*, t. *M. rhegma*, u. *M. wolffi*,
v. *M. micracanthus*, w. *M. bocourti*, x. *M. cavasius* และ y. *M. singaringan*



ภาพที่ 8 แบ่งกลุ่มตามขนาดและรูปร่างของปาก

8.1 ปากรูปร่างคล้ายวงรีขนาดเล็กตามขนาดของปลายจะงอยปาก คือ

a. *Bagrichthys macropterus* และ b. *B. macracanthus*

8.2 ปากรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว มีขนาดใหญ่ตามขนาดของปลายจะงอยปาก

คือ c. *Batasio blythi*, d. *Hemibagrus filamentus*, e. *H. microphthalmus*,

f. *H. nemurus*, g. *H. wycki*, h. *H. mekongensis* n.sp., i. *H. elegans* n.sp., j. *Leiocassis*

micropogon, k. *L. poecilopterus*, l. *L. siamensis*, m. *L. stenomus*, n. *Mystus*


atrifasciatus, o. *M. bocourti*, p. *M. cavasius*, q. *M. gulio*, r. *M. micracanthus*,

s. *M. multiradiatus*, t. *M. mysticetus*, u. *M. rhegma*, v. *M. singaringan*,

w. *M. wolffi*, x. *Sperata acicularis* และ y. *Rita sacerdotum*



a



b




c



d



e



f



g




h



i



j



k




l



m



n



o



p



q



r



s



t



u




v



w



x























y

ภาพที่ 9 แบ่งกลุ่มตามลักษณะการมีหรือไม่มีผิวหนังปกคลุมแผ่นกระดูกบริเวณตอนบน
ส่วนท้ายของหัว

9.1 ส่วนท้ายของหัวไม่มีผิวหนังปกคลุม คือ a. *Rita sacerdotum*

9.2 ส่วนท้ายของหัวมีผิวหนังปกคลุม คือ b. *Bagrichthys macropterus*,
c. *B. macracanthus*, d. *Batasio blythi*, e. *Leiocassis micropogon*, f. *L. poecilopterus*,
g. *L. stenomus*, h. *L. siamensis*, i. *Hemibagrus filamentus*, j. *H. microphthalmus*,
k. *H. nemurus*, l. *H. wycki*, m. *H. mekongensis* n.sp., n. *H. elegans* n.sp., o. *Mystus*
atrifasciatus, p. *M. bocourti*, q. *M. cavasius*, r. *M. gulio*, s. *M. micracanthus*,
t. *M. multiradiatus*, u. *M. mysticetus*, v. *M. rhegma*, w. *M. singaringan*, x. *M. wolffi*
และ y. *Sperata acicularis*














ภาพที่ 10 แบ่งกลุ่มตามลักษณะการซ้อนหรือไม่ซ้อนทับกันของเขี้ยวแผ่นกระดูก
ปิดคอดคอ

10.1 แผ่นกระดูกปิดคอดคอไม่ซ้อนทับกัน คือ

a. *Bagrichthys macropterus*, b. *B. macracanthus* และ c. *Rita sacerdotum*

10.2 แผ่นกระดูกปิดคอดคอซ้อนทับกัน คือ

d. *Batasio blythi*, e. *Leiocassis micropogon*, f. *L. poecilopterus*, g. *L. stenomus*,
h. *L. siamensis*, i. *Hemibagrus filamentus*, j. *H. microphthalmus*, k. *H. nemurus*,
l. *H. wycki*, m. *H. mekongensis* n.sp., n. *H. elegans* n.sp., o. *Mystus atrifasciatus*,
p. *M. bocourti*, q. *M. cavasius*, r. *M. gulio*, s. *M. micracanthus*,
t. *M. multiradiatus*, u. *M. mysticetus*, v. *M. rhegma*, w. *M. singaringan*,
x. *M. wolffi* และ y. *Sperata acicularis*



ภาพที่ 11 แบ่งกลุ่มตามตำแหน่งของตา

11.1 กลุ่มสามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว

a. *Mystus mysticetus*

11.2 กลุ่มไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว

b. *Bagrichthys macropterus*, c. *B. macracanthus*, d. *Batasio blythi*,

e. *Leiocassis micropogon*, f. *L. poecilopterus*, g. *L. stenomus*, h. *L. siamensis*,


















i. *Hemibagrus filamentus*, j. *H. microphthalmus*, k. *H. nemurus*, l. *H. wycki*,

m. *H. mekongensis* n.sp., n. *H. elegans* n.sp., o. *Mystus atrifasciatus*,

p. *M. bocourti*, q. *M. cavasius*, r. *M. gulio*, s. *M. micracanthus*,

t. *M. multiradiatus*, u. *M. rhegma*, v. *M. singaringan*, w. *M. wolffi*,

x. *Rita sacerdotum* และ y. *Sperata acicularis*




ภาพที่ 12 แบ่งกลุ่มตามการมีหรือไม่มีรูรับความรู้สึกบริเวณหัว (sensory pore)












12.1 กลุ่มมีรูรับความรู้สึกบริเวณหัว

a. *Batasio blythi*, b. *Leiocassis poecilopterus* และ c. *L. stenomus*

12.2 กลุ่มไม่มีรูรับความรู้สึกบริเวณส่วนหัว

d. *Bagrichthys macracanthus*, e. *B. macropterus*, f. *Hemibagrus filamentus*,
g. *H. microphthalmus*, h. *H. nemurus*, i. *H. wycki*, j. *H. mekongensis* n.sp.,
k. *H. elegans* n.sp., l. *Leiocassis micropogon*, m. *L. siamensis*, n. *Mystus*
atrifasciatus, o. *M. bocourti*, p. *M. cavasius*, q. *M. gulio*, r. *M. micracanthus*,
s. *M. multiradiatus*, t. *M. mysticetus*, u. *M. rhegma*, v. *M. singaringan*,
w. *M. wolffi*, x. *Rita sacerdotum* และ y. *Sperata acicularis*







ภาพที่ 12 ต่อ

ภาพที่ 13 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของซี่กรองเหงือก (gill raker)


- 13.1 ซี่กรองเหงือกเป็นเส้นหนา สั้น คือ a. *Bagrichthys macracanthus*,
b. *B. macropterus*, c. *Batasio blythi*, และ d. *Mystus bocourti*
- 13.2 ซี่กรองเหงือกเป็นเส้นหนา ขาวปานกลาง คือ e. *Leiocassis poecilopterus*,
f. *L. siamensis*, g. *L. stenonius*, h. *Hemibagrus filamentus*, i. *H. nemurus*,
j. *H. microphthalmus*, k. *H. wycki*, l. *Sperata acicularis*, m. *H. mekongensis* n.sp.,
- 13.3 ซี่กรองเหงือกเป็นเส้นเรียวยาว มีจำนวน 15-45 อัน คือ n. *Leiocassis micropogon*, o. *Mystus atrifasciatus*, p. *M. cavasius*, q. *M. micracanthus*,
r. *M. rhegma*, s. *M. singaringan*, t. *M. wolffi*, u. *M. gulio* และ v. *Hemibagrus elegans* n.sp.
- 13.4 ซี่กรองเหงือกเป็นเส้นเรียวยาว มีจำนวน 51-85 อัน คือ w. *Mystus mysticetus*
และ x. *M. multiradiatus*




a




b




c




d




e




f




g




h




i




j




k




l




m




n




o




p




q




r




s




t




u




v




w



x



14.1



14.2

ภาพที่ 15 แบ่งกลุ่มตามจำนวนของหนวด

15.1 กลุ่มมีหนวดจำนวน 2 คู่ ได้แก่ หนวดบริเวณขากรรไกรบน (maxillary barbel) และ หนวดบริเวณขากรรไกรล่าง (mandibular barbel)

a. *Rita sacerdotum*

15.2 กลุ่มมีหนวดจำนวน 4 คู่ ได้แก่ หนวดบริเวณขากรรไกรบน, หนวดบริเวณจมูก (nasal barbel), หนวดบริเวณขากรรไกรล่างคู่นอก (outer mandibular barbel) และ หนวดบริเวณขากรรไกรล่างคู่ใน (inner mandibular barbel)

b. *Bagrichthys macropterus*, c. *B. macracanthus*, d. *Batasio blythi*,

e. *Leiocassis micropogon*, f. *L. poecilopterus*, g. *L. stenomus*, h. *L. siamensis*,


i. *Hemibagrus filamentus*, j. *H. microphthalmus*, k. *H. nemurus*, l. *H. wycki*,

m. *H. mekongensis* n.sp., n. *H. elegans* n.sp., o. *Mystus atrifasciatus*,


p. *M. bocourti*, q. *M. cavasius*, r. *M. gulio*, s. *M. micracanthus*,

t. *M. multiradiatus*, u. *M. mysticetus*, v. *M. rhegma*, w. *M. singaringan*,


x. *M. wolffi* และ y. *Sperata acicularis*




a




b




c




d




e




f




g




h









i



j





ภาพที่ 16 แบ่งกลุ่มตามความยาวของหนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel)

16.1 กลุ่มมีความยาวหนวดที่ขากรรไกรบนยาวไม่เกินตอนกลางของครีบอก

- a. *Bagrichthys macropterus*, b. *B. macracanthus*, c. *Batasio blythi*,
d. *Leiocassis micropogon*, e. *L. poecilopterus*, f. *L. stenomus*, g. *L. siamensis*
และ h. *Rita sacerdotum*

16.2 กลุ่มมีความยาวหนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงบริเวณตอนปลายของครีบอก

- i. *Hemibagrus wycki*

16.3 กลุ่มมีความยาวหนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงบริเวณครีบท้อง


- j. *Mystus gulio* และ k. *Sperata acicularis*

16.4 กลุ่มมีความยาวหนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงบริเวณครีบก้นหรือยาวเลย
เล็กน้อย


- l. *Hemibagrus filamentus*, m. *H. microphthalmus*, n. *H. nemurus*,
o. *H. mekongensis* n.sp., p. *H. elegans* n.sp., q. *Mystus atrifasciatus*,
r. *M. multiradiatus*, s. *M. mysticetus*, t. *M. rhegma* และ u. *M. wolffi*

16.5 กลุ่มมีความยาวหนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงบริเวณครีบท้อง


- v. *Mytus bocourti*, w. *M. cavasius*, x. *M. micracanthus*
และ y. *M. singaringan*




a




b




c




Mxb d




e




f




g













h








i



j





ภาพที่ 16 ต่อ

ภาพที่ 17 แบ่งกลุ่มตามความยาวหนวดบริเวณจมูก (nasal barbel)

17.1 กลุ่มมีหนวดบริเวณจมูกยาวไม่ถึงขอบด้านหน้าของตา

a. *Hemibagrus wycki* และ b. *Sperata acicularis*

17.2 กลุ่มมีหนวดบริเวณจมูกยาวถึงบริเวณขอบด้านหน้าของตา

c. *Batasio blythi*, d. *Hemibagrus filamentus*, e. *Leiocassis micropogon*
และ f. *H. microphthalmus*

17.3 กลุ่มมีหนวดบริเวณจมูกยาวถึงบริเวณขอบด้านหลังของตา


g. *Hemibagrus nemurus*, h. *H. mekongensis* n.sp., i. *H. elegans* n.sp., j. *Mystus gulio* และ k. *Bagrichthys macracanthus*

17.4 กลุ่มมีหนวดบริเวณจมูกยาวถึงบริเวณส่วนท้ายของหัว


l. *Bagrichthys macropterus*, m. *Leiocassis poecilopterus*, n. *L. siamensis*,
o. *L. stenomus*, p. *Mystus atrifasciatus*, q. *M. bocourti*, r. *M. cavausius*,
s. *M. micracanthus*, t. *M. multiradiatus*, u. *M. rhegma*
และ v. *M. singaringan*

17.5 กลุ่มมีหนวดบริเวณจมูกยาวเกือบถึงบริเวณฐานกรีบหลัง


w. *Mystus mysticetus* และ x. *M. wolffi*




a




b




c




d




e




f




g




h




i




j




k




l




m




n




o




p




q




r




s




t




u



v



w



x

ภาพที่ 18 แบ่งกลุ่มตามความยาวหนวดคู่หน้าที่ขากรรไกรล่าง (outer mandibular barbel)

18.1 กลุ่มมีความยาวหนวดบริเวณขากรรไกรล่างคู่หน้ายาวไม่ถึงบริเวณคอคอคอ

a. *Rita sacerdotum* (มีหนวดบริเวณขากรรไกรล่างเพียง 1 คู่),

b. *Bagrichthys macracanthus*, c. *Batasio blythi*, d. *Bagrichthys macropterus*,

e. *Leiocassis micropogon* และ f. *L. siamensis*

18.2 กลุ่มมีความยาวหนวดบริเวณขากรรไกรล่างคู่หน้ายาวถึงบริเวณโคนครีบอก

g. *Sperata acicularis*, h. *Leiocassis stenomus*, i. *L. poecilopterus*,


j. *Hemibagrus microphthalmus*, k. *H. wycki*, l. *H. mekongensis* n.sp.,

m. *Mystus cavasius*, n. *Hemibagrus nemurus*, o. *H. elegans* n.sp., p. *H. filamentus*,


q. *Mystus bocourti*, r. *M. singaringan*, s. *M. micracanthus*, t. *M. multiradiatus*

u. *Mystus gulio*, v. *M. atrifasciatus*, w. *M. rhegma*, x. *Mystus wolffi* และ


y. *M. mysticetus*




a




b




c



d




e




Omb


f




g












h









i



j





ภาพที่ 19 แบ่งกลุ่มตามความยาวหนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่าง (inner mandibular barbel)

19.1 กลุ่มมีความยาวหนวดบริเวณขากรรไกรล่างคู่ในยาวไม่ถึงบริเวณกึ่งกลางหัว


- a. *Rita sacerdotum* (มีหนวดบริเวณขากรรไกรล่างเพียง 1 คู่),
- b. *Bagrichthys macracanthus*, c. *B. macropterus*, d. *Batasio blythi*,
- e. *Leiocassis micropogon*, f. *L. siamensis* และ g. *Hemibagrus wycki*

19.2 กลุ่มมีความยาวหนวดบริเวณขากรรไกรล่างคู่ในยาวถึงบริเวณคอคอด


- h. *Sperata acicularis*, i. *Hemibagrus microphthalmus*, j. *H. nemurus*,
- k. *H. mekongensis* n.sp., l. *H. elegans* n.sp., m. *Mystus bocourti*,
- n. *Leiocassis poecilopterus*, o. *L. stenomus*, p. *Mystus cavasius*,
- q. *M. micracanthus* และ r. *Hemibagrus filamentus*

19.3 กลุ่มมีความยาวหนวดบริเวณขากรรไกรล่างคู่ในยาวถึงบริเวณส่วนต้นของกรีบอก


- s. *M. gulio*, t. *M. atrifasciatus*, u. *M. multiradiatus*, v. *M. mysticetus*,
- w. *M. rhegma*, x. *M. singaringan* และ y. *M. wolffi*




a




b




c



d




e




f


Imb




g




h




i




j




k




l




m




n




o




p









q



r



s



ภาพที่ 20 แบ่งกลุ่มตามลักษณะขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลัง (dorsal spine)

20.1 กลุ่มมีขอบด้านหลังเรียบ

a. *Hemibagrus microphthalmus*

20.2 กลุ่มมีขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จักซี่ขึ้น

b. *Bagrichthys macracanthus* และ c. *B. macropterus*

20.3 กลุ่มมีขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จักซี่ลง

d. *Batasio blythi*, e. *Leiocassis micropogon*, f. *L. poecilopterus*, g. *L. siamensis*,

h. *L. stenomus*, i. *Hemibagrus filamentus*, j. *H. nemurus*, k. *H. wycki*,

l. *H. mekongensis* n.sp., m. *H. elegans* n.sp., n. *Mystus atrifasciatus*,


o. *M. bocourti*, p. *M. cavasius*, q. *M. gulio*, r. *M. micracanthus*,

s. *M. multiradiatus*, t. *M. mysticetus*, u. *M. rhegma*, v. *M. singaringan*,

w. *M. wolffi*, x. *Rita sacerdotum* และ y. *Sperata acicularis*



a



b




c




d




e




f



g



h



i




j




k



l



m



n



o



p




q




r




s



t



u




v



w



x



y


ภาพที่ 21 แบ่งกลุ่มตามลักษณะขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบหลัง

21.1 กลุ่มมีขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จัก

- a. *Mystus atrifasciatus*, b. *M. micracanthus*, c. *M. multiradiatus* และ
d. *M. mysticetus*

21.2 กลุ่มมีขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบหลังไม่เป็นซี่จัก

- e. *Bagrithys macracanthus*, f. *B. macropterus*, g. *Batasio blythi*,
h. *Hemibagrus filamentus*, i. *H. microphthalmus*, j. *H. nemurus*, k. *H. wycki*,
l. *H. mekongensis* n.sp., m. *H. elegans* n.sp., n. *Leiocassis micropogon*,
o. *L. poecilopterus*, p. *L. siamensis*, q. *L. stenomus*, r. *Mystus bocourti*,
s. *M. cavasius*, t. *M. gulio*, u. *M. rhegma*, v. *M. singaringan*,
w. *M. wycki*, x. *Rita sacerdotum* และ y. *Sperata acicularis*



ภาพที่ 22 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของซี่จึกบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอก

(pectoral spine)

22.1 กลุ่มมีซี่จึกขนาดใหญ่ ซี่จึกอันสุดท้ายที่อยู่ปลายสุดของก้านครีบแข็งมีขนาดใหญ่กว่าซี่อื่นๆ และมีลักษณะโค้งงอคล้ายตะขอ





















a. *Hemibagrus microphthalmus* และ b. *Mystus rhegma*

22.2 กลุ่มมีซี่จึกขนาดใหญ่ ซี่จึกมีความยาวไล่เลี่ยกัน และอันสุดท้ายไม่โค้งงอคล้ายตะขอ

c. *Leiocassis stenomus*, d. *L. poecilopterus*, e. *L. micropogon*, f. *Batasio blythi*, g. *Mystus gulio*, h. *M. micracanthus*, i. *Mystus wolffi* และ j. *Hemibagrus elegans* n.sp.

22.3 กลุ่มมีซี่จึกขนาดเล็ก มีความยาวซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดไล่เลี่ยกัน

k. *Mystus atrifasciatus*, l. *M. multiradiatus*, m. *M. cavasius*, n. *M. singaringan*, o. *M. bocourti*, p. *M. mysticetus*, q. *Leiocassis siamensis*, r. *Bagrichthys macracanthus*, s. *B. macropterus* และ t. *Hemibagrus wycki*, u. *Hemibagrus nemurus*, v. *H. mekongensis* n.sp., w. *H. filamentus*, x. *Sperata acicularis* และ y. *Rita sacerdotum*



ภาพที่ 23 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก humero-cubital process

23.1 กลุ่มมีฐานกระดูก humero-cubital process แคบ ความยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน

a. *Leiocassis stenomus*, b. *Batasio blythi*, c. *Mystus bocourti*, d. *M. cavasius* และ e. *M. rhegma*

23.2 กลุ่มมีฐานกระดูก humero-cubital process แคบ ความยาวเป็น 2-3 เท่าของความกว้างของฐาน


f. *Hemibagrus microphthalmus*, g. *Mystus gulio* และ h. *M. wolffi*

23.3 กลุ่มมีฐานกระดูก humero-cubital process กว้าง ความยาวน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างของฐาน

i. *Hemibagrus mekongensis* n.sp., j. *H. nemurus*, k. *H. wycki*, l. *H. filamentus*, m. *Sperata acicularis*, n. *Mystus multiradiatus*, o. *M. singaringan*, p. *M. micracanthus*, q. *M. mysticetus*, r. *M. atrifasciatus*, s. *Bagrichthys macracanthus*, t. *Leiocassis poecilopterus* และ u. *L. siamensis*

23.4 กลุ่มมีฐานกระดูก humero-cubital process กว้าง ความยาว 2 เท่า ของความกว้างของฐาน

v. *Bagrichthys macropterus*



ภาพที่ 24 แบ่งกลุ่มตามความยาวก้านครีบแข็งของครีบหลัง (dorsal spine)

24.1 กลุ่มมีก้านครีบแข็งของครีบหลังยาวมาก ยาวเกือบเท่ากับความยาวของลำตัว

(Body length)

a. *Mystus bocourti*

24.2 กลุ่มมีก้านครีบแข็งของครีบหลังยาว ยาวเกือบเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัว

(Body length)

b. *Bagrichthys macracanthus*

24.3 กลุ่มมีก้านครีบแข็งของครีบหลังสั้น ยาวไม่ถึง 1 ใน 4 ของความยาวลำตัว

(Body length)

c. *Bagrichthys macropterus*, d. *Batasio blythi*, e. *Leiocassis micropogon*,


f. *L. poecilopterus*, g. *L. stenomus*, h. *L. siamensis*, i. *Hemibagrus filamentus*,

j. *H. microphthalmus*, k. *H. nemurus*, l. *H. wycki*, m. *H. mekongensis* n.sp.,


n. *H. elegans* n.sp., o. *Mystus atrifasciatus*, p. *M. cavasius*, q. *M. gulio*,

r. *M. micracanthus*, s. *M. multiradiatus*, t. *M. mysticetus*, u. *M. rhegma*,


v. *M. singaringan*, w. *M. wolffi*, x. *Rita sacerdotum* และ y. *Sperata acicularis*




a




b




c




d




e




f




g




h




i




j







t




u




v



w



x



y

ภาพที่ 25 แบ่งกลุ่มตามความยาวฐานของครีบไขมัน (adipose fin)

25.1 กลุ่มมีฐานครีบไขมันยาว ยาวเกินครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัว (Body length)


- a. *Bagrichthys macracanthus*, b. *B. macropterus*, c. *Mystus cavasius*,
d. *M. bocourti* และ e. *M. singaringan*


25.2 กลุ่มมีฐานครีบไขมันยาว ยาวเกือบถึงครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัว (Body length)

- f. *Batasio blythi*, g. *Hemibagrus wycki*, h. *H. elegans* n.sp., i. *Mystus atrifasciatus*,
j. *M. micracanthus*, k. *M. multiradiatus*, l. *M. rhegma* และ m. *Sperata acicularis*


25.3 กลุ่มมีฐานครีบไขมันสั้น ยาวไม่ถึง 1 ใน 4 ของความยาวลำตัว (Body length)

- n. *Hemibagrus filamentus*, o. *H. microphthalmus*, p. *H. nemurus*, q. *H. elegans*
n.sp., r. *Leiocassis micropogon*, s. *L. poecilopterus*, t. *L. siamensis*, u. *L. stenomus*,
v. *Mystus gulio*, w. *M. mysticetus*, x. *M. wolffi* และ y. *Rita sacerdotum*







j




k




l




m




n




o




p




q




r




s




t




u




v



w



x



y

ภาพที่ 26 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของสีบริเวณลำตัว (color pattern)

26.1 บริเวณลำตัวมีแถบสีเข้มหรือสีดำพาดขวาง คือ

a. *Bagrichthys macropterus*, b. *Bagrichthys macracanthus*, c. *Batasio blythi*.

d. *Leiocassis micropogon*, e. *L. poecilopterus*, f. *L. siamensis* และ g. *L. stenomus*

26.2 บริเวณลำตัวมีแถบสีเข้มหรือสีดำพาดในแนวตามยาวสามแถบ คือ

h. *Mystus atrifasciatus*, i. *M. mysticetus*, j. *M. multiradiatus*, k. *M. rhegma* และ

l. *M. bocourti* (สำหรับ *M. bocourti* พบมีตัวอย่างบางตัวไม่ปรากฏแถบสีดังกล่าว)

26.3 บริเวณลำตัวมีจุดเรียงตัวเป็นแถบขวาง คือ m. *Hemibagrus elegans* n.sp.

26.4 บริเวณจุดเริ่มต้นของฐานครีบหลังมีจุดสีดำขนาดใหญ่ คือ n. *Mystus cavasius*


26.5 บริเวณฐานครีบหางมีจุดสีดำขนาดใหญ่ คือ o. *M. micracanthus*

26.6 บริเวณลำตัวไม่มีจุดขนาดใหญ่หรือแถบ คือ p. *Hemibagrus filamentus*,


q. *H. microphthalmus*, r. *H. nemurus*, s. *H. wycki*, t. *H. mekongensis* n.sp.,

u. *Mystus gulio*, v. *M. singaringan*, w. *M. wolffi*, x. *Rita sacerotum* และ


y. *Sperata acicularis*




a




b




c




d




e




f




g




h




i




j




k




l




m




n




o




p



q




r




s


ภาพที่ 26 ต่อ




t




u




v



w



x



y

ภาพที่ 26 ต่อ


ภาพที่ 27 แบ่งกลุ่มตามการมีหรือไม่มีจุดหรือแถบขวางสีดำบริเวณครีบหาง

27.1 กลุ่มมีจุดหรือแถบสีดำบริเวณครีบหาง


a. *Leiocassis micropogon*, b. *L. poecilopterus* และ c. *L. siamensis*

27.2 กลุ่มไม่มีจุดหรือแถบสีดำพาดขวางบริเวณครีบหาง


d. *Bagrichthys macropterus*, e. *B. macracanthus*, f. *Batasio blythi*,
 g. *Leiocassis stenomus*, h. *Hemibagrus filamentus*, i. *H. microphthalmus*,
 j. *H. nemurus*, k. *H. wycki*, l. *H. mekongensis* n.sp., m. *H. elegans* n.sp.,
 n. *Sperata acicularis*, o. *Mystus atrifasciatus*, p. *M. bocourti*, q. *M. cavasius*,
 r. *M. gulio*, s. *M. micracanthus*, t. *M. multiradiatus*, u. *M. mysticetus*,
 v. *M. rhegma*, w. *M. singaringan*, x. *M. wolffi* และ y. *Rita sacerdotum*




a




b




c




d




e




f




g




h




i




j




k




l




m




n




o




p









q



r



s



ภาพที่ 27 ต่อ

ภาพที่ 28 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของปลายครีบหาง

28.1 กลุ่มมีปลายครีบหางแบนบนและล่างกลมมน


a. *Batasio blythi* และ b. *Leiocassis poecilopterus*

28.2 กลุ่มมีปลายครีบหางแบนบนแหลม ปลายแบนล่างค่อนข้างกลมมน


c. *Mystus gulio*, d. *M. micracanthus*, e. *M. atrifasciatus*, f. *M. multiradiatus*,
g. *M. mysticetus*, h. *M. wolffi*, i. *Hemibagrus filamentus*, j. *H. microphthalmus*,
k. *H. nemurus*, l. *H. mekongensis* n.sp. และ m. *H. elegans* n.sp.

28.3 กลุ่มมีปลายครีบหางแบนบนและล่างแหลม


n. *Hemibagrus wycki*, o. *Leiocassis micropogon*, p. *L. siamensis*, q. *L. stenomus*.
r. *Bagrichthys macropterus*, s. *L. macracanthus*, t. *Mystus cavausius*,
u. *M. bocourti*, v. *M. rhegma*, w. *M. singaringan*, x. *Rita sacerdotum*
และ y. *Sperata acicularis*




a




b




c




d




e




f




g




h




i



j






ภาพที่ 28 ต่อ


ภาพที่ 29 แบ่งกลุ่มตามรูปร่างด้านบนของกระดูก mesethmoid

- 29.1 กลุ่มมีกระดูก mesethmoid รูปร่างเป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ขาวไม่เกินปลายของกระดูก lateral ethmoid คือ
- a. *Bagrichthys macropterus*, b. *B. macracanthus*, c. *Batasio blythi*, d. *Leiocassis siamensis*, e. *L. stenomus*, f. *L. poecilopterus*, g. *Mystus bocourti*, h. *M. atrifasciatus*, i. *M. cavasius*, j. *M. gulio*, k. *M. micracanthus*, l. *M. multiradiatus*, m. *M. myticetus*, n. *M. rhegma*, o. *M. singaringan*, p. *M. wolffi* และ q. *Hemibagrus mekongensis* n.sp
- 29.2 กลุ่มมีกระดูก mesethmoid รูปร่างเป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ขาวเลยปลายของกระดูก lateral ethmoid คือ
- r. *Hemibagrus filamentus*, s. *H. microphthalmus*, t. *H. nemurus* และ u. *H. wycki*
- 29.3 กลุ่มมีกระดูก mesethmoid รูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยม กระดูก mesethmoid ขนาดใหญ่ ส่วนหน้าที่ยื่นออกทั้งสองข้างกว้างและสั้น ตอนท้ายขาวไม่เลยปลายของกระดูก lateral ethmoid คือ
- v. *Sperata acicularis*



ภาพที่ 30 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของร่องกึ่งกลางหัว (fontanelle)

- 30.1 กลุ่มมีร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้า (anterior fontanelle) แยกออกจากร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลัง (posterior fontanelle) ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเป็นร่องยาว ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังลดรูปเหลือเป็นเพียงแอ่งรูปวงรีขนาดเล็ก
- a. *Leiocassis poecilopterus* และ b. *L. stenomus*
- 30.2 กลุ่มมีร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเชื่อมติดต่อกับร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลัง ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเป็นร่องยาว ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังลดรูปเหลือเป็นเพียงร่องขนาดเล็ก
- c. *Mystus atrifasciatus*, d. *M. gulio*, e. *M. micracanthus*, f. *M. multiradiatus* และ g. *M. mysticetus*
- 30.3 กลุ่มมีร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเชื่อมติดต่อกับร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลัง ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าและร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องยาว
- h. *Bagrichthys macracanthus*, i. *B. macropterus*, j. *Batasio blythi*, k. *Leiocassis siamensis*, l. *Hemibagrus filamentus*, m. *H. nemurus*, n. *H. mekongensis* n.sp., o. *H. microphthalmus*, p. *H. wycki*, q. *Sperata acicularis*, r. *Mystus bocourti*, s. *M. cavasius*, t. *M. rhegma*, u. *M. singaringan* และ v. *M. wolffi*



ภาพที่ 31 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก supraoccipital process

31.1 กลุ่มมีกระดูก supraoccipital process สั้น ยาวไม่เกิน 2 เท่าของความกว้างฐาน
กระดูก

a. *Leiocassis poecilopterus*, b. *Hemibagrus wycki* และ c. *Leiocassis stenomus*

31.2 กลุ่มมีกระดูก supraoccipital process ยาว ยาวประมาณ 3 เท่าของความกว้างฐาน
กระดูก

d. *Sperata acicularis*, e. *Hemibagrus microphthalmus*, f. *H. filamentus*,

g. *Batasio blythi*, h. *Mystus rhegma*, i. *M. gulio*, j. *M. micracanthus*,

k. *M. multiradiatus*, l. *M. mysticetus*, m. *M. atrifasciatus* และ


n. *Leiocassis siamensis*

31.3 กลุ่มมีกระดูก supraoccipital process ยาว ยาวมากกว่า 4 เท่าของความกว้างฐาน

o. *Bagrichthys macropterus*, p. *B. macracanthus*, q. *Mystus bocourti*,

r. *M. cavasius*, s. *M. singaringan*, t. *M. wolffi*, u. *Hemibagrus nemurus* และ

v. *H. mekongensis* n.sp.



ภาพที่ 32 แบ่งกลุ่มจากลักษณะของขอบด้านนอกกระดูก lateral ethmoid

32.1 ขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid มี process ขนาดเล็ก 1 อัน คือ

a. *Hemibagrus wycki* และ b. *H. microphthalmus*

32.2 ขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid มี process ขนาดเล็ก 2 อัน คือ

c. *Leiocassis siamensis*

32.3 ขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process คือ

d. *Bagrichthys macracanthus*, e. *B. macropterus*, f. *Batasio blythi*, g. *Leiocassis*


poecilopterus, h. *L. stenomus*, i. *Hemibagrus filamentus*, j. *H. nemurus*,

k. *H. mekongensis* n.sp., l. *Sperata acicularis*, m. *Mystus atrifasciatus*,

n. *M. bocourti*, o. *M. cavasius*, p. *M. gulio*, q. *M. micracanthus*,

r. *M. multiradiatus*, s. *M. mysticetus*, t. *M. rhegma*, u. *M. singaringan*

และ v. *M. wolffi*



ภาพที่ 33 แบ่งกลุ่มจากลักษณะของการโค้งงอลงด้านล่างของขอบด้านนอกของกระดูก

lateral ethmoid

33.1 ขอบกระดูก lateral ethmoid มีขอบโค้งงอลงด้านล่าง คือ

a. *Mystus atrifasciatus* และ b. *M. wolffi*

33.2 กระดูก lateral ethmoid ไม่โค้งงอลงด้านล่าง คือ

c. *Bagrichthys macracanthus*, d. *B. macropterus*, e. *Batasio blythi*, f. *Leiocassis*


siamensis, g. *L. stenomus*, h. *L. poecilopterus*, i. *Hemibagrus filamentus*,

j. *H. microphthalmus*, k. *H. nemurus*, l. *H. wycki*, m. *H. mekongensis* n.sp.,

n. *Sperata acicularis*, o. *Mystus bocourti*, p. *M. cavasius*, q. *M. gulio*,

r. *M. micracanthus*, s. *M. multiradiatus*, t. *M. mysticetus*, u. *M. rhegma* และ

v. *M. singaringan*



ภาพที่ 34 แบ่งกลุ่มตามขนาดของแถบฟัน vomerine teeth

34.1 แถบฟัน vomerine teeth แคบและสั้น คือ

a. *Bagrichthys macropterus* และ b. *B. macracanthus*

34.2 แถบฟัน vomerine teeth สั้นกว้าง คือ

c. *Leiocassis siamensis* และ d. *Batasio blythi*

34.3 แถบฟัน vomerine teeth แคบและโค้งยาวปานกลาง คือ

e. *Leiocassis poecilopterus*, f. *L. stenomus*, g. *Mystus atrifasciatus*,

h. *M. bocourti*, i. *M. cavasius*, j. *M. gulio*, k. *M. micracanthus*,


l. *M. multiradiatus*, m. *M. mysticetus*, n. *M. rhegma*, o. *M. singaringan*

และ p. *M. wolffi*

34.4 แถบฟัน vomerine teeth กว้างและโค้งยาว คือ

q. *Hemibagrus filamentus*, r. *H. microphthalmus*, s. *H. nemurus*, t. *H. wycki*,

u. *H. mekongensis* n.sp. และ v. *Sperata acicularis*



ภาพที่ 35 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของแถบฟัน mandibular teeth

35.1 แถบฟัน mandibular teeth สั้น รูปร่างคล้ายกระสวย คือ

a. *Bagrichthys macracanthus*, b. *Batasio blythi* และ c. *Leiocassis siamensis*

35.2 แถบฟัน mandibular teeth โกงยาว คือ

d. *Hemibagrus filamentus*, e. *H. microphthalmus*, f. *H. nemurus*, g. *H. wycki*,

h. *H. mekongensis* n.sp., i. *Leiocassis poecilopterus*, j. *L. stenomus*,

k. *Mystus atrifasciatus*, l. *M. bocourti*, m. *M. cavasius*, n. *M. gulio*,

o. *M. micracanthus*, p. *M. multiradiatus*, q. *M. mysticetus*, r. *M. rhegma*,

s. *M. singaringan*, t. *M. wolffi* และ u. *Sperata acicularis*

35.3 กลุ่มไม่มีฟัน mandibular teeth คือ

v. *Bagrichthys macropterus*



ภาพที่ 36 แบ่งกลุ่มตามขนาดของกระดูก maxilla

36.1 กระดูก maxilla เล็กและสั้น คือ

a. *Bagrichthys macracanthus*, b. *B. macropterus*, c. *Batasio blythi*, d. *Leiocassis poecilopterus*, e. *L. siamensis* และ f. *L. stenomus*

36.2 กระดูก maxilla ยาว คือ


g. *Hemibagrus filamentus*, h. *H. microphthalmus*, i. *H. nemurus*, j. *H. wycki*,
k. *H. mekongensis* n.sp., l. *Mystus atrifasciatus*, m. *M. bocourti*, n. *M. cavasius*,
o. *M. gulio*, p. *M. micracanthus*, q. *M. multiradiatus*, r. *M. mysticetus*,
s. *M. rhegma*, t. *M. singaringan*, u. *M. wolffi* และ v. *Sperata acicularis*



a




b



c



d



e



f



g



h



i



j



k




l



m



n



o



p



q



r



s



t



u



v

ภาพที่ 37 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก nasal

37.1 กลุ่มมีกระดูก nasal สั้น ไม่แผ่ขยายออก

a. *Batasio blythi*, b. *Leiocassis poecilopterus* และ c. *L. stenomus*

37.2 กลุ่มมีกระดูก nasal สั้น ส่วนคั่นแผ่ขยายออก

d. *Leiocassis siamensis*

37.3 กลุ่มมีกระดูก nasal ยาว

e. *Bagrichthys macracanthus*, f. *B. macropterus*, g. *Hemibagrus filamentus*,

h. *H. microphthalmus*, i. *H. nemurus*, j. *H. wycki*, k. *H. mekongensis* n.sp.,

l. *Mystus atrifasciatus*, m. *M. bocourti*, n. *M. cavasius*, o. *M. gulio*,

p. *M. micracanthus*, q. *M. multiradiatus*, r. *M. mysticetus*, s. *M. rhegma*,

t. *M. singaringan*, u. *M. wolffi* และ v. *Sperata acicularis*



a



b



c



d



e




f



g




h



i




j



k



l




m



n



o



p



q




r




s



t




u



v

ภาพที่ 38 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก lacrymal และ infraorbital

- 38.1 กลุ่มที่กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้น และมีปลายเรียวแหลม
กระดูก infraorbital ชั้นที่ 2 และ 5 ยาวกว่าที่ 1, 3 และ 4 คือ
a. *Hemibagrus filamentus*, b. *H. microphthalmus*, c. *H. nemurus*, d. *H. wycki*
และ e. *H. mekongensis* n.sp.
- 38.2 กลุ่มที่กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้น และมีปลายเรียวแหลม
กระดูก infraorbital ชั้นที่ 1 และ 5 ยาวกว่าชั้นอื่นๆ คือ
f. *Sperata acicularis*
- 38.3 กลุ่มที่กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้น และมีปลายเรียวแหลม
กระดูก infraorbital ทุกชั้นมีความยาวใกล้เคียงกัน คือ
g. *Bagrichthys macracanthus*, h. *B. macropterus*, i. *Batasio blythi*, j. *Leiocassis poecilopterus*, k. *L. stenomus* และ l. *L. siamensis*
- 38.4 กลุ่มที่กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process ค่อนข้างยาว และมีปลายแหลม
กระดูก infraorbital ทุกชั้นมีความยาวใกล้เคียงกัน คือ
m. *Mystus atrifasciatus*, n. *M. bocourti*, o. *M. cavasius*, p. *M. gulio*,
q. *M. micracanthus*, r. *M. multiradiatus*, s. *M. mysticetus*, t. *M. singaringan*
และ u. *M. rhegma*
- 38.5 กลุ่มที่กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process ค่อนข้างยาว และมีปลายแหลม
กระดูก infraorbital ชั้นที่ 2 ยาวกว่าชั้นอื่นๆ มาก คือ
v. *Mystus wolffi*



ภาพที่ 39 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก metapterygoid

39.1 กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนกว้างเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และ hyomandibular คือ


- a. *Hemibagrus filamentus*, b. *H. micracanthus*, c. *H. nemurus*, d. *H. wycki*,
e. *H. mekongensis* n.sp., f. *Sperata acicularis*, g. *Bagrichthys macropterus*,
h. *B. macracanthus*, i. *Leiocassis siamensis*, j. *L. stenomus*, และ
k. *L. poecilopterus*

39.2 กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนกว้างเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate แต่ไม่ติดต่อกับกระดูก hyomandibular คือ

- l. *Batasio blythi*

39.3 กระดูก metapterygoid มีลักษณะเป็นแท่งคล้ายรูปทรงกระบอกและมีขนาดเล็กเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และแยกห่างจากกระดูก hyomandibular คือ

- m. *Mystus atrifasciatus*, n. *M. cavasius*, o. *M. bocourti*, p. *M. gulio*,
q. *M. micracanthus*, r. *M. multiradiatus*, s. *M. mysticetus*, t. *M. rhegma*,
u. *M. singaringan* และ v. *M. wolffi*



ภาพที่ 40 แบ่งตามลักษณะของกระดูก interopercle

40.1 กระดูก interopercle มีขนาดเล็ก คือ

a. *Bagrichthys macropterus*

40.2 กระดูก interopercle ขนาดใหญ่แบนและมีความกว้างใกล้เคียงกันทั้งขึ้น คือ

b. *Batasio blythi*

40.3 กระดูก interopercle ขนาดใหญ่แบนและกว้างกว่าทางตอนท้าย รูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยม คือ


c. *Bagrichthys macracanthus*, d. *Leiocassis siamensis*, e. *L. poecilopterus*,

f. *L. stenomus*, g. *Mystus atrifasciatus*, h. *M. bocourti*, i. *M. cavasius*, j. *M. gulio*,


k. *M. micracanthus*, l. *M. multiradiatus*, m. *M. mysticetus*, n. *M. rhegma*,

o. *M. singaringan*, p. *M. wolffi*, q. *Hemibagrus filamentus*, r. *H. microphthalmus*,


s. *H. nemurus*, t. *H. wycki*, u. *H. mekongensis* n.sp. และ v. *Sperata acicularis*




a



b




c



d




e




f




g




h




i



j




k




l



m




n




o



p



q




r




s



t



u



v


ภาพที่ 41 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก urohyal

41.1 กลุ่มมีส่วนท้ายของกระดูก urohyal ลักษณะเป็น process ยาว ยาวเป็น 2-2.5 เท่าของความกว้างของฐาน process คือ

a. *Sperata acicularis*, b. *Hemibagrus filamentus*, c. *H. microphthalmus*,
d. *H. nemurus*, e. *H. wycki* และ f. *H. mekongensis* n.sp.

41.2 กลุ่มมีส่วนท้ายของกระดูก urohyal ลักษณะเป็น process สั้น ยาวไม่ถึง 1 เท่าของความกว้างของฐาน process คือ

g. *Mystus gulio* h. *Batasio blythi*, i. *Leiocassis poecilopterus*, j. *L. siamensis*,
k. *L. stenomus*, , l. *Mystus atrifasciatus*, m. *M. bocourti*, n. *M. cavasius*,
o. *M. micracanthus*, p. *M. multiradiatus*, q. *M. mysticetus*, r. *M. rhegma*,
s. *M. singaringan* , t. *M. wolffi*, u. *Bagrichthys macracanthus* และ
v. *B. macropterus*



ภาพที่ 42 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก branchiostegal ray และชุดกระดูก hyal

42.1 กลุ่มมีกระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นยาวทั้งหมดทุกก้านกระดูก ceratohyal และ epihyal ขนาดเล็ก คือ


a. *Bagrichthys macropterus*

42.2 กลุ่มมีกระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้น ก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน กระดูก ceratohyal และ epihyal มีขนาดเล็ก ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal ไม่แผ่กว้าง คือ

b. *Batasio blythi*

42.3 กลุ่มมีกระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้น ก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แผ่กว้าง คือ

c. *Bagrichthys macracanthus*, d. *Hemibagrus filamentus*, e. *H. nemurus*,
f. *H. microphthalmus*, g. *H. wycki*, h. *H. mekongensis* n.sp., i. *Leiocassis poecilopterus*, j. *L. siamensis*, k. *L. stenomus*, l. *Mystus atrifasciatus*,
m. *M. bocourti*, n. *M. cavasius*, o. *M. gulio*, p. *M. micracanthus*,
q. *M. multiradiatus*, r. *M. mysticetus*, s. *M. rhegma*, t. *M. singaringan*,
u. *M. wolffi* และ v. *Sperata acicularis*



ภาพที่ 43 แบ่งกลุ่มกระดูก Weberian apparatus ตามลักษณะของกระดูก neural spine

43.1 กระดูก neural spine สั้น ยาวเท่ากับความกว้างของฐาน spine คือ

a. *Leiocassis stenomus*

43.2 กระดูก neural spine สั้น ยาวไม่ถึง 3 เท่าของความกว้างของฐาน spine คือ

b. *Leiocassis poecilopterus*, c. *Batasio blythi*, d. *Mystus atrifasciatus*,

e. *M. cavasius*, f. *M. gulio*, g. *M. micracanthus*, h. *M. multiradiatus* และ

i. *M. mysticetus*


43.3 กระดูก neural spine ยาว ยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน spine คือ

j. *Bagrichthys macracanthus*, k. *B. macropterus*, l. *Leiocassis siamensis*,

m. *Hemibagrus filamentus*, n. *H. microphthalmus*, o. *H. nemurus*, p. *H. wycki*,

q. *H. mekongensis* n.sp., r. *Sperata acicularis*, s. *Mystus bocourti*,


t. *M. singaringan*, u. *M. rhegma* และ v. *M. wolffi*




a




b




c



d




e




f




g




h




i




j




k




l




m




n




o




p




q




r



s



t



u



v

ภาพที่ 44 แบ่งกลุ่มกระดูก Weberian apparatus ตามลักษณะของกระดูก Müllerian process

44.1 กระดูก Müllerian process ลักษณะคล้ายแท่งทรงกระบอกสั้น มีปลายทู่ คือ

a. *Bagrichthys macropterus* และ b. *B. macracanthus*

44.2 กระดูก Müllerian process เรียวยาว มีปลายแหลม คือ

c. *Batasio blythi*, d. *Leiocassis poecilopterus*, e. *L. siamensis*, f. *L. stenomus*,


g. *Hemibagrus filamentus*, h. *H. microphthalmus*, i. *H. nemurus*, j. *H. wycki*,

k. *H. mekongensis* n.sp., l. *Sperata acicularis*, m. *Mystus atrifasciatus*,

n. *M. bocourti*, o. *M. cavasius*, p. *M. gulio*, q. *M. micracanthus*,

r. *M. multiradiatus*, s. *M. mysticetus*, t. *M. rhegma*, u. *M. singaringan* และ

v. *M. wolffi*




a




b



c




d




e




f




g




h



i




j




k




l




m




n




o




p




q




r




s



t



u



v

ภาพที่ 45 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก posttemporal

45.1 กลุ่มมีส่วนท้ายของกระดูก posttemporal ไม่เป็นแผ่นแบน คือ

a. *Leiocassis stenomus* และ b. *Bagrichthys macropterus*

45.2 กลุ่มมีส่วนท้ายของกระดูก posttemporal มีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ได้ process คือ

c. *Batasio blythi*, d. *Bagrichthys macracanthus*, e. *Leiocassis poecilopterus*,


f. *L. siamensis*, g. *Mystus atrifasciatus*, h. *M. bocourti*, i. *M. cavasius*, j. *M. gulio*,

k. *M. micracanthus*, l. *M. multiradiatus*, m. *M. mysticetus*, n. *M. rhegma*,

o. *M. singaringan*, p. *M. wolffi*, q. *Hemibagrus filamentus*, r. *H. nemurus*,

s. *H. microphthalmus*, t. *H. mekongensis* n.sp., u. *Sperata acicularis* และ

v. *Hemibagrus wycki*




ภาพที่ 46 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระดูก pelvic girdle

46.1 กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างมากที่ส่วนท้ายของ girdle และแผ่ไปถึงส่วนหน้า คือ


a. *Bagrichthys macracanthus*, b. *B. macropterus*, c. *Leiocassis poecilopterus*
และ d. *L. siamensis*

46.2 กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบน กว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle เท่านั้น คือ

c. *Leiocassis stenomus*, f. *Batasio blythi*, g. *Hemibagrus filamentus*,
h. *H. microphthalmus*, i. *H. nemurus*, j. *H. wycki*, k. *H. mekongensis* n.sp.,
l. *Sperata acicularis* m. *Mystus atrifasciatus*, n. *M. bocourti*, o. *M. cavasius*,
p. *M. micracanthus*, q. *M. gulio*, r. *M. multiradiatus*, s. *M. mysticetus*,
t. *M. rhegma*, u. *M. singaringan* และ v. *M. wolffi*



a




b



c



d




e




f




g




h




i



j




k




l




m



n



o




p



q



r




s



t



u



v


ภาพที่ 47 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระเพาะอาหาร (stomach)

47.1 กระเพาะอาหารรูปร่างคล้ายรูปทรงกระบอก คือ

a. *Sperata acicularis*

47.2 กระเพาะอาหารรูปร่างยาวรี หรือ กลมมน คือ

b. *Batasio blythi*, c. *Hemibagrus nemurus*, d. *H. wycki*, e. *Leiocassis siamensis*,
 f. *L. stenomus*, g. *Mystus cavasius*, h. *M. singaringan*, i. *M. micracanthus*,
 j. *M. rhegma*, k. *Bagrichthys macropterus*, l. *B. macracanthus*, m. *Hemibagrus*
filamentus, n. *H. mekongensis* n.sp., o. *H. microphthalmus*, p. *Mystus*
atrifasciatus, q. *M. gulio*, r. *M. bocourti*, s. *M. multiradiatus*, t. *M. mysticetus*
 และ u. *M. wolffi*




ภาพที่ 48 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของความยาวลำไส้ (intestine)

48.1 กลุ่มมีลำไส้ยาวไม่เกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร

- a. *Batasio blythi*, b. *Leiocassis stenomus*, c. *Hemibagrus mekongensis* n.sp.,
 d. *H. filamentus*, e. *H. microphthalmus*, f. *H. nemurus*, g. *H. wycki*, h. *Mystus rhegma*, i. *M. atrifasciatus*, j. *M. micracanthus*, k. *M. multiradiatus*,
 l. *M. mysticetus* และ m. *M. wolffi*

48.2 กลุ่มมีลำไส้ยาวเกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร

- n. *Sperata acicularis*, o. *Bagrichthys macracanthus*, p. *B. macropterus*,
 q. *L. siamensis*, r. *Mystus bocourti*, s. *M. cavauius*, t. *M. gulio* และ
 u. *M. singaringan*




ภาพที่ 49 แบ่งกลุ่มตามลักษณะรูปร่างของไตส่วนหลัง (trunk kidney)

49.1 ไตรูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยม คือ

a. *Batasio blythi*, b. *Mystus gulio* และ c. *M. wolffi*

49.2 ไตรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย คือ

- d. *Bagrichthys macropterus*, e. *Mystus singaringan*, f. *M. multiradiatus*,
- g. *M. micracanthus*, h. *M. bocourti*, i. *M. mysticetus*, j. *M. rhegma*,
- k. *Hemibagrus wycki*, l. *H. mekongensis* n.sp., m. *H. filamentus*,
- n. *H. microphthalmus*, o. *H. nemurus*, p. *Leiocassis stenomus*, q. *L. siamensis*,
- r. *Bagrichthys macracanthus*, s. *Mystus atrifasciatus*, t. *M. cavasius* และ
- u. *Sperata acicularis*



ภาพที่ 50 แบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระเพาะลม (air bladder)

49.1 กลุ่มไม่มีลายเส้นบริเวณผิวหนัง ตอนกลางมีร่องคล้ายอักษรตัวที (T)

(T) อยู่ตอนกลาง

a. *Bagrithys macropterus*, b. *Batasio blythi*, c. *Leiocassis stenomus*

และ d. *L. siamensis*

49.2 กลุ่มมีลายเส้นกระจายทั่วบริเวณผิวหนังของกระเพาะลม


e. *Bagrithys macracanthus*, f. *Hemibagrus filamentus*, g. *H. microphthalmus*,

h. *H. nemurus*, i. *H. wycki*, j. *H. mekongensis* n.sp., k. *Mystus atrifasciatus*,

l. *M. bocourti*, m. *M. cavasius*, n. *M. gulio*, o. *M. micracanthus*,

p. *M. multiradiatus*, q. *M. mysticetus*, r. *M. rhegma*, s. *M. singaringan*,

t. *M. wolffi* และ u. *Sperata acicularis*



อนุกรมวิธานของปลากดปลาแขยงวงศ์ Bagridae

ในการศึกษารั้ครั้งนี้ได้ใช้ระบบการจำแนกปลากดปลาแขยงวงศ์ Bagridae ตาม Nelson (1994) โดยไม่ได้แบ่งวงศ์ Bagridae ออกเป็นวงศ์ย่อย การจำแนกตั้งแต่ระดับ Subphylum ลงไปถึงระดับวงศ์ (family) มีดังนี้

Subphylum Vertebrata (Craniata)

Superclass Gnathostoma

Grade Teleostomi

Class Actinopterygii

Subclass Neopterygii

Division Teleostei

Subdivision Euteleostei

Superoder Ostariophysi

Order Siluriformes

Family Bagridae

ผลสรุปจากการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ โครงสร้างภายนอกและภายใน รวม ทั้งข้อมูลลักษณะวัดและนับ (measurement and meristic character) ที่ได้จากการศึกษาตัวอย่างปลา ไทยวงศ์ Bagridae สกุลและชนิดต่างๆ นำมาใช้ในการบรรยายลักษณะของวงศ์ กลุ่มวิเคราะห์สกุล และชนิด รวมทั้งย้อนบรรยายลักษณะของสกุลและชนิดได้ดังนี้

ลักษณะของปลากระดี่ปลาแขวงวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย

ปลากระดี่ปลาแขวงเป็นปลาไม่มีเกล็ด ชาวบ้านเรียกว่าปลาหนัง ปลาในวงศ์นี้มีลำตัวค่อนข้างยาว ส่วนใหญ่ลำตัวส่วนหน้าแบนลง ลำตัวส่วนหลังแบนข้าง (ยกเว้นในสกุล *Bagrichthys* และ *Batasio* มีลำตัวแบนข้าง) จะงอยปากแคบถึงกว้างมีรูปร่างคล้ายใบพายหรือรูปกรวย หนวดมี 4 คู่ ได้แก่ หนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel) หนวดบริเวณจมูก (nasal barbel) หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่าง (outer mandibular barbel) และหนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่าง (inner mandibular barbel) (ยกเว้นสกุล *Rita* มีหนวดเพียง 2 คู่ ได้แก่ หนวดที่ขากรรไกรบน 1 คู่ และหนวดที่กรรไกรล่าง 1 คู่) หนวดที่ขากรรไกรบนมีความยาวมากกว่าหนวดคู่อื่น รูจมูกมี 2 คู่ รูจมูกคู่หน้าอยู่บริเวณปลายจะงอยปาก รูจมูกคู่หลังอยู่ด้านหลังหนวดบริเวณจมูก มีแถบฟันที่ขากรรไกรบน (maxillary teeth) ขากรรไกรล่าง (mandibular teeth) และเพดานปาก (vomerine teeth) ฟันที่ขากรรไกรส่วนมากขนาดเล็ก (villiform) อาจจะมีหรือไม่มีผิวหุ้มคลุม ปลากระดี่ปลาแขวงมีครีบคู่ได้แก่ ครีบอก (pectoral fin) และครีบท้อง (pelvic fin) ครีบเดียวได้แก่ ครีบหลัง (dorsal fin) ครีบไขมัน (adipose fin) ครีบก้น (anal fin) และครีบหาง (caudal fin) ครีบอกและครีบหลังมีก้านครีบแข็ง ครีบอกและครีบท้องตั้งอยู่ในแนวระนาบ ครีบหางเว้าลึกมีลักษณะคล้ายรูปส้อม (forked) เยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอสันหรือไม่ซ้อนทับกัน ช่องเปิดเหงือก (gill opening) ยาวลงไปถึงส่วนบนของฐานครีบทู มีเส้นข้างตัวที่สมบูรณ์บริเวณแนวกลางลำตัว

กะโหลกศีรษะของปลาวงศ์นี้โดยทั่วไปค่อนข้างกว้าง (ยกเว้นในสกุล *Bagrichthys* และ *Batasio*) กระดูก mesethmoid รูปร่างเป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ความกว้างของกระดูกใกล้เคียงกัน หรือเป็นรูปสามเหลี่ยม ตอนหน้ามีส่วนที่ยื่นออกด้านข้างขนาดแตกต่างกัน ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้า (anterior fontanelle) แยกหรือไม่แยกออกจากร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลัง (posterior fontanelle) ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเป็นร่องยาว ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องยาวหรือเป็นร่องขนาดเล็ก กระดูก supraoccipital process สั้นหรือยาว ขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid มีหรือไม่มี process และโค้งหรือไม่โค้งลงด้านล่าง แถบฟัน vomerine teeth สั้นหรือยาว และ แถบหรือกว้าง แถบฟัน mandibular teeth รูปร่างคล้ายกระดูกหรือโค้งยาว (ยกเว้นใน *Bagrichthys macropterus* ไม่มีแถบฟันนี้) กระดูกซี่กรองเหงือกเป็นเส้นหนาหรือเรียวยาว กระดูก nasal สั้นหรือยาว กระดูก maxilla สั้นหรือยาว กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้นหรือยาวและมีปลายเรียวแหลม กระดูก infraorbital มี 5 ชิ้น ความยาวแตกต่างหรือใกล้เคียงกัน กระดูก metapterygoid รูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอกขนาดเล็ก หรือเป็นแผ่นแบนกว้าง กระดูก interopercle มีขนาดเล็กหรือ


ขนาดใหญ่ กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาวทั้งหมดทุกก้านหรือเป็นเส้นยาวเรียว ยกเว้น ก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน กระดูก urohyal เป็น process สั้นหรือยาว ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process มีหรือไม่มีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ได้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก Müllerian process รูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอก มีปลายทู่หรือ เรียวยาวมีปลายแหลม กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้างหรือแคบ ขอบด้านหลังก้าน ครีบแข็งของครีบอกเป็นซี่จึก ขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นหรือไม่เป็นซี่จึก ขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จึก หรือเรียบ กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบน กว้าง เฉพาะส่วนท้ายของ girdle หรือแผ่กว้างไปถึงส่วนหน้า กระเพาะอาหารมีรูปร่างคล้ายรูปทรงกระบอกหรือกลมมนหรือยาวรี ลำไส้สั้นหรือยาว กระเพาะลมมีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจและมีหรือไม่มีลายเส้นกระจายในบริเวณผิว ใต้ส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย (Y) หรือสามเหลี่ยม

คู่มือในการวิเคราะห์สกุลและชนิดของปลาวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย

จากผลของข้อมูลที่ได้จากการศึกษาลักษณะโครงสร้างภายนอกและทางกายวิภาคของกลุ่มปลาคดปลาแขยงที่พบในประเทศไทยสามารถคัดเลือกลักษณะเด่นมาใช้ในการจัดทำคู่มือวิเคราะห์สกุลและชนิดได้ดังนี้

คู่มือในการวิเคราะห์สกุล


- 1a. หนวดมี 2 คู่ ได้แก่ หนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel) 1 คู่ และ หนวดที่ขากรรไกรล่าง (mandibular barbel) 1 คู่ (1a); ครีบหลังมีก้านครีบที่แตกแขนง (branched ray) จำนวน 6 อัน; แผ่นกระดูกบนส่วนท้ายของหัวมีผิวขรุขระและไม่มีหนังปกคลุม



1a

..... Rita

- 1b. หนวดมี 4 คู่ ได้แก่ หนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel) 1 คู่, หนวดบริเวณจมูก (nasal barbel) 1 คู่ และ หนวดที่ขากรรไกรล่าง (mandibular barbel) 2 คู่ (1b); ครีบหลังมีก้านครีบที่แตกแขนง (branched ray) จำนวน 7 อัน; แผ่นกระดูกบนส่วนท้ายของหัวมีผิวค่อนข้างเรียบและมีหนังปกคลุม



1b


.....2

2a. ตามีผิวหนังคลุม บริเวณรอบแนวขอบตาไม่มีร่อง (2a).....3




2a

2b. ตาไม่มีผิวหนังคลุม บริเวณรอบแนวขอบตามีร่อง (2b).....5



2b

3a. ครีบไขมันมีฐานยาวเกินครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัว มีจุดเริ่มต้นต่อจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบหลัง (3a); กระดูก nasal มีลักษณะเป็นแท่งยาว (3a1)



3a



3a1

.....*Bagrichthys*

3b. ครีบไขมันมีฐานยาวไม่ถึงครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัว มีจุดเริ่มต้นไม่ติดต่อกับจุดสิ้นสุดของฐานครีบหลัง (3b); กระดูก nasal มีลักษณะเป็นท่อนสั้น (3b1)




3b



3b1


.....4

- 4a. ปลาครีบทองแดงและล่างกลมมน แขนหางไม่มีจุดหรือแถบสีดำพาดขวาง (4a); กระดูก metapterygoid เชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate แต่ไม่เชื่อมติดต่อกับกระดูก hyomandibular (4a1); กระดูก interopercle แบนและมีความกว้างใกล้เคียงกันทั้งชิ้น (4a2)




.....*Batasio*

- 4b. ปลาครีบทองแดงและล่างแหลม แขนหางทั้งบนและล่างมีจุดสีดำหรือไม่มี (4b) ถ้าปลา ครีบทองแดงและล่างกลมมน แขนหางทั้งบนและล่างมีแถบสีดำพาดขวาง ; กระดูก metapterygoid เชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และ hyomandibular (4b1); กระดูก interopercle แบนและกว้างกว่าทางตอนท้าย รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม (4b2)




.....*Leiocassis*

- 5a. แถบฟัน vomerine teeth แคบ (5a); กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นรูปร่างคล้ายแท่งทรง กระบอกเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate แต่ไม่ติดต่อกับกระดูก hyomandibular (5a1); ด้านหน้า ตอนล่างของกระดูก lacrymal มี process ค่อนข้างยาวและปลายแหลม (5a2); ส่วนท้ายของ กระดูก urohyal ลักษณะเป็น process สั้น (5a3)




.....*Mystus*

5b. แถบฟัน vomerine teeth กว้าง (5b); กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนกว้าง เชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และ hyomandibular (5b1); ด้านหน้าตอนล่างของกระดูก lacrymal มี process สั้น (5b2); ส่วนท้ายของกระดูก urohyal ลักษณะเป็น process ยาว (5b3)




.....6

6a. หัวแบนลงมาก ยาวมากคล้ายใบพาย ยาวเกิน 2 เท่าของความกว้างของหัวบริเวณท้ายทอย (6a); กระดูก mesethmoid มีรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยม (6a1); กระดูก infraorbital ชั้นที่ 1 ยาวกว่าชั้นที่ 2 (6a2)



.....*Sperata*

6b. หัวแบนลง ไม่ยาวคล้ายใบพาย ยาวไม่เกิน 1.5 เท่าของความกว้างของหัวบริเวณท้ายทอย (6b); กระดูก mesethmoid รูปร่างเป็นแผ่นกระดูกแคบๆ (6b1); กระดูก infraorbital ชั้นที่ 2 ยาวกว่าชั้นที่ 1 (6b2)



.....*Hemibagrus*


คู่มือจำแนกชนิดปลาสกุล *Bagrichthys*

1a. ความยาวก้านครีบแข็งของครีบหลัง $15.45 \pm 1.552\% \text{SL}$; ไม่มีแถบฟัน mandibular teeth


(1a); กระดูก ceratohyal และ epihyal ขนาดเล็ก; กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ทุกก้าน (1a1)



1a



1a1




.....*Bagrichthys macropterus*

1b. ความยาวก้านครีบแข็งของครีบหลัง $24.62 \pm 2.182\% \text{SL}$; มีแถบฟัน mandibular teeth


ขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายกระสวย (1b); กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้น ก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน (1b1)



1b




1b1



.....*Bagrichthys macracanthus*

คู่มือจำแนกชนิดปลาสกุล *Batasio*

ปลาในสกุล *Batasio* ที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยพบเพียงชนิดเดียว คือ *Batasio blythi*




.....*Batasio blythi*

คู่มือจำแนกชนิดปลาสกุล *Hemibagrus*


1a.ความยาวครีบก้น 19-35 %SL; ข้อกระดูกสันหลังมีจำนวน 49-53 อัน.....2

1b.ความยาวครีบก้น 11-17 %SL; ข้อกระดูกสันหลังมีจำนวน 42-45 อัน.....4

2a.ซีกรองเหงือกเป็นเส้นเรียวยาว (2a) มีจำนวน 17-24 อัน; บริเวณลำตัวมีจุดเรียงตัวเป็นแถบขวาง




2a



.....*Hemibagrus elegans* n.sp.


2b.ซีกรองเหงือกเป็นเส้นหนา (2b) มีจำนวน 9-15 อัน; บริเวณลำตัวไม่มีจุดขนาดใหญ่



2b


.....3

3a. บริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จิก (3a); หนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel) ยาวไม่ถึงครีบท้อง; กระดูก supraoccipital process สั้น ยาวไม่เกิน 2 เท่าของความกว้างฐาน (3a1)



.....*Hemibagrus wycki*

3b. บริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังเรียบ (3b); หนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel) ยาวเลยครีบท้อง; กระดูก supraoccipital process ยาวประมาณ 3 เท่าของความกว้างฐาน (3b1)




.....*Hemibagrus microphthalmus*

4a. เมื่อพับครีบล้างลงในแนวระนาบ จุดสิ้นสุดของปลายครีบล้างถึงบริเวณส่วนต้นของครีบอก (4a)




.....*Hemibagrus filamentus*

4b. เมื่อพับครีบล้างลงในแนวระนาบ จุดสิ้นสุดของปลายครีบล้างไม่ถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก (4b)




.....5

5a. จะงอยปากกว้าง ก่อนข้างกลมมน ร่องกึ่งกลางหัวกว้าง (5a); ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ขาวเลยปลายของกระดูก lateral ethmoid; ส่วนที่กว้างที่สุดของกระดูก lateral ethmoid กว้างเท่ากับกระดูก frontal (5a1)



.....*Hemibagrus nemurus*

- 5b. จงอยปากแคบ ค่อนข้างแหลม ร่องกึ่งกลางหัวแคบ (5b); ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวไม่เกินปลายของกระดูก lateral ethmoid ส่วนที่กว้างที่สุดของกระดูก lateral ethmoid กว้างน้อยกว่ากระดูก frontal (5b1)




.....*Hemibagrus mekongensis* n.sp.

คู่มือจำแนกชนิดปลาสกุล *Leiocassis*

- 1a. ส่วนหัวมีรูปร่างแบนข้าง โดยเฉพาะบริเวณจะงอยปาก ความกว้างของหัวบริเวณตา 46 - 50 % HL; ปลายของจะงอยปากเป็นมุมแหลมเมื่อมองจากด้านล่างของหัว (1a)



1a



.....*Leiocassis micropogon*


- 1b. ส่วนหัวมีรูปร่างแบนลงเล็กน้อย โดยเฉพาะบริเวณจะงอยปาก ความกว้างของหัวบริเวณตามากกว่า 52 %HL; ปลายของจะงอยปากมีลักษณะป้านไม่เป็นมุมแหลมเมื่อมองจากด้านล่างของหัว (1b)



1b


.....2

2a. แถบฟัน mandibular teeth สั้น รูปร่างคล้ายกระสวย (2a); ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าและส่วนหลังมีลักษณะเป็นร่องยาวเชื่อมติดต่อกัน; ขอบของกระดูก lateral ethmoid มี process 2 อัน กระดูก supraoccipital process ยาวประมาณ 3 เท่าของความกว้างของฐาน (2a1)





.....*Leiocassis siamensis*

2b. แถบฟัน mandibular teeth โค้งยาว (2b); ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าและส่วนหลังแยกห่างกัน ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเป็นร่องยาว ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังมีขนาดเล็กและเป็นแอ่งรูปวงรี ; ขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process; กระดูก supraoccipital process สั้น ยาวไม่เกิน 2 เท่าของความกว้างของฐาน (2b1)





- 3a. ปลาขี้ตังและล่างของครีบทองคีม; ซี่กรองเหงือกมีจำนวน 8-9 อัน; กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้าง ยาวน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างของฐาน (3a)



.....*Leiocassis poecilopterus*

- 3b. ปลาขี้ตังและล่างของครีบทองคีม; ซี่กรองเหงือกมีจำนวน 10-12 อัน; กระดูก humero-cubital process มีฐานแคบ ยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน (3b)




.....*Leiocassis stenomus*

คู่มือจำแนกชนิดปลาสกุล *Mystus*

1a. ความยาวฐานครีบอกไขมันเกิน 43 %SL2

1b. ความยาวฐานครีบอกไขมันไม่เกิน 38 %SL4

2a. ความยาวก้านครีบอกแข็งของครีบอกหลัง 53.76 ± 5.618 %SL




.....*Mystus bocourti*

2b. ความยาวก้านครีบอกแข็งของครีบอกหลังไม่เกิน 18 %mmSL.....3

3a. มีจุดสีดำบริเวณจุดเริ่มต้นของฐานครีบอกหลัง; ส่วนท้ายของกระดูก urohyal มีปลายค่อนข้างป้าน
ไม่เป็น process เด่นชัด (3a)



3a




.....*Mystus cavasius*

- 3b. ไม่มีจุดสีดำบริเวณจุดเริ่มต้นของฐานครีบหลัง; ส่วนท้ายของกระดูก urohyal มีปลายแหลม
ลักษณะเป็น process เค่นชัด (3b)



3b



.....*Mystus singaringan*


- 4a. ด้านข้างของลำตัวมีแถบสีเข้มหรือสีดำพาดในแนวตามยาวจำนวน 3 แถบ5

- 4b. ด้านข้างของลำตัวไม่มีแถบสี.....8


- 5a. ซีกกรองเหงือกมีจำนวน 51-85 อัน; มีจุดกลมสีดำขนาดเล็กล้อมรอบด้วยขอบสีจาง
(semiocellatus) บริเวณเหนือครีบอก6

- 5b. ซีกกรองเหงือกมีจำนวน 17-30 อัน; ไม่มีจุดบริเวณเหนือครีบอก7

- 6a. เห็นตาเมื่อมองจากด้านล่างของหัว (6a); ขอบด้านนอกของครีบก้นเว้าเข้า (concave)




6a




.....*Mystus mysticetus*

6b. ไม่เห็นตาเมื่อมองจากด้านล่างของหัว (6b); ขอบด้านบนนอกของครีบก้นโค้งนูน (convex)




6b



.....*Mystus multiradiatus*


7a. ซี่จักที่ปลายสุดของก้านครีบแข็งของครีบหลังโค้งยาวคล้ายตะขอ และมีขนาดใหญ่กว่าซี่อื่นๆ เล็กน้อย (7a); จุดสิ้นสุดของร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลัง (posterior fontanalle) อยู่บริเวณฐาน กระดูก supraoccipital process (7a1); ซี่กรองเหงือกมีจำนวน 17-21 อัน



7a




7a1




.....*Mystus rhegma*


7b. ซี่จักที่ปลายสุดของก้านครีบแข็งของครีบหลังไม่โค้งยาวคล้ายตะขอ และซี่จักทุกซี่ค่อนข้างสั้น (7b); จุดสิ้นสุดของร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลัง (posterior fontanalle) ไม่ถึงฐานกระดูก supraoccipital process (7b1); ซี่กรองเหงือกมีจำนวน 24-30 อัน



7b




7b1




.....*Mystus atrifasciatus*

- 8a. จุดสิ้นสุดของร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังถึงฐานกระดูก supraoccipital process (8a);
 ขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid โค้งงอลงด้านล่าง (8a1)




.....*Mystus wolffi*

- 8b. จุดสิ้นสุดของร่องกึ่งกลางหัวตอนหลังถึงบริเวณตอนกลางของหัว ห่างจากส่วนกระดูก supraoccipital process มาก (8b); ขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid ไม่โค้งงอลงด้านล่าง (8b1)




.....9

- 9a. ความยาวฐานครีบก้น 34.42 ± 1.643 %SL; บริเวณตอนหน้าของฐานครีบก้นหางมีแต้มสีดำ
 รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม; ขัอกระดูกสันหลังมีจำนวน 38-39 อัน



.....*Mystus micracanthus*

- 9b. ความยาวฐานครีบก้น $11.00 \pm 0.981 \%SL$; บริเวณตอนหน้าของฐานครีบก้นไม่มีแต้มสี;
ข้อกระดูกสันหลังมีจำนวน 35-36 อัน




.....*Mystus gulio*

คู่มือจำแนกชนิดปลาในสกุล *Rita*

สกุล *Rita* ที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยพบเพียงชนิดเดียว คือ

Rita acicularis




.....*Rita sacerdotum*

คู่มือจำแนกชนิดปลาในสกุล *Sperata*

สกุล *Sperata* ที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยพบเพียงชนิดเดียว คือ

Sperata acicularis



.....*Sperata acicularis*

สกุลปลาตุ้ม Genus *Bagrichthys* Bleeker, 1858

Bagrichthys Bleeker, 1858c : 130 (type species : *Bagrus hypselopterus* Bleeker, 1852, by monotypy)

Pseudobagrichthys Bleeker, 1862-63 : a, 49 (type species : *Bagroides macropterus* Bleeker, 1853, by original designation)


ลักษณะเด่นของสกุล

ปลาสกุลนี้มีลักษณะเด่นแตกต่างจากปลาในสกุล *Batasio* และ *Leiocassis* โดยครีบท้องมีฐานยาวเกินครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัวและมีจุดเริ่มต้นต่อจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบท้อง

ลักษณะทั่วไปของสกุล

ลำตัวยาวและแบนข้างมาก หัวมีขนาดเล็กและแบนข้าง ตามีขนาดเล็กและมีผิวหนังคลุมตา ปากมีขนาดเล็กตามขนาดของปลายจะงอยปาก หนวดที่ขากรรไกรบนสั้นยาวไม่ถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ขอบด้านหลังของก้านครีบท้องของครีบท้องเป็นซี่จึกซี่ขึ้น ครีบท้องมีฐานยาว เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอกไม่ซ้อนทับกัน กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนหน้ามีส่วนที่ยื่นออกด้านข้าง ขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเชื่อมติดต่อกับร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังและมีลักษณะเป็นร่องยาวโดยจุดสิ้นสุดของร่องกึ่งกลางหัวตอนหลังอยู่บริเวณเกือบถึงฐานของกระดูก supraoccipital process กระดูก supraoccipital process ยาว แฉกฟัน vomerine teeth แคบและสั้น มีหรือไม่มีแฉกฟัน mandibular teeth ซี่กรองเหงือกเป็นเส้นหนาและสั้น ขอบด้านหลังก้านครีบท้องของครีบอกเป็นซี่จึก กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้นและปลายเรียวแหลม กระดูก infraorbital ทุกชิ้นมีความยาวใกล้เคียงกัน กระดูก nasal ยาว กระดูก maxilla สั้น กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนกว้าง กระดูก interopercle มีขนาดเล็กหรือใหญ่ กระดูก branchiostegal ray มีลักษณะเป็นเส้นเรียวยาวทั้งหมดทุกก้าน หรือเป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal สั้น ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal ได้ process เป็นหรือไม่เป็นแผ่นแบน กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างมากที่ส่วนท้ายของ girdle และแผ่ไปถึงส่วนหน้า

กระเพาะอาหารมีรูปร่างกลมมน ถ้าได้ค่อนยาว กระเพาะลมมีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจและมีหรือไม่มี
ลายเส้นกระจายบริเวณผิว ใต้ส่วนหลังมีรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย (Y)



ภาพที่ 51 *Bagrichthys macracanthus* (Bleeker, 1854)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Bagrichthys macracanthus* (Bleeker, 1854) (ภาพผนวกที่ 11.1)

ชื่อท้องถิ่น (local name): แขนงหมู กคหมู ดูกมูกเกสูง ยางบอน

ชื่อสามัญ (common name): Black lancer catfish

Bagroides macracanthus Bleeker, 1854: 88 (type locality: Enim and Lamatang River, Sumatra)

Leiocassis macracanthus Burgess, 1989: 71

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 30 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 55.2-172.2 mm SL

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 0915 (1 ตัวอย่าง, 72.2 mm SL) แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ H.M Smith
5 มกราคม 2469

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 0916 (1ตัวอย่าง, 172.2 mm SL) แม่น้ำนครนายก ฅมยา แสง
สุวรรณ 12 มกราคม 2473; NIFI 2904 (6, 82.9-106.4) แม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ชาวลิต วิทยา
นนท์, date unknown; KUMF 6500 (6 , 55.2-77.2) แม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ชัยวุฒิ กรุดพันธ์
15 ตุลาคม 2539

ลุ่มน้ำแม่โขง NIFI 00474 (2 ตัวอย่าง, 100.8-115.8 mm SL) แม่น้ำมูล จ.อุบลราชธานี ปรีชา เรียร
เจริญ 11 มกราคม 2511; KUMF 00461 (2, 76.8-88.2) แม่น้ำโขง บ้านห้วยคอกไม้ อ.บึงกาฬ จ.
หนองคาย จรัสธาดา กรรณสูต 2 มีนาคม 2519; KUMF 6501 (12 , 132.8-137.8) อ.โขงเจียม จ.
อุบลราชธานี ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 16, 23 กรกฎาคม 2541

ลักษณะเด่นของชนิด

Bagrichthys macracanthus มีลักษณะคล้ายกับ *B. macropterus* แต่แตกต่างกันโดยปลาชนิดนี้มีก้านครีบแข็งของครีบหลังยาวกว่า (24.62 ± 2.182 vs. 15.45 ± 1.552 %SL) มีแถบฟัน mandibular teeth ขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายกระสวย กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้น ก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A. iii-iv / 9-12; C. 8/7; P.I 7-9; V.i5; BR 7-8; GR 10-12, VC 44-45

รูปร่างลำตัวแบนข้าง หัวมีรูปร่างแบนข้าง จะงอยปากกลมมน ปากรูปร่างคล้ายวงรี ขนาดเล็กตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณคอนบนของหัวมีผิวหนังปกคลุม เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอไม่ซ้อนทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตามีผิวหนังคลุม หนวดมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวไม่ถึงตอนกลางของครีบอก หนวดบริเวณจมูกยาวถึงขอบด้านหลังของตา หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวไม่ถึงบริเวณคอดคอ หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวไม่ถึงบริเวณกึ่งกลางหัว บริเวณส่วนหัวไม่มีรับรู้ความรู้สึก ซึ่งกรงเหงือกเป็นเส้นหนาและตัน ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังซี่ขึ้น ขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบหลังไม่เป็นซี่จึก ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกมีขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้าง ยาวน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาวจะงอยปาก $29.39 - 39.15$ (34.61 ± 2.321) %HL ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางตา $15.73 - 23.72$ (18.97 ± 2.147) %HL ระยะห่างระหว่างตา $26.29 - 36.32$ (30.65 ± 2.107) %HL ความลึกและความกว้างของหัวบริเวณตา $44.74 - 58.90$ (52.59 ± 3.192) และ $48.59 - 57.53$ (52.84 ± 2.821) %HL ความกว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process $9.74 - 16.67$ (12.64 ± 1.586) และ $27.27 - 44.07$ (36.58 ± 4.129) %HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ครีบหลัง ครีบท้อง รูทวาร ครีบไขมันและครีบกัน $14.69 - 19.94$ (17.60 ± 1.143), $29.61 - 33.84$ (31.48 ± 1.047), $38.54 - 43.75$ (41.65 ± 1.151), $47.40 - 53.12$ (50.44 ± 1.445), $40.88 - 44.50$ (42.73 ± 0.979) และ $53.78 - 62.19$ (58.56 ± 1.719) %SL ความยาวฐานครีบหลัง ครีบไขมัน และ ครีบกัน $11.43 - 17.85$ (12.72 ± 1.164), $44.96 - 56.58$ (47.43 ± 2.248) และ

10.30 – 14.97 (12.28 ± 1.056) %SL ความยาวก้านครีบทึ่มของครีบอกและครีบทึ่มหลัง 14.32 – 18.41 (16.55 ± 0.791) และ 20.75 – 30.90 (24.62 ± 2.182) %SL ความยาวคอดหาง 27.69 – 32.97 (29.25 ± 1.127) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบทึ่มขึ้น ถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบทึ่มหาง 9.98 – 13.81 (11.23 ± 0.823) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 52)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ขาว เกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าและร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องยาว กระดูก supraoccipital process ขาวมากกว่า 4 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และไม่โค้งลงส่วนล่าง แถบฟัน vomerine teeth แคบและสั้น แถบฟัน mandibular teeth สั้น รูปร่างคล้ายกระดูกสวาย กระดูก maxilla สั้น กระดูก nasal ขาว กระดูก infraorbital ทุกชิ้นมีความยาวใกล้เคียงกัน กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้น กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และ hyomandibular กระดูก interopercle ขนาดใหญ่และแบนกว้างกว่าทางตอนท้าย รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal ขาวไม่ถึง 1 เท่าของความกว้างของฐาน process กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนหน้าของ epihyal แผ่นกว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้น ก้านสุดท้ายและร่องสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal ใต้ process เป็นแผ่นแบน กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural spine ขาว ขาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอก และมีปลายทู่ กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างจากที่ส่วนท้ายของ girdle และแผ่ไปถึงส่วนหน้า กระเพาะอาหารรูปร่างกลมมน ลำไส้ยาวเกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร ไตส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย กระเพาะลมมีลายเส้นกระจายทั่วบริเวณผิว

ลักษณะของสี

สีโดยรวมของลำตัวมีสีดำ ยกเว้นบริเวณส่วนท้อง แนวด้านล่าง และ แถบขวางลำตัว มีสีขาว แถบขวางลำตัวแถบแรกมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณจุดสิ้นสุดของครีบทึ่มหลังพาดขวางลงมาถึงบริเวณแนวด้านหน้าของครีบทึ่ม แถบที่สองมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณตอนปลายของครีบทึ่มขึ้นพาด

ขวางลงมาในบริเวณคอดหาง หนวดทุกคู่มีสีขาว ครีบอก ครีบท้องและครีบท้องมีสีดำปนเทา ครีบก้นมีสีดำจางๆ ครีบท้องมีสีน้ำตาลอ่อน

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

Bagrichthys macracanthus มีการกระจายพันธุ์ในบริเวณเกาะสุมาตรา ชวา บอร์เนียว มาเลเซีย กัมพูชา และ ไทย (Roberts, 1989; Rainboth, 1996) ปลาชอบอาศัยอยู่ในแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำค่อนข้างขุ่น อาหารที่ปลากินได้แก่ พื้ก ครัสเตเชียน สัตว์หน้าดินขนาดเล็ก (Taki, 1978) และซากพืชที่ถูกพัดพามาด้วยน้ำ (Roberts, 1989) ในไทยพบเฉพาะที่ลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ภาพที่ 53) เครื่องมือประมงที่ใช้จับคือ เบ็ดราว และข่าย ในตลาดพบขายในรูปปลายสวยงามและปลาสด

ภาพที่ 52 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Bagrichthys*


macracanthus

52.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก


a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบลึง, d. กระดูก humero-cubital process


52.2 ลักษณะทางกายวิภาค

e. แนวด้านบนของกะโหลกศีรษะ, f. แนวด้านล่างของกะโหลกศีรษะ, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม



ภาพที่ 53 แผนที่การกระจายพันธุ์ของ *Bagrithys macracanthus* ที่พบในประเทศไทย





ภาพที่ 54 *Bagrichthys macropterus* (Bleeker, 1853)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Bagrichthys macropterus* (Bleeker, 1853) (ภาพผนวกที่ 11.2)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : กคหมู คูกมูล

ชื่อสามัญ (common name) : Black lancer catfish

Bagroides macropterus Bleeker, 1853 : 515 (type locality : Muara Kompeh, Sumatra)

Pseudobagrichthys macropterus Bleeker, 1862 : 50

Bagroides macropterus Günther, 1864 : 91

Bagroides macropterus Smith, 1945

Bagrichthys macropterus Jayaram, 1968 : 380

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 46 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 44.1-213.4 mm SL

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา NIFI 00472 (2 ตัวอย่าง, 78.1-86.3 mm SL) พวงคลองหนองหม้อ จ.อยุธยา มะลิศรีรุ่งโรจน์ 15 มีนาคม 2514; KUMF 6502 (12 , 178.8-213.4) ตลาดปทุมธานี ภาสกร แสนจันแดง 10 ตุลาคม 2540

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 0920 (1 ตัวอย่าง, 110.9 mm SL) แม่น้ำนครนายก สรวง บุญสัน ทบ 5 สิงหาคม 2472; KUMF 0917 (1, 134.1) แม่น้ำบางปะกงตอนบน H.M. Smith 4 มิถุนายน 2471; KUMF 0918 (1, 171.8) แม่น้ำนครนายก H.M. Smith 6 มิถุนายน 2471; NIFI 2905 (3, 65.3-80.8) แม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ชวลิต วิทยานนท์, date unknown; KUMF 6503 (6 , 44.1-76.2) แม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 15 กันยายน 2539

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 6504 (9 ตัวอย่าง, 115.2-197.3 mm SL) อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ภาสกร
แสนจันแดง 23 กรกฎาคม 2541; KUMF 6505 (11, 73.4-115.2) ตลาคริมมุต จ.อุบลราชธานี ภาสกร
แสนจันแดง 3 กันยายน 2540

ลักษณะเด่นของชนิด

ปลาชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับ *Bagrichthys macracanthus* แตกต่างโดยมีก้านครีบริบ
แข็งของครีบริบหลังสั้นกว่า (15.45 ± 1.552 vs. 24.62 ± 2.182 %SL) ไม่มีแถบฟัน mandibular teeth
กระดูก ceratohyal และ epihyal ขนาดเล็ก กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.ii-iv / 9-11; C.8/7; P.I 8-9; V.i5; BR.7; GR7-10; VC43-44

รูปร่างลำตัวแบนข้าง หัวมีรูปร่างแบนข้าง จะงอยปากกลมมน ปากรูปร่างคล้ายวง
รีขนาดเล็กตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัวมีผิวหนังปกคลุม เชื้อหุ้มแผ่น
กระดูกปิดคอดคอไม่ซ้อนทับกัน ไม่สามารถมองไม่เห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตามีผิวหนังคลุม
หนวคมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวไม่ถึงตอนกลางของครีบริบออก หนวดบริเวณจมูกยาวถึงขอบ
ด้านหลังของตา หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวไม่ถึงบริเวณคอดคอ หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่าง
ยาวไม่ถึงบริเวณกึ่งกลางหัว บริเวณส่วนหัวไม่มีรูรับความรู้สึก ซึ่งกรงเหงือกเป็นเส้นหนาและสั้น
ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบริบแข็งของครีบริบหลังซี่ขึ้น ขอบด้านหน้าก้านครีบริบแข็งของครีบริบหลัง
ไม่เป็นซี่จัก ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบริบแข็งของครีบริบออกมีขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน
หรือมีขนาดไล่เลี่ยกัน กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้าง มีความยาว 2 เท่าของความกว้าง
ของฐาน ความยาวจะงอยปาก $25.66 - 36.31$ (30.73 ± 2.656) %HL ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางตา
 $13.15 - 20.22$ (15.30 ± 1.469) %HL ระยะห่างระหว่างตา $23.39 - 33.55$ (27.77 ± 2.146) %HL
ความลึกและความกว้างของหัวบริเวณตา $42.43 - 63.39$ (49.30 ± 4.311) และ $42.89 - 60.94$ (50.06 ± 3.33) %HL ความกว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process $10.60 - 17.12$ (13.38 ± 1.548) และ $30.81 - 44.98$ (37.10 ± 3.172) %HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุด
เริ่มต้นของครีบริบออก ครีบริบหลัง ครีบริบท้อง รูทวาร ครีบริบไขมันและครีบริบก้น $15.49 - 22.09$ (17.69 ± 1.449), $30.36 - 36.51$ (32.50 ± 1.422), $43.61 - 48.46$ (45.71 ± 1.308), $52.68 - 57.27$ ($54.86 \pm$

1.160), 44.10 – 52.31 (42.97 ± 2.038) และ 59.58 – 64.30 (61.74 ± 1.183) %SL ความยาวฐานครีบท้อง ครีบท้อง และ ครีบท้อง 9.90 – 17.05 (11.09 ± 1.075), 44.10 – 52.31 (48.18 ± 2.060) และ 10.45 – 13.91 (12.08 ± 0.717) %SL ความยาวก้านครีบท้องของครีบท้องและครีบท้อง 14.39 – 19.93 (17.31 ± 1.324) และ 11.94 – 18.52 (15.45 ± 1.552) %SL ความยาวคอดหาง 21.09 – 28.70 (26.55 ± 1.207) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบท้อง ถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบท้อง 6.54 – 11.54 (9.24 ± 0.991) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 55)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาว ไม่เกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าและร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่อง ยาว กระดูก supraoccipital process ยาวมากกว่า 4 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และไม่มีโค้งลงส่วนล่าง แถบฟัน vomerine teeth แคบและสั้น ไม่มีแถบ ฟัน mandibular teeth กระดูก maxilla สั้น กระดูก nasal ยาว กระดูก infraorbital ทุกชิ้นมีความยาว ใกล้เคียงกัน กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้น กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบน เชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และ hyomandibular กระดูก interopercle มีขนาดเล็ก ส่วนท้ายตอน กลางของกระดูก urohyal ยาวไม่ถึง 1 เท่าของความกว้างของฐาน process กระดูก ceratohyal และ epihyal มีขนาดเล็ก กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาวทุกก้าน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process ไม่มีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ได้ process กระดูก Weberian apparatus มี กระดูก neural spine ยาว ยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่าง คล้ายแท่งทรงกระบอก และมีปลายทู่ กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างจากที่ส่วนท้ายของ girdle และแผ่ไปถึงส่วนหน้า กระเพาะอาหารรูปร่างกลมมน ลำไส้ยาวเกิน 4 เท่าของความยาว กระเพาะอาหาร ไตส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย กระเพาะลมไม่มีลายเส้นในบริเวณผิว

ลักษณะของสี

สีโดยรวมของลำตัวมีสีดำปนน้ำตาล ยกเว้นบริเวณส่วนท้อง แนวด้านล่าง และ แถบขวางลำตัวมีสีขาว แถบขวางลำตัวแถบแรกมีสีขาวจางๆมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณจุดสิ้นสุดของ ฐานครีบท้องพาดขวางลงมายังบริเวณระหว่างจุดสิ้นสุดของครีบท้องและจุดเริ่มต้นของครีบท้อง

แถบที่สองมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณตอนปลายของครีบก้นมันพาดขวางลงมาในบริเวณคอดหาง หนวด
ทุกคู่มีสีขาว ครีบอก ครีบล้าง ครีบท้อง ครีบก้น และครีบทหางมีสีเทาจาง

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

Bagrichthys macropterus มีการกระจายพันธุ์ในเกาะบอร์เนียว สุมาตรา กัมพูชา และ
ไทย (Roberts, 1989) อาหารที่ปลากินได้แก่ ปลาขนาดเล็ก สัตว์หน้าดิน และกินซากพืชที่ถูกพัดพา
มาโดยกระแสน้ำ (Rainboth, 1996) ในไทยพบเฉพาะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำโขง (ภาพที่ 56)
เครื่องมือประมงที่ใช้จับคือ เบ็ดราว เบ็ด และ ข่าย ในตลาดพบขายในรูปของปลาสด


ภาพที่ 55 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Bagrichthys macropterus*


55.1 ลักษณะ โครงสร้างภายนอก

a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบหลัง, d. กระดูก humero-cubital process

55.2 ลักษณะทางกายวิภาค

e. แนวด้านบนของกะโหลกศีรษะ, f. แนวด้านล่างของกะโหลกศีรษะ, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม





สกุลปลาแขยงเขา Genus *Batasio* Blyth, 1860

Batasio Blyth, 1860 : p. 149 (type species : *Pimelodus batasio* Hamilton, 1822)

Macronoides Hora, 1921 (type species : *Macronoides affinis* (Blyth), as a subgenus

ลักษณะเด่นของสกุล

ปลาในสกุลนี้มีลักษณะคล้ายกับปลาในสกุล *Leiocassis* แต่แตกต่างโดยมีกระดูก metapterygoid เชื่อมติดต่อกับเฉพาะกระดูก quadrate กระดูก interopercle แบนและมีความกว้างใกล้เคียงกันทั้งชิ้น


ลักษณะทั่วไปของสกุล

ลำตัวยาวและแบนข้างมาก หัวมีขนาดเล็กและแบนข้าง ตามีขนาดเล็กและมีผิวหนังคลุม ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณหัวมีรูรับความรู้สึก หนวดที่ขากรรไกรบนสั้น ยาวไม่ถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ขอบด้านหลังของก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จักซี่ลง ครีบไขมันมีฐานยาวเกือบถึงครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัว เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอสันทับกัน กระดูก mesethmoid รูปร่างเป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนหน้ามีส่วนที่ยื่นออกด้านข้าง ขอบด้านบนของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และไม่โค้งลงด้านล่าง ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเชื่อมติดต่อกับร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังและมีลักษณะเป็นร่องยาวโดยจุดสิ้นสุดของร่องกึ่งกลางหัวตอนหลังอยู่บริเวณเกือบถึงฐานของกระดูก supraoccipital process กระดูก supraoccipital process ยาว แถบฟัน vomerine teeth แคบและสั้น แถบฟัน mandibular teeth สั้น รูปร่างคล้ายรูปกระสวย ซี่กรองเหงือกเป็นเส้นหนาและสั้น ขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกเป็นซี่จัก มีความยาวใกล้เคียงกัน กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้นและปลายเรียวแหลม กระดูก infraorbital ทุกชิ้นมีความยาวใกล้เคียงกัน กระดูก nasal สั้น กระดูก maxilla สั้น กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนกว้าง กระดูก interopercle มีความกว้างใกล้เคียงกันทั้งอัน กระดูก branchiostegal ray มีลักษณะเป็นเส้นเรียวยาวทั้งหมดทุกก้าน ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal สั้น ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal ได้ process เป็นแผ่นแบน กระดูก pelvic girdle กว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle เท่านั้น กระเพาะอาหารมีรูปร่างกลมมน ลำไส้

ค่อนข้างว กระทบะลมีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจและไม่มีลายเส้นกระจายบริเวณผิว ใต้ส่วนหลังมีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม

ข้อสังเกต

Jayaram (1973) ตั้งสกุลของปลาหมึกสกุลใหม่คือ *Chandramara* โดยใช้ *Pimelodus chandramara* Hamilton, 1822 เป็นต้นแบบของสกุล และ Jayaram รายงานลักษณะเด่นของปลาในสกุลนี้ว่ามีหัวที่แบนข้างและตาที่ใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับปลาในสกุล *Batasio* แต่ Mo (1991) รายงานว่าผลการศึกษาทางกายวิภาคของปลาทั้งสองสกุลมีความเหมือนกัน ดังนั้นจึงรวมเอา *Pimelodus chandramara* Hamilton เข้าอยู่ในสกุล *Batasio* และนำเอาสกุล *Chandramara* มาเป็น junior synonym ของสกุล *Batasio*



ภาพที่ 57 *Batasio blythi* (Day, 1877)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Batasio blythi* (Day, 1877) (ภาพผนวกที่ 11.3)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : แขนงเขา

ชื่อสามัญ (common name) : Tannasserim batasio, Batashi

Macrones blythi Day, 1877 (type locality : Tennasserim, Burma); Day, 1889

Leiocassis fluviatilis Day, 1888 (type locality : Wegwoon, Burma); Day, 1889

Macrones dayi Vinciguerra, 1890 (type locality : Meetan and Biapo, Burma); Hora and Law, 1941

Macrones mariaiensis Chardhuri, 1913 (type locality : Mariani, Assam); Hora and Law, 1914

Macrones(*Macronoides*) *affinis* (Blyth) Hora, 1921

Mystus stigmaturus Fowler, 1934

Mystus havmolleri Smith, 1945

Batasio tengana Misra, 1976

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 57 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 29.1-79.3 mm SL

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 6506 (11 ตัวอย่าง, 54.2-63.9 mm SL) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ. ลานสัก จ.อุทัยธานี สืบสิน สนธิรัตน์ 1 มิถุนายน 2540

ลุ่มน้ำภาคใต้ KUMF 6507 (19 ตัวอย่าง, 29.1-63.8 mm SL) จ.สุราษฎร์ธานี ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 4 กันยายน 2539; KUMF 6509 (3, 72.2-79.3) อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ภาสกร แสนจันแดง 8 กรกฎาคม 2541; KUMF 6510 (5, 56.8-64.3) อ.สุคีริน จ.นราธิวาส ภาสกร แสนจันแดง 5 กรกฎาคม 2541

ลุ่มน้ำตะนาวศรี KUMF 6508 (19 ตัวอย่าง, 42.2-77.8 mm SL) อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ภาสกร แสน
จันแดง 20 มกราคม 2541

ลักษณะเด่นของชนิด

ปลาชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับ *Leiocassis poecilopterus* แต่แตกต่างโดยมีหมวด
บริเวณจมูกสั้น ยาวไม่ถึงบริเวณขอบด้านหน้าของตา กระดูก metapterygoid เชื่อมติดต่อกับเฉพาะ
กระดูก quadrate กระดูก interopercle เบนและมีความกว้างใกล้เคียงกันทั้งชิ้น แขนงทั้งบนและ
ล่างไม่มีแถบหรือจุดสีพาดขวาง

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.iii-iv / 7-10; C.8/7; P.I 7-9; V.i5; BR.5-6; GR5-8; VC37

รูปร่างลำตัวแบนข้าง หัวมีรูปร่างแบนข้าง จะงอยปากกลมมน ปากกว้างตามขนาด
ของปลายจะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัวมีผิวหนังปกคลุม เนื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอซ้อน
ทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตามีผิวหนังคลุม หนวดมี 4 คู่ หนวดที่ขา
กรรไกรบนยาวไม่ถึงตอนกลางของครีบอก หนวดบริเวณจมูกยาวถึงขอบด้านหน้าของตา หนวดคู่
นอกที่ขากรรไกรล่างยาวไม่ถึงบริเวณคอดคอ หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวไม่ถึงบริเวณกึ่งกลาง
หัว ตอนล่างของหัวมีรูรับความรู้สึก ซึ่งร่องเหงือกเป็นเส้นหนาและสั้น ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลัง
ก้านครีบอกของครีบอกหลัง ซึ่งขอบด้านหน้าก้านครีบอกของครีบอกหลังไม่เป็นซี่จิก ซึ่งจับบริเวณ
ขอบด้านหลังก้านครีบอกของครีบอกมีขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดเล็กต่างกัน
กระดูก humero-cubital process มีฐานแคบ ยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาวจะงอย
ปาก 33.33 – 43.63 (38.70 ± 2.279) %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา 19.88 – 26.50 (23.43 ± 1.440) %HL ระยะห่างระหว่างตา 25.00 – 35.14 (30.05 ± 2.404) %HL ความลึกและความกว้างของ
หัวบริเวณตา 46.84 – 60.47 (52.62 ± 3.011) และ 49.58 – 67.90 (56.33 ± 3.221) %HL ความกว้าง
ฐานของกระดูก supraoccipital process 8.22 – 17.80 (14.07 ± 2.650) %HL ความยาวจากจุดปลาย
สุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ครีบอกหลัง ครีบอกท้อง รูทวาร ครีบอกไขมันและครีบอก
20.40 – 25.12 (22.39 ± 1.068), 32.87 – 38.05 (35.24 ± 1.103), 46.58 – 53.66 (49.54 ± 1.580), 50.40
– 58.54 (54.66 ± 1.857), 51.89 – 60.76 (56.47 ± 2.487) และ 64.88 – 71.74 (68.48 ± 1.737) %SL

ความยาวฐานครีบท้อง ครีบท้อง และ ครีบก้น $12.89 - 16.84$ (14.67 ± 0.925), $23.33 - 35.20$ (30.54 ± 2.912) และ $12.37 - 17.53$ (14.29 ± 1.051)%SL ความยาวก้านครีบท้องของครีบท้องและ ครีบท้อง $12.38 - 17.88$ (14.93 ± 1.267) และ $11.19 - 14.64$ (12.71 ± 0.837) %SL ความยาวคอดหาง $16.45 - 19.43$ (18.00 ± 0.82) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบท้องถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบท้อง $11.64 - 17.72$ (13.94 ± 1.573) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 58)

เหมือนกับคำบรรยายลักษณะของสกุล

ลักษณะของสี

สีพื้นของลำตัวโดยรวมมีสีน้ำตาลอ่อน ยกเว้นบริเวณแนวด้านล่างของลำตัวและท้อง มีสีขาว บริเวณแถบขวางลำตัวมีสีดำ แถบมีทั้งหมดสี่แถบ โดยแถบแรกมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณหลังดาพาดขวางลงมาถึงบริเวณแนวขอบด้านล่างของตา แถบที่สองมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณกระดูก supraoccipital process พาดขวางลงมาถึงบริเวณตอนบนของครีบท้อง แถบที่สามมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของครีบท้องพาดขวางลงมาถึงบริเวณฐานครีบท้อง แถบที่สี่มีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณส่วนต้นของครีบท้องพาดขวางลงมาถึงบริเวณเหนือแนวเส้นข้างตัว แต่ในตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่แถบนี้จะเหลือเป็นแค่จุดเล็กๆอยู่เหนือแนวเส้นข้างตัว ครีบท้องมีสีเทาปนดำ ครีบท้อง ครีบก้น มีสีขาว ครีบท้องมีแถบพาดขวางตามแนวยาว 2 แถบ โดยแถบแรกพาดขวางบริเวณส่วนฐานของครีบท้อง และแถบที่สองพาดขวางบริเวณตอนบนของครีบท้อง ครีบท้องมีสีน้ำตาลอ่อน สำหรับตัวอย่างปลาที่เก็บจากลุ่มน้ำแม่กลองมีสีพื้นของลำตัวเป็นสีน้ำตาลเข้ม ไม่สามารถมองเห็นแถบขวางบริเวณลำตัวได้ชัดเจน

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

Batasio blythi มีการกระจายพันธุ์ในประเทศอินเดีย บังกลาเทศ พม่า และ ไทย (Jhingran และ Talwar, 1991) ในไทยพบเฉพาะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำทางภาคใต้ (ภาพที่ 59) ในบริเวณลำธารที่มีพื้นเป็นกรวดหินและมีกระแสน้ำปานกลาง ในตลาดพบขายในรูปปลาสดงาม

ข้อสังเกต

Smith (1945) รายงานว่าพบปลาชนิดนี้เป็นครั้งแรกในไทยพร้อมกับตั้งปลาชนิดนี้เป็นชนิดใหม่โดยจัดให้อยู่ในสกุล *Mystus* และให้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Mystus havmolleri* แต่จากการศึกษาในภายหลังพบว่าได้มีการให้ชื่อวิทยาศาสตร์ปลาก่อนหน้า Smith โดยนักวิทยาศาสตร์หลายท่านด้วยกัน และชื่อวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันได้แก่ *Batasio tengana* (Hamilton, 1822) (= *Pimelodus tengana* Hamilton, 1822) แต่จากการตรวจสอบเอกสารต้นแบบที่เขียนโดย Hamilton ในปี ค.ศ. 1822 พบว่า *Pimelodus tengana* มีแถบสีดำจางๆพาดผ่านแนวกลางตัว ตามีขนาดใหญ่ ครีบไขมันสั้น และปลายครีบหางทั้งตอนบนและล่างมีลักษณะแหลม ลักษณะต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นแตกต่างกับปลาแขยงเขาที่พบในประเทศไทยโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นปลาแขยงเขาจึงไม่ใช่เป็นชนิด *Batasio tengana* จากการตรวจสอบพบว่า *Macrones blythi* ตั้งชนิดโดย Day ในปี ค.ศ. 1877 มีแหล่งเก็บตัวอย่างต้นแบบอยู่บริเวณแม่น้ำตะนาวศรีทางตอนใต้ของพม่ามีลักษณะคำบรรยายตรงกับปลาแขยงเขาที่พบในไทย ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าปลาแขยงเขาที่พบในไทยควรใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Batasio blythi* (Day, 1877)


ภาพที่ 58 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Batasio blythi*


58.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก

a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบลึง, d. กระดูก humero-cubital process

58.2 ลักษณะทางกายวิภาค

e. แนวด้านบนของกะโหลกศีรษะ, f. แนวด้านล่างของกะโหลกศีรษะ, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม





สกุลปลาเกล็ดทอง กดทั้ง Genus *Hemibagrus* Bleeker, 1862

Hemibagrus Bleeker, 1862 : a (type species : *Bagrus nemurus* Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1839, by original designation)

Hypselobagrus Bleeker, 1862 : 10,57 (type species : *Bagrus macronema* Bleeker, 1846a = *Bagrus nigriceps* Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1839 (by original designation))

ลักษณะเด่นของสกุล

แตกต่างจากสกุล *Sperata* โดยมีกระดูก infraorbital ขึ้นที่ 2 และ 5 ยาวกว่าขึ้นที่ 1, 3 และ 4 หัวมีรูปร่างแบนกว้าง กระดูก mesethmoid รูปร่างเป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ความกว้างของกระดูกใกล้เคียงกัน แตกต่างจากสกุล *Mystus* โดยกระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนกว้าง (plate-like) ด้านหน้าตอนล่างของกระดูก lacrymal สั้น แฉกฟัน vomerine teeth กว้าง กระดูก urohyal มี process ยาว


ลักษณะทั่วไปของสกุล

ลำตัวยาวปานกลาง ส่วนต้นแบนลงและส่วนท้ายแบนข้าง หัวมีรูปร่างแบนลง ปากกว้าง ตาไม่มีผิวหนังคลุม หนวดที่ขากรรไกรบนยาวเกินครึ่งอก ขอบด้านหลังของก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จักซี่ลง ครีบไขมันมีฐานสั้นถึงยาว เยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอซ้อนทับกัน กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนหน้ามีส่วนที่ยื่นออกด้านข้าง ขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid มีหรือไม่มี process และไม่โค้งลงด้านล่าง ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเชื่อมติดต่อกับร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลัง ร่องกึ่งกลางหัวเป็นร่องยาว กระดูก supraoccipital process สั้นหรือยาว แฉกฟัน vomerine teeth มีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยวขนาดใหญ่และกว้าง แฉกฟัน mandibular teeth โค้งยาว ซึ่งกรงเหงือกเป็นเส้นหนาหรือเรียวยาว ขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกเป็นซี่จัก กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้นและปลายเรียวแหลม กระดูก infraorbital ขึ้นที่ 2 และ 5 มีความยาวมากกว่าขึ้นที่ 1, 3 และ 4 กระดูก nasal ยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนกว้าง เชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และ hyomandibular กระดูก interopercle มีขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียว

ยาว ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal เป็น process ยาว ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal ได้ process เป็นแผ่นแบน กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างมากที่ส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารมีรูปร่างยาวรี ลำไส้ยาวไม่เกิน 3 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร กระเพาะลมมีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจและมีลายเส้นกระจายบริเวณผิว ใต้ส่วนหลังมีรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย (Y)

ข้อสังเกต

Roberts (1989) นำเอาสกุล *Hemibagrus* Bleeker, 1862 มาเป็นชื่อพ้องชื่อหนึ่งของสกุล *Mystus* Scopoli, 1777 แต่ Mo (1991) เป็นคนแรกที่ยกเอาสกุล *Hemibagrus* มาใช้กับกลุ่มของปลาชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่พบในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางใต้ของจีน



ภาพที่ 60 *Hemibagrus filamentus* (Fang and Chaux, 1949)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Hemibagrus filamentus* (Fang and Chaux, 1949)

(ภาพผนวกที่ 11.4)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : กคเหลื่อง กคชงโรง กค

ชื่อสามัญ (common name) : Yellow mystus, Yellow bagrid catfish

Macrones(Hemibagrus) filamentus Fang and Chaux in Chaux and Fang, 1949 (type locality :
Combodge)

Mystus filamentus :Rainboth, 1996

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 75 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 62.3-454.3 mm SL

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 2609 (1 ตัวอย่าง, 105.9 mm SL) ตลาดอยุธยา จ.อยุธยา 25 มกราคม 2517; KUMF 0969 (1, 163.8) แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเขาใหญ่ H.M. Smith 24 เมษายน 2471; KUMF 0962 (1, 173.8) แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณลานเท H.M. Smith 19 พฤศจิกายน 2466; KUMF 6513 (1, 365.3) ตลาดสะพานใหม่ กรุงเทพฯ ศาสวัต วรรณวิสันต์ มกราคม 2537; KUMF 6514 (1, 454.3) ตลาดปทุมธานี จ.ปทุมธานี ศาสวัต วรรณวิสันต์ 15 มกราคม 2538; KUMF 6511 (5, 217.3-240.3) ตลาดปทุมธานี จ.ปทุมธานี ภาสกร แสงจันทร์แดง 16 มิถุนายน 2541; KUMF 6512 (1, 220.3) อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาสกร แสงจันทร์แดง 28 มีนาคม 2541; KUMF 6515 (4, 314.8-424.8) ตลาดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ภาสกร แสงจันทร์แดง 23 ธันวาคม 2541; KUMF 6516 (2, 281.8-316.6) ตลาดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ภาสกร แสงจันทร์แดง 5 มกราคม 2542

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 0973 (1 ตัวอย่าง, 102.8 mm SL) แม่น้ำจันทบุรี หลวงมัชยจิตรการ

4 มิถุนายน 2477

ลุ่มน้ำแม่โจง KUMF 0967 (1 ตัวอย่าง, 103.2 mm SL) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา H.M. Smith
19 มกราคม 2468; KUMF 6517 (5, 105.8-150.4) ตลาดนครพนม จ.นครพนม ภาสกร แสนจันแดง
8 พฤศจิกายน 2541 ; KUMF 6518 (1, 282.3) อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ภาสกร แสนจันแดง 31
มีนาคม 2541

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 6519 (19 ตัวอย่าง, 87.8-315.8 mm SL) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ภาสกร
แสนจันแดง 6,7 ธันวาคม 2540; KUMF 6520 (4, 141.2-292.6) ตลาดกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ภาสกร แสนจันแดง 5 ธันวาคม 2540

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 0961 (2 ตัวอย่าง, 146.2-150.3 mm SL) แม่น้ำปัตตานี H.M. Smith 15
ตุลาคม 2466; KUMF 6522 (9, 62.3-192.4) เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ทศพล กระจ่างคารา
มิถุนายน 2537; KUMF 6521 (8, 147.8-194.2) พรุโตะแดง จ.นราธิวาส ภาสกร แสนจันแดง 9
กรกฎาคม 2541; KUMF 6523 (6, 137.3-222.8) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาสกร แสนจันแดง 30
มิถุนายน 2541; KUMF 6524 (1, 320.8) ตลาดยะลา จ.ยะลา ภาสกร แสนจันแดง 25 ธันวาคม 2540;
KUMF 6525 (1, 213.4) ตลาดภูเก็ท จ.ภูเก็ต (ปลารับมาจาก ทะเลน้อย จ.พัทลุง) ภาสกร แสนจันแดง
22 กุมภาพันธ์ 2541

ลักษณะเด่นของชนิด

Hemibagrus filamentus แตกต่างกับ *H. nemurus* ในเรื่องตำแหน่งจุดสิ้นสุดของ
ปลายครีบทั้งขณะที่พับลงให้ครีบบนในแนวระนาบโดย *H. filamentus* มีจุดสิ้นสุดของปลายครีบทั้ง
หลังอยู่บริเวณส่วนต้นครีบทั้งแต่ *H. nemurus* มีจุดสิ้นสุดไม่ถึงจุดเริ่มต้นของครีบทั้ง

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.iii-iv / 7-9; C.8/7; P.I 8-9; V.i 5; BR.11-13; GR12-16; VC45

หัวรูปร่างแบนลง ปากกว้างตามขนาดของปลายจะอียปาก บริเวณตอนบนของหัวมี
ผิวหนังปกคลุม เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอสันทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่าง
ของหัว ตาไม่มีผิวหนังคลุม หนวคมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงครีบทั้ง หนวดบริเวณจมูก
ยาวถึงขอบด้านหน้าของตา หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณตอนกลางครีบทั้ง หนวดคู่

ในทักซากรไรกรล่างยาวถึงบริเวณคอดคอ ซึ่งร่องเหงือกเป็นเส้นหนา ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้าน ครีบแข็งของครีบหลังซึ่ง ขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบหลังไม่เป็นซี่จัก ซึ่งจับบริเวณขอบ ด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกมีขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดไล่เลี่ยกัน กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้าง ยาวน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาว จะยอปาก 34.60 – 40.10 (37.80 ± 1.233) %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา 10.76 – 20.12 (14.58 ± 1.921) %HL ระยะห่างระหว่างตา 26.73 – 34.36 (30.45 ± 1.81) %HL ความลึกและความกว้าง ของหัวบริเวณตา 26.27 – 37.84 (31.34 ± 2.388) และ 47.49 – 65.31 (54.4 ± 2.989) %HL ความยาว ของกระดูก supraoccipital process 24.11 – 37.05 (31.09 ± 2.757) %HL ความยาวจากจุดปลายสุด ของจะยอปากถึงจุดเริ่มต้นของ ครีบอก ครีบหลัง ครีบท้อง รูทวาร ครีบไขมันและครีบกัน 21.85 – 27.20 (24.46 ± 1.101), 38.39 – 45.48 (42.40 ± 1.249), 51.13 – 58.54 (55.44 ± 1.753), 55.23 – 68.40 (62.67 ± 1.983), 63.24 – 73.14 (69.06 ± 1.726) และ 67.16 – 77.03 (72.63 ± 1.849) %SL ความยาว ฐานครีบหลัง ครีบไขมัน และ ครีบกัน 13.53 – 17.70 (15.87 ± 0.869), 13.14 – 20.71 (15.34 ± 1.412) และ 7.99 – 14.77 (11.96 ± 0.951) %SL ความยาวก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบหลัง 15.03 – 22.62 (18.63 ± 1.511) และ 10.91 – 19.01 (15.20 ± 1.462) %SL ความยาวคอดหาง 14.75 – 19.57 (16.41 ± 0.913) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบไขมันถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบ หาง 14.84 – 18.89 (16.57 ± 0.904) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 61)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาว เกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าและร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องยาว กระดูก supraoccipital process ยาวมากกว่า 4 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และไม่โค้งลงส่วนล่าง แถบฟัน vomerine teeth กว้างและโค้งยาว แถบฟัน mandibular teeth โค้งยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก nasal ยาว กระดูก infraorbital ชั้นที่ 2 และ 5 ยาวมากกว่าชั้นที่ 1, 3 และ 4 กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process ตื้น และปลายเรียว แหลม กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และ hyomandibular กระดูก interopercle แบนกว้าง ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal เป็น process ยาว ยาวเป็น 2-2.5 เท่าของความกว้างฐาน process กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของ กระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แผ่กว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้นก้านสุดท้ายและร่องสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น

process และมีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ใต้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural spine ยาว ความยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างเรียวยาว และมีปลายแหลม กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารรูปร่างยาวรี ลำไส้ยาวไม่เกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร ใต้ส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย กระเพาะลมมีลายเส้นกระจายทั่วบริเวณผิว

ลักษณะของสี

บริเวณแนวด้านหลังและด้านข้างลำตัวมีสีดำ บริเวณแนวด้านล่างของลำตัวและท้องมีสีขาว หนวดบริเวณจมูกมีสีดำ หนวดที่ขากรรไกรบนมีสีขาวยกเว้นบริเวณขอบด้านในมีสีเทาจาก หนวดบริเวณขากรรไกรล่างมีสีขาว ครีบอก ครีบหลัง ครีบไขมัน ครีบกัน และครีบหางมีสีดำ

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

Hemibagrus filamentus มีการกระจายพันธุ์ในลุ่มน้ำโขงเขตประเทศกัมพูชา อาหารที่ปลากินได้แก่ พื้กคริสเตเซียน และปลาขนาดเล็ก (Rainboth, 1996) ในไทยพบที่ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก และ ลุ่มน้ำทางภาคใต้ (ภาพที่ 62) ปลารอบอาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นแม่น้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำ เครื่องมือประมงที่ใช้จับคือ เบ็ด เบ็ดราว ข่าย และอวน ในตลาดพบขายในรูปของปลาสดและปลาสวยงาม

ข้อสังเกต

Hemibagrus filamentus เป็นปลากดเหลืองชนิดที่มีลำตัวขนาดใหญ่ ตัวอย่างที่ศึกษา มีขนาดยาวสุดถึง 454.3 mmSL มีน้ำหนักเกือบ 4 กิโลกรัม และในบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จ. ชัยนาท ชาวประมงเคยจับปลานชนิดนี้ได้มีน้ำหนักถึง 7 กิโลกรัม


ภาพที่ 61 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Hemibagrus filamentus*


61.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก


a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบล้าง, d. กระดูก humero-cubital process

61.2 ลักษณะทางกายวิภาค

e. แนวด้านบนของกะโหลกศีรษะ, f. แนวด้านล่างของกะโหลกศีรษะ, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม







ภาพที่ 63 *Hemibagrus microphthalmus* (Day, 1877)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Hemibagrus microphthalmus* (Day, 1877) (ภาพผนวกที่ 11.5)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : กดกั้ง กดแก้ว ปลากัง ปลาถึง ปลาเค็ง

ชื่อสามัญ (common name) : Irrawaddy mystus, Red tail catfish

Macrones microphthalmus Day, 1877 (type locality : Irrawaddy river, Burma), Day, 1889

Mystus(Mystus) microphthalmus Misra, 1976

Mystus(Hemibagrus) wyckioides Fang and Chaux in Chaux and Fang, 1949 (type locality :
Combogde)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 51 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 56.2-524.3 mm SL

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 1010 (1 ตัวอย่าง, 122.8 mm SL) แม่น้ำลพบุรี จ.ลพบุรี H.M Smith 22 ตุลาคม 2469; KUMF 6527 (2, 308.1-342.3) ตลาดชัยนาท จ.ชัยนาท ศาสวัต วรรณวิสันต์ 8 ธันวาคม 2537; KUMF 6528 (1, 524.3) ตลาดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ภาสกร แสงจันแดง 5 มกราคม 2542

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 6529 (15 ตัวอย่าง, 56.2-75.6 mm SL) ตลาดจตุจักร (รับมาจาก จ.ยโสธร) ภาสกร แสงจันแดง 11 กรกฎาคม 2541; KUMF 6530 (3, 182.8-256.9) เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ภาสกร แสงจันแดง 11 ธันวาคม 2540; KUMF 6531 (1, 250.2) อ.พินมั่งสาหาร จ.อุบลราชธานี ภาสกร แสงจันแดง 12 ตุลาคม 2540; KUMF 6532 (5, 229.2-334.2) ตลาดนครพนม จ.นครพนม ภาสกร แสงจันแดง 8 พฤศจิกายน 2541; KUMF 6533 (3, 170.2-220.8) อ.ปากคาด จ.

อุบลราชธานี ภาสกร แสงจันทร์แดง 18 ตุลาคม 2540; KUMF 6534 (2, 373.8-480.9) อ.โจงเจียม จ.อุบลราชธานี ภาสกร แสงจันทร์แดง 26 ตุลาคม 2541

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 1012 (2 ตัวอย่าง, 122.8-124.1 mm SL) จ.กาญจนบุรี H.M. Smith 12 กันยายน 2471; KUMF 6537 (2, 313.6 –314.2) อ.ท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี ศาสวัต วรรณวิสันต์ 23 ธันวาคม 2537; KUMF 6538 (1, 363.8) เขื่อนศรีนครินทร์ ศาสวัต วรรณวิสันต์ พ.ศ. 2536; KUMF 6535 (8, 173.3-203.8) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ภาสกร แสงจันทร์แดง 16 มีนาคม 2541; KUMF 6536 (1, 180.8) ตลาดกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ภาสกร แสงจันทร์แดง 5 ธันวาคม 2540; KUMF 6538 (1, 363.8) เขื่อนศรีนครินทร์ ศาสวัต วรรณวิสันต์ พ.ศ. 2536

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 6539 (1 ตัวอย่าง, 227.2 mm SL) เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ทศพล กระจำนงค์ กันยายน 2536

ลุ่มน้ำสาละวิน KUMF 6526 (2 ตัวอย่าง, 415.6-515.8 mm SL) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาสกร แสงจันทร์แดง 31 มีนาคม 2541

ลักษณะเด่นของชนิด

Hemibagrus microphthalmus แตกต่างจากปลาในสกุล *Hemibagrus wycki* โดยบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังเรียบ หนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel) ยาว เกยครีบท้อง กระดูก supraoccipital process ยาวประมาณ 3 เท่าของความกว้างของฐาน

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.iii-iv / 8-11; C.8/7; P.I 8-9; V.i5; BR.10-12; GR9-14; VC52-53

หัวรูปร่างแบนลง ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณโคนบนของหัวมี ผิวหนังปกคลุม เยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอสอดทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตาไม่มีผิวหนังคลุม หนวดมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงครีบกกหรือยาวเลยเล็กน้อย หนวดบริเวณจมูกยาวถึงขอบด้านหน้าของตา หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณโคนครีบอก หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณคอดคอ ซึ่งกรงเหงือกเป็นเส้นหนา บริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังเรียบ ขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบหลังไม่เป็นซี่จัก ซึ่งจักบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกขนาดใหญ่ ซึ่งจักอันสุดท้ายที่อยู่ปลายสุดของก้านครีบ

แข็งแรงมีขนาดใหญ่กว่าซี่อื่นๆ และมีลักษณะโค้งงอคล้ายตะขอ กระดูก humero-cubital process มีฐานแคบ ยาวเป็น 2 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาวจะงอยปาก $33.14 - 39.15$ (36.38 ± 1.167) %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา $8.11 - 17.88$ (13.08 ± 3.019) %HL ระยะห่างระหว่างตา $29.59 - 37.02$ (32.63 ± 1.646) %HL ความลึกและความกว้างของหัวบริเวณตา $25.35 - 37.13$ (30.88 ± 3.531) และ $50.50 - 66.48$ (60.74 ± 3.566) %HL ความกว้างฐานของกระดูก supraoccipital process $4.07 - 7.87$ (5.60 ± 1.076) %HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ครีบท้อง ครีบท้อง รูทวาร ครีบท้องและครีบท้อง $20.92 - 25.43$ (22.79 ± 0.925), $36.91 - 41.86$ (39.31 ± 1.272), $50.18 - 58.29$ (53.55 ± 1.744), $56.58 - 65.59$ (60.49 ± 1.753), $60.85 - 68.33$ (65.43 ± 1.703) และ $67.64 - 74.75$ (70.60 ± 1.669) %SL ความยาวฐานครีบท้อง ครีบท้อง และ ครีบท้อง $13.32 - 16.90$ (15.10 ± 0.774), $18.07 - 28.12$ (21.22 ± 1.669) และ $11.15 - 15.81$ (13.31 ± 0.847) %SL ความยาวก้านครีบท้องของครีบท้องและครีบท้อง $8.90 - 15.93$ (12.35 ± 1.988) และ $7.94 - 11.05$ (9.10 ± 0.735) %SL ความยาวคอดหาง $15.32 - 19.64$ (17.08 ± 1.131) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบท้องถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบท้อง $12.85 - 15.81$ (14.23 ± 0.706) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 64)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวเกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าและร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องยาว กระดูก supraoccipital process ยาวมากกว่า 4 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่โค้งลงส่วนล่างและมี process 1 อัน แถบฟัน vomerine teeth กว้างและโค้งยาว แถบฟัน mandibular teeth โค้งยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก nasal ยาว กระดูก infraorbital ชั้นที่ 2 และ 5 ยาวมากกว่าชั้นที่ 1, 3 และ 4 กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้น และปลายเรียวแหลม กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และ hyomandibular กระดูก interopercle แบนกว้าง ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal เป็น process ยาว ยาวเป็น 2-2.5 เท่าของความกว้างฐาน process กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แบนกว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process และมีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ใต้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural spine ยาว ความยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างเรียวยาว

และมีปลายแหลม กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารรูปร่างยาวรี ลำไส้ยาวไม่เกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร ใต้ส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย กระเพาะลมมีลายเส้นกระจายทั่วบริเวณผิว

ลักษณะของสี

บริเวณแนวด้านหลังและตอนกลางของลำตัวมีสีเทาเข้ม หนวดที่ขากรรไกรบนมีสีขาว ยกเว้นบริเวณโคนหนวดมีสีเทา หนวดบริเวณจมูกมีสีเทาอ่อน หนวดบริเวณขากรรไกรล่างทั้งสองคู่มีสีขาว ครีบอกและ ครีบท้องมีสีเทาปนน้ำตาล ครีบท้องมีสีขาว บริเวณตอนปลายครีบท้องมีสีแดงจาง ครีบก้นบริเวณ โคนครีบท้องมีสีเทา ส่วนบริเวณตอนปลายครีบท้องมีสีแดง ครีบท้องมีสีแดง สำหรับตัวอย่างที่เก็บได้จากลุ่มน้ำสาละวิน ครีบท้องมีสีเทาปนดำ

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

ปลากดกั้งมีการกระจายพันธุ์ใน พม่า ลาว และ กัมพูชา (Talwar และ Jhingran, 1991; Rainboth, 1996; Kottelat, 1998) ในไทยพบที่ลุ่มน้ำสาละวิน ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง และ ลุ่มน้ำตาปี (ภาพที่ 65) ปลากดกั้งอาศัยอยู่บริเวณที่เป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน้ำ อาหารที่ปลากินได้แก่ กุ้ง และปลาขนาดเล็ก เครื่องมือประมงที่ใช้จับคือ เบ็ด เบ็ดราว และข่าย ในตลาดพบขายในรูปของปลาสดและปลาสดย่าง

ข้อสังเกต

จากข้อมูลนับวัดตัวอย่างปลากดกั้งที่เก็บได้จากแม่น้ำเงา ใน อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดอยู่ในลุ่มน้ำสาละวินที่มีเขตพื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ำอยู่ในพม่า พบว่า ผลที่ได้ทุกอย่างเหมือนกับปลากดกั้ง หรือปลากดกั้ง ที่พบในลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำทางภาคใต้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปลากดกั้ง กั้ง หรือ กั้ง ที่พบในประเทศไทยคือ *Hemibagrus microphthalmus* ที่ Day (1877) เป็นคนตั้งชื่อและบรรยายลักษณะที่สำคัญของปลาชนิดนี้เอาไว้ คือ มีก้านครีบแข็งของครีบท้องอ่อนและสามารถโค้งงอได้โดยง่าย

ชาวประมงที่อาศัยอยู่บริเวณ อ.สรรพชา จ.ชัยนาท ได้ให้ข้อมูลว่าเคยจับปลาชนิดนี้
ได้ในปี พ.ศ. 2541 มีน้ำหนักมากถึง 55 กิโลกรัม

ภาพที่ 64 ลักษณะ โครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Hemibagrus*


microphthalmus


64.1 ลักษณะ โครงสร้างภายนอก


a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบท้อง, d. กระดูก humero-cubital process

64.2 ลักษณะทางกายวิภาค

e. แนวด้านบนของกะโหลกศีรษะ, f. แนวด้านล่างของกะโหลกศีรษะ, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม







ภาพที่ 66 *Hemibagrus nemurus* (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1839)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Hemibagrus nemurus* (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1839) (ภาพผนวกที่ 11.6)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : กัดเหลื่อง กัดขี้ลิง กัด

ชื่อสามัญ (common name) : Yellow mystus, Yellow bagrid catfish

Bagrus nemurus Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1839 (type locality : Java)

Bagrus Hoevenii Bleeker, 1846 : 154 (type locality : Batavia, in fluviis)

Bagrus Sieboldii Bleeker, 1845 : 155 (type locality : Batavia, in fluviis)

Mystus nemurus Fowler, 1934 : 95

Mystus johorensis Herre, 1940 : 13 (type locality : Sungsai Kayu, Johore)

Mystus pahangensis Herre, 1940 : 14 (type locality : Sungai Garam, near Karak, Pahang)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 158 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 70.8-237.4 mm SL

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 0964 (2 ตัวอย่าง, 165.4-173.4 mm SL) แม่น้ำกก จ.เชียงราย H.M. Smith 2 มีนาคม 2467; KUMF 6540 (41, 87.2-245) ตลาดปทุมธานี จ.ปทุมธานี ภาสกร แสนจินแดง 12 ตุลาคม 2541; KUMF 6541 (8, 139.8-210.1) ตลาดแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (ปลารับมาจากคอยเต่า จ.เชียงใหม่) ภาสกร แสนจินแดง 31 มีนาคม 2541

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 6542 (3 ตัวอย่าง, 122.8-148.9 mm SL) ตลาดนครนายก จ. นครนายก ภาสกร แสนจินแดง 19 พฤศจิกายน 2540

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 6543 (34 ตัวอย่าง, 155.1-199.9 mm SL) อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ภาสกร แสนจันแดง 23 กรกฎาคม 2541; KUMF 6544 (53, 70.8-200.3) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาสกร แสนจันแดง 26 ตุลาคม 2541; KUMF 6545 (21, 88.8-193.3) อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ภาสกร แสนจันแดง 31 พฤษภาคม 2541; KUMF 6546 (2, 182.2-189.9) ตลาดอินโดจีน จ.มุกดาหาร ภาสกร แสนจันแดง 19 ตุลาคม 2540; KUMF 6547 (1, 237.4) ตลาดอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ภาสกร แสนจันแดง 19 ตุลาคม 2540; KUMF 6548 (5, 167.8-217.9) ตลาดสกندر จ.สกندر ภาสกร แสนจันแดง 28 พฤษภาคม 2541

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 6549 (19 ตัวอย่าง, 131.6-175.2 mm SL) ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด

จ. กาญจนบุรี ศาสตราจารย์ วรวิทย์ 3 ธันวาคม 2534; KUMF 6550 (4, 83.8-211.8) ตลาดกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี ภาสกร แสนจันแดง 5 ธันวาคม 2540; KUMF 6551 (3, 196.2-221.2) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.

กาญจนบุรี ภาสกร แสนจันแดง 7 ธันวาคม 2540

ลักษณะเด่นของชนิด

Hemibagrus nemurus แตกต่างจาก *H. filamentus* โดยเมื่อพับครีบล้างลงตามแนวระนาบ จุดสิ้นสุดของปลายครีบล้างไม่ถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก *H. nemurus* แตกต่างจาก *H. mekongensis* n.sp. โดยมีจะงอยปากกว้าง ค่อนข้างกลมมน ร่องกึ่งกลางหัวกว้าง ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ขาวเลยปลายของกระดูก lateral ethmoid ส่วนที่กว้างที่สุดของกระดูก lateral ethmoid กว้างเท่ากับกระดูก frontal

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.iii-iv / 7-10; C.8/7; P.I 8-9; V.i5; BR.10-13; GR12-17; VC43-44

หัวรูปร่างแบนลง ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัวมีผิวหนังปกคลุม เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอสอดกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตาไม่มีผิวหนังคลุม หนวคมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงครีบอก หนวดบริเวณจมูกยาวเกินขอบด้านหลังของตา หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณตอนกลางครีบอก หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณคอดคอ ซึ่งร่องเหงือกเป็นเส้นหนา ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบอกแข็งของครีบล้างซึ่ง ขอบด้านหน้าก้านครีบอกแข็งของครีบล้างไม่เป็นซี่จึก ซึ่งจับบริเวณขอบ

ด้านหลังก้านครีบกึ่งของครีบอกมีขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดเล็กต่างกัน กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้าง ยาวน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาวจะงอยปาก ความยาวจะงอยปาก $33.67 - 41.91$ (37.46 ± 1.636) %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา $12.67 - 20.67$ (16.27 ± 1.457) %HL ระยะห่างระหว่างตา $26.24 - 37.83$ (32.33 ± 1.977) %HL ความลึกและความกว้างของหัวบริเวณตา $29.27 - 43.08$ (34.55 ± 2.151) และ $51.96 - 65.52$ (56.85 ± 2.53) %HL ความกว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process $4.82 - 8.53$ (6.27 ± 0.577) และ $27.02 - 39.13$ (32.07 ± 2.232) % HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ครีบอก ครีหลัง ครีท้อง รูทวาร ครีไขมันและครีกัน $18.16 - 25.36$ (22.97 ± 1.01), $37.18 - 42.11$ (40.11 ± 0.999), $49.35 - 58.06$ (53.18 ± 1.591), $55.68 - 65.59$ (60.88 ± 1.675), $66.40 - 75.14$ (70.82 ± 1.490) และ $64.98 - 75.11$ (71.40 ± 1.526) %SL ความยาวฐานครีหลัง ครีไขมัน และ ครีกัน $13.35 - 17.19$ (15.28 ± 0.748), $9.36 - 15.46$ (12.66 ± 1.137) และ $10.60 - 13.74$ (12.20 ± 2.601) %SL ความยาวก้านครีบกึ่งของครีบอกและครีหลัง $14.82 - 21.47$ (18.14 ± 1.306) และ $11.77 - 18.46$ (15.24 ± 1.162) %SL ความยาวคอดหาง $12.07 - 18.99$ (16.82 ± 0.888) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีไขมัน ถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีหาง $15.48 - 20.66$ (17.67 ± 0.870) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 67)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวเกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าและร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องยาว กระดูก supraoccipital process ยาวมากกว่า 4 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และไม่โค้งลงส่วนล่าง แถบฟัน vomerine teeth กว้างและโค้งยาว แถบฟัน mandibular teeth โค้งยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก nasal ยาว กระดูก infraorbital ขึ้นที่ 2 และ 5 ยาวมากกว่าขึ้นที่ 1, 3 และ 4 กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้น และปลายเรียวแหลม กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และ hyomandibular กระดูก interopercle แบนกว้าง ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal เป็น process ยาว ยาวเป็น 2-2.5 เท่าของความกว้างฐาน process กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แผ่กว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process และมีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ได้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural

spine ยาว ความยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างเรียวยาว และมีปลายแหลม กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารรูปร่างยาวรี ลำไส้ยาวไม่เกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร ใต้ส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย กระเพาะลมมีลายเส้นกระจายทั่วบริเวณผิว

ลักษณะของสี

บริเวณแนวด้านหลังลำตัวมีสีเทาปนเหลือง แนวตอนกลางลำตัวมีสีเหลือง แนวด้านล่างลำตัวและท้องมีสีขาว แนวที่ขากรรไกรบนมีสีขาวแต่บริเวณโคนมีสีเทาอ่อน แนวบริเวณจมูกมีสีเทาอ่อน แนวบริเวณขากรรไกรล่างทั้งสองคู่มีสีขาว ครีบอก ครีบท้อง และ ครีบท้องมีสีเทา ครีบท้องและครีบก้นมีสีขาวปนเทา ครีบท้องมีสีเทาปนเหลืองตอนปลายของครีบท้องมีแถบสีดำ

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

Hemibagrus nemurus มีการกระจายพันธุ์ในเกาะบอร์เนียว สุมาตรา ชวา มลายูเซีย ลาว และ กัมพูชา (Roberts, 1989; Rainboth, 1996; Kottelat, 1998) อาหารที่ปลากินได้แก่ แมลง ตัวอ่อนแมลงน้ำ กุ้ง ลูกปลานขนาดเล็ก และพวกครัสเตเชียน (Rainboth, 1996) ในไทยพบที่ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง (ภาพที่ 68) ปลาอาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นลำคลอง แม่น้ำ และอ่างเก็บน้ำ เครื่องมือประมงที่ใช้จับได้แก่ อวน เบ็ด เบ็ดราว แห ข่าย และลอบ ในตลาดพบขายในรูปของปลาสดและปลาสดย่าง

ข้อสังเกต

Hemibagrus nemurus เป็นปลากดเหลือง (กูดขี้ลิง) ชนิดที่มีลำตัวขนาดเล็ก จากตัวอย่างที่ศึกษาพบปลามีขนาดยาวสุดเพียง 245 mmSL และมีน้ำหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม


ภาพที่ 67 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Hemibagrus nemurus*


67.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก


a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบหลัง, d. กระดูก humero-cubital process

67.2 ลักษณะทางกายวิภาค

e. แนวด้านบนของกะโหลกศีรษะ, f. แนวด้านล่างของกะโหลกศีรษะ, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม







ภาพที่ 69 *Hemibagrus wycki* (Bleeker, 1858)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Hemibagrus wycki* (Bleeker, 1858) (ภาพผนวกที่ 11.7)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : กุดดำ กุดหางคอก กุดหม้อ

ชื่อสามัญ (common name) : Pot-side catfish, White tail catfish

Bagrus Wyckii Bleeker, 1858 : 156 (type locality : Java, in flumine Tjitarum, Province Preanger, prope vicum Parongkalong)

Hemibagrus Wyckii Bleeker, 1862 : 57

Macrones wyckii Günther, 1864 : 83

Mystus wyckii Smith, 1929 : 12, Rainboth, 1996

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 28 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 125.8-436.6 mm SL

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 1009 (1 ตัวอย่าง, 125.8 mm SL) แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบ้านโพธิ์ H.M. Smith 26 พฤศจิกายน 2466; KUMF 1014 (1, 263.8) แม่น้ำเจ้าพระยา ลานเท H.M. Smith 11 ตุลาคม 2466; KUMF 1013 (1, 352.3) แม่น้ำ บ้านวังแพน เมษายน 2472; KUMF 6552 (1, 436.6) ตลาดอยุธยา จ.อยุธยา ศาสวัต วรรณวิสันต์ สิงหาคม 2537; KUMF 6553 (2, 416.8-418.8) ตลาดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ภาสกร แสนจินแดง 5 มกราคม 2542

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 6554 (1 ตัวอย่าง, 352.8 mm SL) ตลาดหนองคาย จ.หนองคาย T.R. Robert 19 ตุลาคม 2511; NIFI 2562 (1, 159.9) ตลาดหนองคาย จ.หนองคาย ขวลิขิต วิทยานนท์ 2530; KUMF 6555 (17, 132.8-409.8) อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ภาสกร แสนจินแดง 19 ตุลาคม 40, 24 ตุลาคม และ 23 พฤศจิกายน 2541; KUMF 6556 (1, 267.8) ตลาดอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ภาสกร แสน

จันแดง 19 ตุลาคม 2540; KUMF 6557 (I, 295.8) ตลาคนครพนม จ.นครพนม ภาสกร แสงจันแดง
8 พฤศจิกายน 2541

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 6558 (1 ตัวอย่าง, 261.1 mm SL) ตลาควาญจันบุรี จ.กาญจนบุรี ภาสกร แสง
จันแดง 15 ธันวาคม 2540

ลักษณะเด่นของชนิด

Hemibagrus wycki แตกต่างจากปลา *Hemibagrus microphthalmus* โดยมีบริเวณ
ขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จึก หนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel) ยาวไม่
ถึงครีบท้อง กระดูก supraoccipital process สั้น ความยาวไม่เกิน 2 เท่าของความกว้างของฐาน

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.iii-v / 8-9; C.8/7; P.I 9-11; V.i5; BR.10-11; GR12-15; VC49-50

หัวรูปร่างแบนลง ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัวมี
ผิวหนังปกคลุม เยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอซ้อนทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่าง
ของหัว ตาไม่มีผิวหนังคลุม หนวคมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงตอนปลายของครีบอก หนวด
บริเวณจมูกยาวไม่ถึงขอบด้านหน้าของตา หนวดคู่บนที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณโคนครีบอก
หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวไม่ถึงกึ่งกลางหัว ซี่กรองเหงือกเป็นเส้นหนา ซี่จึกบริเวณขอบด้าน
หลังก้านครีบแข็งของครีบหลังซี่ลง ขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบหลังไม่เป็นซี่จึก ซี่จึก
บริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกมีขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดไล่
เลี่ยกัน กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้าง ยาวน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างของฐาน ความ
ยาวจะงอยปาก 34.27 – 39.47 (36.71 ± 1.433) %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา 6.41 – 9.87 (8.15 ± 0.884) %HL ระยะห่างระหว่างตา 29.17 – 33.30 (30.62 ± 1.132) %HL ความลึกและความกว้าง
ของหัวบริเวณตา 23.39 – 33.13 (26.91 ± 2.427) และ 54.14 – 62.92 (59.36 ± 1.956) %HL ความ
กว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process 5.76 – 8.17 (6.72 ± 0.615) และ 9.15 –
12.39 (10.98 ± 0.857) % HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก
ครีบหลัง ครีบท้อง รูทวาร ครีบไขมันและครีบกัน 21.94 – 26.11 (24.52 ± 1.013), 40.25 – 45.92
(43.37 ± 1.217), 51.31 – 59.02 (56.17 ± 1.57), 58.95 – 65.11 (62.7 ± 1.377), 61.69 – 69.03 (66.73

± 2.004) และ $71.11 - 77.80$ (75.09 ± 1.716) %SL ความยาวฐานครีบทิ้ง ครีบทิ้ง และ ครีบทิ้ง $12.43 - 14.56$ (13.68 ± 0.566), $20.10 - 27.42$ (22.18 ± 2.063) และ $9.97 - 12.95$ (11.71 ± 0.726) %SL ความยาวก้านครีบทิ้งของครีบทิ้งและครีบทิ้ง $12.24 - 14.80$ (13.57 ± 0.62) และ $12.69 - 16.03$ (13.82 ± 0.796) %SL ความยาวคอดหาง $12.37 - 16.19$ (14.67 ± 0.81) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบทิ้งถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบทิ้ง $11.46 - 13.40$ (12.2 ± 0.477) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 70)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวเกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าและร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องยาว กระดูก supraoccipital process สั้น ยาวไม่เกิน 2 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่โค้งลงส่วนล่างและมี process 1 อัน แถบฟัน vomerine teeth กว้างและโค้งยาว แถบฟัน mandibular teeth โค้งยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก nasal ยาว กระดูก infraorbital ขึ้นที่ 2 และ 5 ยาวมากกว่าขึ้นที่ 1, 3 และ 4 กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้น และปลายเรียวยาวแหลม กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และ hyomandibular กระดูก interopercle แบนกว้าง ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal เป็น process ยาว ยาวเป็น 2-2.5 เท่าของความกว้างฐาน process กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แผ่กว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process และมีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ได้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural spine ยาว ความยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างเรียวยาว และมีปลายแหลม กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารรูปร่างยาวรี ลำไส้ยาวไม่เกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร ใต้ส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย กระเพาะลมมีหลายเส้นกระจายทั่วบริเวณผิว

ลักษณะของสี

แนวด้านหลังและตอนกลางลำตัวมีสีดำ แนวด้านล่างลำตัวและส่วนท้องมีสีขาว แนวขอบของฝาปิดเหงือก และแนวด้านบนของของตามีสีขาว หนวดที่ขากรรไกรบนมีสีขาว หนวดบริเวณงูมีสีดำ หนวดบริเวณขากรรไกรล่างมีสีขาว ครีบทิ้ง ครีบทิ้ง ครีบทิ้ง ครีบทิ้ง และ

กริบหางมีสีดำ แต่บริเวณขอบด้านหน้าของกริบท้องและกริบก้นมีสีขาว ขอบด้านบนและของด้านล่างของกริบหางมีสีขาว

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

Hemibagrus wycki มีการกระจายพันธุ์ในเกาะบอร์เนียว ชวา สุมาตรา มาเลเซีย ลาว และ กัมพูชา (Roberts, 1989; Rainboth, 1996; Kottelat, 1998) อาหารที่ปลากินได้แก่ แมลง กุ้ง และ ปลาขนาดเล็ก (Rainboth, 1996) ในไทยพบที่ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และ ลุ่มน้ำแม่กลอง (ภาพที่ 71) ปลาอาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ เครื่องมือประมงที่ใช้จับได้แก่ เบ็ด เบ็ดราว อวน และข่าย ในตลาดพบขายในรูปปลาสดและปลาสวยงาม


ภาพที่ 70 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Hemibagrus wycki*


70.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก


a. แนวค้ำบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบท้อง, d. กระดูก humero-cubital process

70.2 ลักษณะทางกายวิภาค

c. แนวค้ำบนของกะโหลกศีรษะ, f. แนวค้ำล่างของกะโหลกศีรษะ, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวค้ำบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวค้ำล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม







ภาพที่ 72 *Hemibagrus mekongensis* n.sp.

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Hemibagrus mekongensis* n.sp. (ภาพผนวกที่ 8)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : กคขาว

ชื่อสามัญ (common name) : Bagrid catfish

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 57 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 138.4-280.2 mm SL

ลุ่มน้ำแม่โขง Holotype: KUMF 6559 (1 ตัวอย่าง, 280.2 mm SL) ตลาคน่านาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ภาสกร แสนจันแดง 19 ตุลาคม 2540; Paratype: KUMF 6560 (54, 138.4-261.2) อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ภาสกร แสนจันแดง 23 - 25 ตุลาคม 2541; NIFI UNCAT. (2, 176.1-256.8) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ขวดี วิทยานนท์ 7-8 เมษายน 2533

ลักษณะเด่นของชนิด

Hemibagrus mekongensis n.sp. แตกต่างจาก *Hemibagrus nemurus* โดยมีจะงอยปากแคบ ค่อนข้างแหลม ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ขาวไม่เกินปลายของกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวแคบ ส่วนที่กว้างที่สุดของกระดูก lateral ethmoid กว้างน้อยกว่ากระดูก frontal ปลาชนิดนี้แตกต่างจาก *H. filamentus* โดยมีครีบอกสั้นกว่า และจุดสิ้นสุดของตะครีบอกหลังลงในแนวระนาบยาวไม่ถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก

ลักษณะทั่วไป

D.I 7; A.iii-iv / 7-9; C.8/7; P.I 8-9; V.i5; BR.11-14; GR12-15; VC42-44

หัวรูปร่างแบนลง ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัว มีผิวหนังปกคลุม เยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอซ้อนทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตาไม่มีผิวหนังคลุม หนวคมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงครีบก้น หนวดบริเวณจมูก ยาวเกินขอบด้านหลังของตา หนวดคู่หนึ่งที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณโคนครีบอก หนวดคู่หนึ่งที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณคอดคอ ซึ่งร่องเหงือกเป็นเส้นหนา ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบก้นของครีบล้างซีก ขอบด้านหน้าก้านครีบก้นของครีบล้างไม่เป็นซี่จึก ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบก้นของครีบอกมีขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดไล่เลี่ยกัน กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้าง ยาวน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาวจะงอยปาก $38.32 - 42.83$ (39.86 ± 0.917) %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา $13.82 - 19.25$ (16.79 ± 0.919) %HL ระยะห่างระหว่างตา $27.01 - 32.63$ (29.74 ± 1.069) %HL ความลึกและความกว้างของหัว บริเวณตา $28.47 - 36.76$ (32.4 ± 1.835) และ $50.10 - 61.49$ (55.7 ± 2.618) %HL ความกว้างฐาน และความยาวของกระดูก supraoccipital process $5.20 - 7.12$ (5.85 ± 0.408) และ $26.59 - 33.94$ (31.23 ± 1.676) % HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ครีบล้าง ครีบท้อง รูทวาร ครีบไขมันและครีบก้น $22.26 - 25.97$ (23.59 ± 0.757), $37.65 - 41.74$ (39.96 ± 0.808), $49.35 - 54.13$ (52.02 ± 1.083), $55.68 - 62.69$ (59.59 ± 1.330), $66.67 - 73.13$ (69.78 ± 1.187) และ $68.20 - 74.29$ (71.48 ± 1.336) %SL ความยาวฐานครีบล้าง ครีบไขมัน และ ครีบก้น $14.68 - 16.79$ (16.00 ± 0.443), $11.28 - 15.71$ (14.00 ± 0.775) และ $10.60 - 13.07$ (12.03 ± 0.5) %SL ความยาวก้านครีบก้นของครีบอกและครีบล้าง $17.37 - 21.34$ (19.6 ± 0.821) และ $14.65 - 18.70$ (16.93 ± 0.835) %SL ความยาวคอดหาง $12.07 - 18.59$ (17.13 ± 0.893) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบไขมันถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบก้น $15.63 - 18.49$ (17.19 ± 0.589) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 73)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวไม่เกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าและร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องยาว กระดูก supraoccipital process ยาวมากกว่า 4 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก

lateral ethmoid ไม่มี process และไม่โค้งลงส่วนล่าง แฉกฟัน vomerine teeth กว้างและโค้งยาว แฉกฟัน mandibular teeth โค้งยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก nasal ยาว กระดูก infraorbital ขึ้นที่ 2 และ 5 ยาวมากกว่าขึ้นที่ 1, 3 และ 4 กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้น และปลายเรียวแหลม กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และ hyomandibular กระดูก interopercle แบนกว้าง ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal เป็น process ยาว ยาวเป็น 2-2.5 เท่าของความกว้างฐาน process กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แฉกกว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process และมีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ได้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural spine ยาว ความยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างเรียวยาว และมีปลายแหลม กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้าง เฉพาะส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารรูปร่างยาวรี ลำไส้ยาวไม่เกิน 4 เท่าของความยาว กระเพาะอาหาร ใต้ส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย กระเพาะลมมีหลายเส้นกระจายทั่วบริเวณผิว

ลักษณะของสี

บริเวณแนวด้านหลังและตอนกลางของลำตัวมีสีน้ำตาลปนเทาจางๆ แนวด้านล่างของลำตัวและท้องมีสีขาว หนวดบริเวณกระดูก ขากรรไกรบน หนวดบริเวณจมูกและหนวดบริเวณ ขากรรไกรล่าง มีสีขาว ครีบอก ครีบท้อง และ ครีบท้องมีสีเทาจาง ครีบท้องและครีบก้นมีสีขาว

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

ปลาคชขามีการกระจายพันธุ์อยู่เฉพาะในบริเวณลุ่มน้ำโขง (ภาพที่ 74) ปลายมีหูกลม ในแม่น้ำมูล บริเวณหน้าเขื่อนปากมูล เครื่องมือประมงที่ใช้จับคือ แห ข่าย และเบ็ด ในตลาดพบขายในรูปปลาสด

ภาพที่ 73 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Hemibagrus mekongensis*


n.sp.


73.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก


a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบท้อง, d. กระดูก humero-cubital process

73.2 ลักษณะทางกายวิภาค

e. แนวด้านบนของกะโหลกศีรษะ, f. แนวด้านล่างของกะโหลกศีรษะ, g. แฉกฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม







ภาพที่ 75 *Hemibagrus elegans* n.sp.

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Hemibagrus elegans* n.sp. (ภาพผนวกที่ 11.9)

ชื่อท้องถิ่น (local name): กค

ชื่อสามัญ (common name) : Bagrid catfish

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 13 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 106.3-239.4 mm SL

ลุ่มน้ำตะนาวศรี Holotype: NIFI 2597 (1 ตัวอย่าง, 153.2 mm SL) แม่น้ำตะนาวศรี ติดกับเขต จ. ราชบุรี ชวลิต วิทยานนท์ และ กิตติพงษ์ จารุธานินทร์ 20-21 ธันวาคม 2536; Paratype: NIFI 2583 (12, 106.3-239.4) แม่น้ำตะนาวศรี ติดกับเขต จ.ราชบุรี ชวลิต วิทยานนท์ และ กิตติพงษ์ จารุธานินทร์ 20-21 ธันวาคม 2536

ลักษณะเด่นของชนิด

Hemibagrus elegans n.sp. แตกต่างจากปลา *Hemibagrus microphthalmus* โดยมีซี่กรงเหงือกเพรียวยาวและมีจำนวนมากกว่า (17-24 vs. 9-14 อัน) ขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จัก ซึ่งจักอันสุดท้ายบริเวณส่วนปลายก้านครีบแข็งของครีบอกไม่โค้งยาวคล้ายตะขอ

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.iii-iv / 7-8; C.8/7; P.I 8-10; V.i5; BR.12; GR17-24; VC49

หัวรูปร่างแบนลง ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัวมีผิวหนังปกคลุม เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอซ้อนทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตาไม่มีผิวหนังคลุม หนวดมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงครีบก้น หนวดบริเวณจมูกยาวเกินขอบด้านหลังของตา หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณตอนกลางครีบอก หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณคอดคอ ซึ่งกรองเหงือกเป็นเส้นเรียวยาว ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบล้างซี่ลง ขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบล้างไม่เป็นซี่จึก ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกมีขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดไล่เลี่ยกัน ความยาวจะงอยปาก $37.28 - 42.33$ (38.87 ± 1.391) %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา $15.06 - 24.73$ (20.49 ± 2.277) %HL ระยะห่างระหว่างตา $25.36 - 30.62$ (27.06 ± 1.638) %HL ความลึกและความกว้างของหัวบริเวณตา $35.78 - 43.84$ (38.94 ± 2.559) และ $51.26 - 62.92$ (56.87 ± 3.717) %HL ความกว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process $5.20 - 6.81$ (5.84 ± 0.539) และ $11.87 - 16.14$ (14.46 ± 1.367) % HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ครีบล้าง ครีบท้อง รูทวาร ครีบไขมันและครีบก้น $20.97 - 23.48$ (21.92 ± 0.72), $34.15 - 38.05$ (36.70 ± 1.096), $48.19 - 52.59$ (50.35 ± 1.294), $56.01 - 60.61$ (57.49 ± 1.325), $53.63 - 58.78$ (55.55 ± 1.89) และ $67.34 - 72.93$ (70.01 ± 1.723) %SL ความยาวฐานครีบล้าง ครีบไขมัน และ ครีบก้น $13.32 - 16.35$ (14.91 ± 0.802), $28.45 - 35.41$ (32.73 ± 2.028) และ $10.29 - 13.45$ (11.66 ± 0.706) %SL ความยาวก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบล้าง $12.32 - 15.25$ (13.76 ± 0.768) และ $12.86 - 17.34$ (15.68 ± 1.243) %SL ความยาวคอดหาง $17.15 - 20.25$ (18.64 ± 0.907) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบไขมันถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบก้น $10.77 - 14.22$ (12.91 ± 0.779) %SL

โครงสร้างภายนอกบางลักษณะแสดงไว้ตามภาพที่ 76

ลักษณะของสี


ลำตัวโดยรวมมีสีน้ำตาลอ่อนปนเทาและมีจุดสีดำขนาดใหญ่กระจายเป็นแถบในแนวขวาง ส่วนท้องมีสีขาว หนวดทุกคู่มีสีขาว ครีบอก ครีบลึง ครีบก้น และ ครีบท้องมีสีเทาอ่อน ครีบท้องมีสีขาว

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

ลุ่มน้ำตะนาวศรีในบริเวณเขตชายแดนพม่าตรงข้ามกับ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (ภาพที่ 77) โดยตัวอย่างจากแม่น้ำตะนาวศรีจับโดยใช้เครื่องมือประมงคือ อวนทับตลิ่ง


หมายเหตุ

เนื่องจากตัวอย่างปลาชนิดนี้หายากและมีจำนวนน้อย ตัวอย่างทั้งหมดเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของกรมประมง จึงไม่สามารถหาตัวอย่างมาศึกษาทางกายวิภาคได้



ภาพที่ 76 ลักษณะโครงสร้างภายนอกของปลาชนิด *Hemibagrus elegans* n.sp.

a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซีกกรองเหงือก, c. ก้านครีบท้องของครีบอกและครีบท้อง



สกุลปลาเข่งหิน Genus *Leiocassis* Bleeker, 1858

Leiocassis Bleeker, 1858 : 59, 139 (type species : *Bagrus poecilopterus* Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1839, by subsequent designation of the Bleeker, 1862 : 9)

Leiocassis Günther, 1864 : 65 (unwarranted spelling emendation)

Pseudomystus Jayaram, 1968 : 359 (type species : *Bagrus stenomus* Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1839, by original designation; described as subgenus of *Leiocassis*)


ลักษณะเด่นของสกุล

ปลาในสกุลนี้มีลักษณะคล้ายกับสกุล *Batasio* แตกต่างโดยกระดูก metapterygoid เชื่อมติดต่อกระดูก quadrate และ hyomandibular กระดูก interopercle รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม

ลักษณะทั่วไปของสกุล

ส่วนหัวและลำตัวส่วนหน้าแบนลงเล็กน้อย ลำตัวส่วนท้ายแบนข้าง หัวแบนข้าง หรือแบนลงเล็กน้อยบริเวณส่วนหน้าของหัว ตามีผิวหนังคลุม ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณหัวไม่มีรูรับความรู้สึก หนวดที่ขากรรไกรบนสั้นยาวไม่ถึงตอนปลายของครีบอก ขอบด้านหลังของก้านครีบอกแข็งของครีบอกหลังเป็นซี่จักซี่ลง ครีบไขมันมีฐานยาวเกือบถึงครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัว เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอไม่ซ้อนทับกัน กระดูก mesethmoid รูปร่างเป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนหน้ามีส่วนที่ยื่นออกด้านข้าง ขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และไม่โค้งลงด้านล่าง ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเชื่อมหรือไม่เชื่อมติดต่อกับร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลัง ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเป็นร่องยาว ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องยาว หรือ เป็นร่องรูปวงรีขนาดเล็ก กระดูก supraoccipital process สั้นหรือยาว แถบฟัน vomerine teeth สั้น แถบฟัน mandibular teeth สั้นหรือโค้งยาว ซี่กรงเหงือกเป็นเส้นเรียวยาวหรือเป็นเส้นหนา ขอบด้านหลังก้านครีบอกแข็งของครีบอกเป็นซี่จัก มีความยาวใกล้เคียงกัน กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้นและปลายเรียวแหลม กระดูก infraorbital ทุกชิ้นมีความยาวใกล้เคียงกัน กระดูก nasal สั้น กระดูก maxilla สั้น กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนกว้าง เชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และ hyomandibular กระดูก interopercle ขนาดใหญ่ แบนและกว้างกว่าทางตอนท้าย รูปร่างคล้าย

สามเหลี่ยม กระดูก branchiostegal ray มีลักษณะเป็นเส้นเรียวยาวทั้งหมดทุกก้าน ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal สั้น ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal ใต้ process เป็นแผ่นแบน (ยกเว้น *Leiocassis stenomus*) กระดูก pelvic girdle กว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle เท่านั้นหรือแผ่กว้างถึงส่วนหน้า กระเพาะอาหารมีรูปร่างกลมมน ลำไส้ยาวหรือสั้น กระเพาะลมมีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจและไม่มีลายเส้นกระจายบริเวณผิว ใต้ส่วนหลังมีรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย (Y)



ภาพที่ 78 *Leiocassis micropogon* (Bleeker, 1858)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Leiocassis micropogon* (Bleeker, 1858) (ภาพผนวกที่ 11.10)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : แขนงหิน

ชื่อสามัญ (common name) : Asian bumblebee catfish, Siamese rock catfish

Bagrus micropogon Bleeker, 1852 : 94 (type locality : Blitong [=Billiton] in flumine Tjirutjup)

Leiocassis micropogon Bleeker, 1858 : 142

?*Liocassis baramensis* Regan, 1906 : 67 (type locality : Baram river)

?*Liocassis hosii* Regan, 1906 : 67 (type locality : Sibul, Sarawak)

?*Liocassis merabensis* Regan, 1913 : 550 (type locality : Merabeh, North Borneo)

?*Leocassis doriae* Regan, 1913 : 551 (type locality : Borneo)

?*Liocassis chaseni*, de Beaufort, 1933 : 34 (type locality Ulu Jelao, Malay Peninsula) see Hora and Gupta (1941: 25)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 3 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 58.1-122.2 mm SL

ผู้นำภาคใต้ NIFI UNCAT. (3 ตัวอย่าง, 58.1-122.2 mm SL) คำนวณสายบุรี จ.นราธิวาส ขวลิขิต
วิทยานนท์ มีนาคม 2541

ลักษณะเด่นของชนิด

Leiocassis micropogon แตกต่างจากปลาในสกุล *Leiocassis* ที่พบในประเทศไทย ชนิดอื่น โดยมีความกว้างของหัวบริเวณตาค่อนข้างน้อย (46 – 50 vs. > 52 %HL) ปลาของจะงอยปากเป็นมุมแหลมเมื่อมองจากด้านล่างของหัว

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.iii-iv / 11-13; C.8/7; P.I 8; V.i5; BR10; G.R.15-16; VC39

หัวมีรูปร่างแบนข้าง จะงอยปากกลมมน ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัวมีผิวหนังปกคลุม เยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอซ้อนทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตามีผิวหนังคลุม หนวคมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวไม่ถึงตอนกลางของครีบอก หนวดบริเวณจมูกยาวถึงขอบด้านหน้าของตา หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวไม่ถึงบริเวณคอดคอ หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวไม่ถึงกึ่งกลางหัว หัวไม่มีรูรับความรู้สึก ซี่กรองเหงือกเป็นเส้นเรียวยาว ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบท้องซี่ลง ขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบท้องไม่เป็นซี่จัก ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกมีขนาดใหญ่ ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน ความยาวจะงอยปาก 35.73 – 37.70 (36.92 ± 1.042) %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา 14.93 – 17.28 (16.16 ± 1.176) %HL ระยะห่างระหว่างตา 26.79 – 30.89 (28.21 ± 2.326) %HL ความลึกและความกว้างของหัวบริเวณตา 36.80 – 39.27 (38.43 ± 1.415) และ 46.89 – 50.26 (48.3 ± 1.755) %HL ความกว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process 10.40 – 11.52 (11.13 ± 0.636) และ 20.27 – 22.51 (21.44 ± 1.126) % HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ครีบท้อง ครีบท้อง รูทวาร ครีบท้อง และครีบก้น 23.90 – 25.47 (24.74 ± 0.795), 39.93 – 41.26 (40.57 ± 0.665), 52.30 – 55.89 (53.56 ± 2.02), 62.31 – 64.08 (63.34 ± 0.923), 63.34 – 66.44 (64.89 ± 1.547) และ 66.56 – 69.02 (67.64 ± 1.254) %SL ความยาวฐานครีบท้อง ครีบท้อง และ ครีบก้น 11.95 – 13.94 (12.62 ± 1.147), 18.56 – 21.00 (19.70 ± 1.227) และ 15.22 – 16.18 (15.78 ± 0.500) %SL ความยาวก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบท้อง 16.61 – 19.62 (17.85 ± 1.571) และ 17.04 – 19.17 (17.77 ± 1.213)

%SL ความยาวคอดหาง 16.18 – 18.25 (17.01 ± 1.093) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบทันถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบทาง 15.83 – 16.94 (16.45 ± 0.562) %SL

โครงสร้างภายนอกบางลักษณะแสดงไว้ตามภาพที่ 79

ลักษณะของสี

บริเวณหัวมีสีเหลืองปนน้ำตาลและมีแถบสีน้ำตาลเข้มรูปตัววาย (Y) พาดผ่านบริเวณตา โดยแนวฐานรูปตัวยามีทิศชี้ไปทางปลายจะงอยปาก บริเวณจุดเริ่มต้นทางแยกของปลายทั้งสองของรูปตัววายอยู่บริเวณตา บริเวณใต้แนวของกระดูก supraoccipital process จนถึงบริเวณแนวของฐานครีบทันมีแถบสีน้ำตาลเข้มขนาดใหญ่พาดขวางลงมาถึงบริเวณใต้แนวของเส้นข้างตัว โดยตอนหน้าของแถบอยู่บริเวณเหนือจุดเริ่มต้นของฐานครีบทอง ตอนท้ายของแถบอยู่บริเวณเหนือรูกันบริเวณท้องมีสีเหลืองปนน้ำตาลอ่อน บริเวณโคนครีบท้องมีแถบคล้ายรูปวงกลมเล็กๆสีดำ บริเวณใต้แนวระหว่างจุดสิ้นสุดของครีบทันและส่วนต้นของครีบทันมีแถบขวางสีเหลืองปนน้ำตาล 2 แถบ โดยแถบแรกอยู่เหนือบริเวณแนวเส้นข้างตัว ส่วนแถบที่สองอยู่ใต้แนวเส้นข้างตัวและมีขนาดใหญ่กว่าแถบแรก บริเวณครีบทันและแนวด้านล่างของครีบทันจนถึงบริเวณฐานครีบทางมีสีน้ำตาลเข้ม ยกเว้น บริเวณตอนปลายของแนวด้านล่างของครีบทันมีแถบสีเหลืองอ่อนรูปวงรีขนาดเล็กอยู่ 1 แถบ และในบริเวณใต้ฐานตอนปลายของครีบทันมีแถบเล็กๆสีเหลืองอ่อนปนน้ำตาลอยู่ 2 แถบ โดยแถบแรกอยู่บริเวณเหนือแนวเส้นข้างตัว แถบที่สองมีขนาดใหญ่กว่าและอยู่ใต้แนวเส้นข้างตัว หนวดบริเวณงูขี้เหล็ก ขากรรไกรบน และ ขากรรไกรล่างมีสีขาว ครีบทองมีสีเหลืองปนน้ำตาล ครีบทัน ครีบท้อง และ ครีบทันมีสีเหลืองจางๆ ยกเว้นบริเวณโคนครีบท้องและในบริเวณเกือบสุดแนวตอนปลายของครีบทันมีแถบขวางสีดำพาดผ่าน ครีบทางมีสีเหลืองปนน้ำตาลยกเว้นบริเวณโคนครีบท้องและตอนปลายของครีบทันมีแถบขวางสีดำรูปตัวดับเบิลยู (W) โดยส่วนบนของตัวดับเบิลยูมีทิศชี้มายังโคนของครีบทาง

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

Leiocassis micropogon มีการกระจายพันธุ์ในบริเวณเกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียว และประเทศมาเลเซีย (Roberts, 1989) ในประเทศไทยพบปลาชนิดนี้ที่บริเวณต้นน้ำสายบุรี จ.


นราธิวาส (ภาพที่ 80) โดยปลาอาศัยอยู่บริเวณโพรงหินในระดับความลึกประมาณ 1.7 เมตร ในบริเวณลำธารที่มีกระแสน้ำไหลเฉื่อยๆ

ข้อสังเกต

ยังไม่มีเคยมีรายงานว่าพบ *Leiocassis micropogon* ในประเทศไทยมาก่อน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงถือเป็นรายงานการพบครั้งแรกของประเทศไทย


หมายเหตุ


เนื่องจากตัวอย่างปลาชนิดนี้หายากและมีจำนวนน้อย ตัวอย่างทั้งหมดเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของกรมประมง จึงไม่สามารถหาตัวอย่างมาศึกษาทางกายวิภาคได้



ภาพที่ 79 ลักษณะโครงสร้างภายนอกของปลาสันติ *Leiocassis micropogon*

a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบหลัง





ภาพที่ 81 *Leiocassis poecilopterus* (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes., 1839)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Leiocassis poecilopterus* (Valenciennes in Cuv. & Val., 1839)

(ภาพผนวกที่ 11.11)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : แขนงขี้ไก่

ชื่อสามัญ (common name) : Asian bumblebee catfish, Siamese rock catfish

Bagrus poecilopterus Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1839 (type locality: Java)

Leiocassis poecilopterus Peters, 1869 (Siam)

Leiocassis poecilopterus Weber and de Beaufort, 1913 (Siam)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 10 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 24.6-45.9 mm SL

ลุ่มน้ำภาคใต้ KUMF 6561 (6 ตัวอย่าง, 33.9-45.9 mm SL) พรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส ประจิม
วงศัรต์ 29 พฤษภาคม 2531; NIFI 2702 (3, 24.6-30.5) คลองโต๊ะแดง จ.นราธิวาส ขวลิค
วิทยานนท์ 6-8 กุมภาพันธ์ 2537; KUMF 6562 (1, 45.8) พรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส กิตติพงษ์
จรรุณนินทร์ 5 มีนาคม 2541

ลักษณะเด่นของชนิด

Liocassis poecilopterus แตกต่างจาก *L. siamensis* โดยมีแถบฟัน mandibulary teeth แคบ โค้งยาว ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าและส่วนหลังแยกกัน ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังมีขนาดเล็ก คล้ายวงรี กระดูก supraoccipital process กว้าง ยาวไม่เกิน 2 เท่าของความกว้างของฐาน ปลายครีบทหางกลมมน

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.iii-iv / 10-11; C.8/7; P.I 6-7; V.i5; BR7-8; G.R.8-9; VC36

หัวมีรูปร่างแบนลงโดยเฉพาะส่วนปลายของหัว ปากกว้างตามขนาดของปลาย จะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัวมีผิวหนังปกคลุม เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอซ้อนทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตามีผิวหนังคลุม หนวดมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวไม่ถึงตอนกลางของครีบอก หนวดบริเวณจมูกยาวถึงบริเวณตอนท้ายของหัว หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวไม่ถึงบริเวณโคนครีบอก หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณคอดคอ หัวมีรูรับความรู้สึก ซึ่งร่องเหงือกเป็นเส้นหนาและสั้น ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบทึงของครีบทหลัง ซึ่ง ขอบด้านหน้าก้านครีบทึงของครีบทหลังไม่เป็นซี่จึก ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบทึงของครีบทอกมีขนาดใหญ่ ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดเล็กต่างกัน กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้าง ยาวน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาวจะงอยปาก 31.62 – 35.82 (34.14 ± 1.397) %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา 12.64 – 15.22 (14.23 ± 0.83) %HL ระยะห่างระหว่างตา 28.68 – 37.96 (33.24 ± 2.98) %HL ความลึกและความกว้างของหัวบริเวณตา 38.04 – 46.09 (42.77 ± 2.537) และ 55.17 – 66.42 (60.04 ± 3.515) %HL ความกว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process 14.94 – 19.64 (17.46 ± 1.741) และ 17.39 – 26.73 (22.34 ± 3.18) %HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบทอก ครีบทหลัง ครีบท้อง รูทวาร ครีบทไฉมันและครีบทัน 19.87 – 24.80 (22.31 ± 1.690), 34.72 – 39.00 (37.52 ± 1.196), 48.37 – 53.32 (51.53 ± 1.565), 53.66 – 60.48 (56.96 ± 2.064), 53.21 – 63.28 (57.75 ± 3.351) และ 62.57 – 68.17 (65.25 ± 1.902) %SL ความยาวฐานครีบทหลัง ครีบทไฉมัน และ ครีบทัน 11.94 – 15.99 (13.93 ± 1.18), 21.18 – 31.59 (27.09 ± 3.877) และ 16.12 – 19.52 (17.65 ± 1.278) %SL ความยาวก้านครีบท

แข็งของครีบอกและครีบท้อง 19.15 – 23.61 (21.11 ± 1.492) และ 14.13 – 18.78 (16.85 ± 1.631) %SL ความยาวคอดหาง 17.48 – 20.48 (18.96 ± 0.923) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบท้องถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบท้อง 15.45 – 18.29 (17.23 ± 0.913) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 82)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวไม่เกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าแยกห่างจากร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลัง ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องรูปวงรีขนาดเล็ก กระดูก supraoccipital process สั้น ยาวไม่เกิน 2 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และไม่โค้งลงส่วนล่าง แถบฟัน vomerine teeth แคบและยาว แถบฟัน mandibular teeth โค้งยาว กระดูก maxilla สั้น กระดูก nasal สั้น กระดูก infraorbital ทุกชิ้นมีความยาวใกล้เคียงกัน กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้น กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และ hyomandibular กระดูก interopercle แบนกว้าง และมีรูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยม ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal ยาวไม่ถึง 1 เท่าของความกว้างของฐาน process กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แฉกกว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาวทุกก้าน ยกเว้นก้านสุดท้ายและร่องสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process มีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ได้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural spine สั้น ยาวไม่เกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างเรียวยาว และมีปลายแหลม กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างจากที่ส่วนท้ายของ girdle และแผ่ไปถึงส่วนหน้า

ลักษณะของสี

สีโดยรวมของลำตัวมีสีเทาดำและมีแถบขวางสีขาวพาดขวางลำตัว โดยแถบแรกมีขนาดค่อนข้างแคบมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณตอนปลายของกระดูก supraoccipital process พาดขวางลงมาตามแนวของช่องเปิดเหงือก แถบที่สองมีขนาดกว้างและมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณจุดสิ้นสุดของฐานครีบท้องพาดขวางลงมาถึงบริเวณระหว่างจุดสิ้นสุดของฐานครีบท้องและจุดเริ่มต้นของครีบท้อง แถบที่สามมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณตอนปลายของครีบท้องมันพาดขวางลงมาถึงบริเวณจุดสิ้นสุดของ

ฐานครีบก้น นอกจากนี้ยังมีแถบสีขาวเล็กๆในบริเวณจุดเริ่มต้นของครีบก้น แนวด้านบนและล่างของคอดหาง หนวดบริเวณจมูกและขากรรไกรบนมีสีขาวยกเว้นบริเวณโคนหนวดมีสีเทา หนวดบริเวณขากรรไกรล่างมีสีขาว ครีบอกมีสีเทา ครีบล้าง ครีบท้อง และ ครีบก้นมีสีขาว ยกเว้น บริเวณโคนครีบล้างและแนวเกือบจะถึงตอนปลายของครีบล้างมีสีเทาปนดำพาดขวางแนวครีบล้าง บริเวณฐานครีบล้างมีแถบสีขาวรูปตัวดับเบิลยู (W) โดยแถบมีทิศทางด้านบนของรูปตัวดับเบิลยูเข้ามายังส่วนฐานบริเวณตอนกลางของครีบล้างมีแถบสีดำพาดผ่านในแนวขวาง ส่วนบริเวณตอนปลายของครีบล้างมีสีขาว

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

Leiocassis poecilopterus มีการกระจายพันธุ์ในบริเวณเกาะสุมาตรา เกาะชวาและเกาะบอร์เนียว (Weber และ de Beaufort, 1913) ในไทยพบบริเวณ พรุ โต๊ะแดง จ.นราธิวาส (ภาพที่ 83)

ข้อสังเกต

Leiocassis poecilopterus เป็นปลาที่มีขนาดเล็ก ตัวอย่างที่ใช้ศึกษามีความยาวสูงสุดเพียง 45.9 mm SL เท่านั้น


ภาพที่ 82 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Leiocassis poecilopterus*

82.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก


a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบท้อง, d. กระดูก humero-cubital process

82.2 ลักษณะทางกายวิภาค


e. แนวด้านบนของกะโหลกหัว, f. แนวด้านล่างของกะโหลกหัว, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal




a




b




c




d




e



f




g




h




i




j




k




l




m




n



o




p




q



r





ภาพที่ 84 *Leiocassis siamensis* (Regan, 1913)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Leiocassis siamensis* (Regan, 1913) (ภาพผนวกที่ 11.12)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : แขงหิน

ชื่อสามัญ (common name) : Asian bumblebee catfish, Siamese rock catfish

Leiocassis siamensis Regan, 1913 (type locality: Bangpakong River) : Hora, 1923b (Menam Chao Phraya at Nontaburi)

Leiocassis bicolor Fowler, 1934a (Chiangmai, Bua Yai)

Leiocassis albicallaris Fowler, 1934b (Bangkok) ;1937 (Bangkok, Pitsanulok, Mepoon)

Leiocassis albicollis Fowler, 1939 (Trang)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 73 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 44.8-138.2 mm SL

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 0930 (2 ตัวอย่าง, 107.2-130.3 mm SL) ตลาดปากน้ำโพธิ์ H.M. Smith 20 พฤศจิกายน 2466; KUMF 2732 (1, 77.2) จ.สุโขทัย สมบูรณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2517; KUMF 6564 (5, 63.4-91.2) อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ชัยวุฒิ ทรุดพันธ์ 27 มิถุนายน 2541; KUMF 6563 (4, 81.4-103.1) ตลาดปทุมธานี จ.ปทุมธานี ภาสกร แสงจันทร์แดง 10 ตุลาคม 2540; KUMF 6564 (5, 63.4-91.2) อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ชัยวุฒิ ทรุดพันธ์ 27 มิถุนายน 2541

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 6568 (1 ตัวอย่าง, 80.3 mm SL) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาฉกรรจ์ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี สืบสิน สนธิรัตน์ 1 พฤษภาคม 2540; NIFI 00470 (6, 53.8-96.8) น้ำตก

กระทิง จ.จันทบุรี จรัลธาดา กรรณสูต 16 มกราคม 2514; KUMF 6565 (7, 44.8-67.2) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี กิตติพงษ์ จารุธานินทร์ 20 มกราคม 2541

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 6566 (12 ตัวอย่าง, 87.2-122.8 mm SL) อ.ไชยบุรี จ.นครพนม ภาสกร แสนจันแดง 30 พฤษภาคม 2541; KUMF 6567 (9, 72.3-107.3) บ้านอ้วน อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ภาสกร แสนจันแดง 30 พฤษภาคม 2541; KUMF 0937 (2, 86.8-107.6) อ.ปากซ่อง จ.นครราชสีมา H.M. Smith 19 พฤศจิกายน 2468

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 0939 (1 ตัวอย่าง, 96.3 mm SL) แม่กลอง จ.ราชบุรี H.M. Smith 9 มิถุนายน 2470; KUMF 2478 (1, 79.4) จ.กาญจนบุรี ธงชัย 19 มกราคม 2517; KUMF 6569 (1, 70.8) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สืบสิน สนธิรัตน์ 22 กุมภาพันธ์ 2541; NIFI 00467 (1, 138.2) เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี จรัลธาดา กรรณสูต 5 พฤษภาคม 2521

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 0943 (1 ตัวอย่าง, 101.9 mm SL) คลองสก บ้านสก อ.พนม แม่น้ำตาปัดตอนบน R. Havmollerli ตุลาคม-ธันวาคม 2472; NIFI 02159 (3, 58.3-101.2) เขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี รังสันต์ ไชยบุญทัน 26 สิงหาคม 2530; KUMF 00473 (2, 68.2-96.3) แม่น้ำหลังสวน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร จรัลธาดา กรรณสูต กันยายน 2521; KUMF 00471 (3, 93.2-102.8) แม่น้ำปัตตานี อ.บันนังสตา จ.ยะลา จรัลธาดา กรรณสูต 14-24 มีนาคม 2519; KUMF 6570 (6, 87.2-114.1) ตลาดยะลา จ.ยะลา ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 19 กุมภาพันธ์ 2541

ลักษณะเด่นของชนิด

Leiocassis siamensis แตกต่างจาก *L. poecilopterus* และ *L. stenomus* โดยมีแถบฟัน mandibulary teeth สั้น รูปร่างคล้ายกระสวย ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าและส่วนหลังมีลักษณะเป็นร่องยาวเชื่อมติดต่อกัน ขอบของกระดูก lateral ethmoid มี process 2 อัน กระดูก supraoccipital process ยาว ยาวประมาณ 3 เท่าของความกว้างฐาน

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.iii-v / 10-12; C.8/7; P.I 7-8; V.i5; BR7-9; G.R.11-16; VC37-39

หัวมีรูปร่างแบนลงเล็กน้อยโดยเฉพาะส่วนปลายของหัว ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัวมีผิวหนังปกคลุม เยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอซ้อนทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตามีผิวหนังคลุม หนวคมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวไม่ถึงตอนกลางของครีบอก หนวดบริเวณงมูกยาวถึงบริเวณตอนท้ายของหัว หนวดคู่บนอกที่ขากรรไกรล่างยาวไม่ถึงบริเวณคอดคอ หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวไม่ถึงบริเวณกึ่งกลางหัว หัวไม่มีรูรับความรู้สึก ซึ่งร่องเหงือกเป็นเส้นหนาและสั้น ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบล้างซี่ล่าง ขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบล้างไม่เป็นซี่จัก ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกมีขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดไล่เลี่ยกัน กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้าง ยาวน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาวจะงอยปาก 33.14 – 40.19 (35.99 ± 1.549) %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา 15.38 – 23.12 (18.69 ± 1.408) %HL ระยะห่างระหว่างตา 28.52 – 37.39 (33.46 ± 2.07) %HL ความลึกและความกว้างของหัวบริเวณตา (45.51 ± 2.847) และ (59.92 ± 3.897) %HL ความกว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process 8.16 – 15.58 (11.41 ± 1.842) และ 19.68 – 34.67 (25.82 ± 4.180) % HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ครีบล้าง ครีบท้อง รูทวาร ครีบไขมันและครีบก้น 14.83 – 25.28 (21.68 ± 1.682), 33.42 – 39.35 (36.99 ± 1.270), 49.54 – 56.89 (53.03 ± 1.729), 58.01 – 67.03 (62.06 ± 1.922), 50.95 – 69.98 (62.03 ± 2.926) และ 60.02 – 72.83 (67.72 ± 2.17) %SL ความยาวฐานครีบล้าง ครีบไขมัน และ ครีบก้น 11.55 – 15.26 (13.21 ± 0.805), 16.63 – 28.89 (22.01 ± 2.711) และ 13.07 – 17.39 (15.55 ± 1.039) %SL ความยาวก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบล้าง 17.06 – 23.05 (19.92 ± 1.318) และ 15.98 – 22.74 (19.16 ± 1.422) %SL ความยาวคอดหาง 14.58 – 20.44 (17.36 ± 1.141) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบไขมันถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบหาง 14.01 – 18.56 (16.53 ± 0.972) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 85)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวไม่เกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวเป็นร่องยาว ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเชื่อมติดต่อกับร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลัง กระดูก supraoccipital process ยาว ยาวประมาณ 3 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral ethmoid มี process 2 อัน และไม่โค้งลงส่วนล่าง แฉกฟัน vomerine teeth กว้างและสั้น แฉกฟัน mandibular teeth สั้น มีรูปร่างคล้ายกระดูก กระดูก maxilla สั้น กระดูก nasal สั้น ตอนปลายแผ่กว้าง กระดูก infraorbital ทุกชิ้นมีความยาวใกล้เคียงกัน กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้น และมีปลายเรียวแหลม กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และ hyomandibular กระดูก interopercle แบนกว้าง และมีรูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยม ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal ยาวไม่ถึง 1 เท่าของความกว้างฐาน process กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แผ่กว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาวทุกก้าน ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process มีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ได้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural spine ยาว ยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างเรียวยาว และมีปลายแหลม กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารรูปร่างกลมมน ลำไส้ยาวเกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร ไตส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย (Y) กระเพาะลมไม่มีลายเส้นในบริเวณผิว

ลักษณะของสี

สีโดยรวมของลำตัวมีสีดำยกเว้นบริเวณแนวด้านล่างและแถบขวางของลำตัวมีสีขาว โดยแถบแรกมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณกระดูก supraoccipital process พาดขวางลงมาตามแนวของช่องเปิดเหงือกจนถึงบริเวณส่วนล่างของลำตัว แถบที่สองอยู่บริเวณใต้แนวเส้นข้างตัวโดยมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณตอนปลายของครีบอกและจุดสิ้นสุดของแถบอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของครีบท้อง แถบที่สามมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณระหว่างจุดสิ้นสุดของฐานครีบท้องและจุดเริ่มต้นของครีบท้อง พาดขวางลงมาถึงบริเวณระหว่างจุดสิ้นสุดของครีบท้องและจุดเริ่มต้นของครีบก้น แถบที่สี่อยู่บริเวณจุดสิ้นสุดของครีบท้องพาดขวางลงมาถึงบริเวณจุดสิ้นสุดของฐานครีบก้น นอกจากนี้ยังมีแถบสีขาว

เล็กๆในบริเวณจุดเริ่มต้นของครีบลึง ครีบบน แนวด้านบนและล่างของกอดหาง หนวดบริเวณ
จมูก ขากรรไกรบน และ ขากรรไกรล่างมีสีขาวปนเทา

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

Leiocassis siamensis พบในกลุ่มน้ำโขงเขตประเทศกัมพูชา อาหารที่ปลากินได้แก่ ตัว
อ่อนของแมลงน้ำ (Rainboth, 1996) ในไทยพบที่ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก
ลุ่มน้ำทางภาคตะวันตก และ ลุ่มน้ำทางภาคใต้ (ภาพที่ 86) ปลาชอบอาศัยอยู่ในบริเวณแม่น้ำที่
มีขนาดใหญ่และมีกระแสน้ำเล็กน้อย เครื่องมือประมงที่ใช้จับคือ อวน และข่า ในตลาดพบขายใน
รูปของปลาสดและปลาสวยงาม


ภาพที่ 85 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Leiocassis siamensis*


85.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก


a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบลึง, d. กระดูก humero-cubital process

85.2 ลักษณะทางกายวิภาค

e. แนวด้านบนของกะโหลกหัว, f. แนวด้านล่างของกะโหลกหัว, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม







ภาพที่ 87 *Leiocassis stenomus* (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1839)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Leiocassis stenomus* (Valenciennes in Cuv. & Val., 1839)

(ภาพผนวกที่ 11.13)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : แขนงจืด

ชื่อสามัญ (common name) : Asian bumblebee catfish, Siamese rock catfish

Bagrus stenomus Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1839 (type locality: Java)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 48 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 28.3-78.8 mm SL

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก NIFI 00496 (2, 65.8-66.3) น้ำตกกระทิง จ.จันทบุรี จรัลธาดา กรรณสูต 16 มกราคม 2541; NIFI 00466 (6, 54.9-75.3) น้ำตกกระทิง จ.จันทบุรี ปรีชา เขียวเจริญ 4 มิถุนายน 2509; KUMF 6571 (1, 60.3) จ.จันทบุรี กิตติพงษ์ จารุธานินทร์ 19 มกราคม 2542

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ NIFI 01915 (2 ตัวอย่าง, 53.3-69.2 mm SL) คลองสก จ.สุราษฎร์ธานี M. Kottelat และ T.R. Roberts 5 เมษายน 2528; NIFI 3060 (9, 55.2-78.3) แม่น้ำปัตตานี เขษรพงศ์ 2540; NIFI 00463 (3, 51.8-63.2) แม่น้ำปัตตานี อ.บันนังสตา จ.ยะลา จรัลธาดา กรรณสูต 14-24 มีนาคม 2519; NIFI 2979 (6, 57.8-78.8) ภาคใต้ สมเกียรติ 2539; NIFI UNCAT. (6, 57.3-74.8) เขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี จรัลธาดา กรรณสูต 20 เมษายน 2526; NIFI UNCAT. (3, 28.3-52.8) บริเวณเหนือเขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี ทรงพรรณ ล้ำเลิศเดช 16-17 เมษายน 2529; NIFI UNCAT. (10, 44.5-72.8) ภาคใต้ สมเกียรติ 15 กุมภาพันธ์ 2539

ลักษณะเด่นของชนิด

Leiocassis stenomus แตกต่างจากปลาในสกุล *Leiocassis poecilopterus* โดยมีปลายครีบบางแหลม ซึ่งร่องเหงือกมีจำนวนมากกว่า (10-12 vs. 8-9 อัน) กระดูก humero-cubital process แคบ ยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.iii-v / 10-12; C.8/7; P.I 6-7; V.i5; BR8-10; G.R.10-12; VC39-40

หัวมีรูปร่างแบนลงโดยเฉพาะส่วนปลายของหัว ปากกว้างตามขนาดของปลาย จะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัวมีผิวหนังปกคลุม เยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดกอดคอซ้อนทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตามีผิวหนังคลุม หนวคมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวไม่ถึงตอนกลางของครีบอก หนวดบริเวณจมูกยาวถึงบริเวณตอนท้ายของหัว หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวไม่ถึงบริเวณโคนครีบอก หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณคอดคอ หัวมีรูรับความรู้สึก ซึ่งร่องเหงือกเป็นเส้นหนาและสั้น ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบล้างซี่ลง ขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบล้างไม่เป็นซี่จัก ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกมีขนาดใหญ่ ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน กระดูก humero-cubital process มีฐานแคบ ยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาวจะงอยปาก 31.62 – 42.11 (36.47 ± 2.154) %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา 12.75 – 23.03 (18.66 ± 2.065) %HL ระยะห่างระหว่างตา 27.64 – 41.41 (33.03 ± 2.739) %HL ความลึกและความกว้างของหัวบริเวณตา 40.68 – 57.93 (49.98 ± 3.667) และ 53.25 – 74.81 (66.55 ± 3.953) %HL ความกว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process 9.80 – 19.19 (13.99 ± 1.819) และ 11.56 – 22.22 (18.49 ± 1.740) % HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ครีบล้าง ครีบท้อง รูทวาร ครีบบนและครีบก้น 15.78 – 20.85 (17.78 ± 1.134), 23.11 – 34.28 (31.83 ± 1.573), 45.39 – 55.52 (48.95 ± 1.693), 55.71 – 64.59 (58.60 ± 1.724), 54.39 – 67.94 (63.64 ± 2.562) และ 61.25 – 68.23 (64.72 ± 1.495) %SL ความยาวฐานครีบล้าง ครีบบน และ ครีบก้น 10.69 – 14.72 (12.47 ± 0.819), 15.28 – 24.38 (20.12 ± 1.928) และ 15.17 – 20.49 (17.28 ± 1.162) %SL ความยาวก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบล้าง 17.33 – 21.91 (19.6 ± 1.140)

และ 12.46 – 18.27 (14.99 ± 1.310) %SL ความยาวคอดหาง 16.02 – 20.45 (17.91 ± 1.000) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบก้นถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบก้น 15.64 – 20.45 (17.64 ± 1.081) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 88)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวไม่เกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าแยกห่างจากร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลัง ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องรูปวงรีขนาดเล็ก กระดูก supraoccipital process ยาวไม่เกิน 2 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และไม่โค้งลงส่วนล่าง แถบฟัน vomerine teeth แคบและยาว แถบฟัน mandibular teeth โค้งยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก nasal ยาว กระดูก infraorbital ทุกชิ้นมีความยาวใกล้เคียงกัน กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process ยาว กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และ hyomandibular กระดูก interopercle แบนกว้าง และมีรูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยม ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal ยาวไม่ถึง 1 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แผล้วาง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาวทุกก้าน ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process มีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ใต้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural spine ยาวเท่ากับ ความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างเรียวยาว และมีปลายแหลม กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างจากที่ส่วนท้ายของ girdle และแผ่ไปถึงส่วนหน้า กระเพาะอาหารรูปร่างกลมมน ลำไส้สั้น ยาวไม่เกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร ใต้ส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย (Y) กระเพาะลมไม่มีลายเส้นในบริเวณผิว

ลักษณะของสี

สีลำตัวโดยรวมมีสีน้ำตาลปนดำ ยกเว้นบริเวณแนวด้านล่างของลำตัวมีสีขาวและบริเวณแถบขวางลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน แถบขวางลำตัวแถบแรกมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณจุดสิ้นสุดของครีบก้นหลังพาดผ่านลงมาถึงบริเวณระหว่างจุดสิ้นสุดของครีบก้นและจุดเริ่มต้นของครีบก้นแถบ

ที่สองอยู่บริเวณแนวใต้ฐานของครีบน้ำมันพาดขวางลงมาถึงบริเวณตอนปลายของฐานครีบก้น โดย
 แถบทั้งสองแบ่งเป็นแถบบ่อยด้านบนและด้านล่างแนวเส้นข้างตัว นอกจากนี้ยังมีแถบเล็กๆสีน้ำตาล
 อยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของฐานครีบน้ำมันและบริเวณตอนปลายของขอบบนและล่าง คอดหาง หนวด
 ทุกคู่มีสีขาวปนน้ำตาลจาง ครีบอกมีสีน้ำตาลอ่อน ครีบท้อง ครีบท้องและครีบก้นมีสีขาวขุ่น
 บริเวณโคนครีบก้นและเกือบถึงแนวตอนปลายของครีบก้นมีแถบขาวสีดำ ครีบท้องมีสีน้ำตาลอ่อนและ
 บริเวณเกือบถึงแนวตอนปลายของครีบก้นมีแถบสีดำ

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

Leiocassis stenomus มีการกระจายพันธุ์ในบริเวณเกาะสุมาตรา เกาะชวา เกาะบอร์
 เนียว และ Malacca (Weber และ de Beaufort, 1913) ในไทยพบที่ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออกและลุ่ม
 น้ำทางภาคใต้ (ภาพที่ 89) พบขายในตลาดในรูปของปลาสวยงาม


ภาพที่ 88 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Leiocassis stenomus*

88.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก


a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบลึง, d. กระดูก humero-cubital process

88.2 ลักษณะทางกายวิภาค


e. แนวด้านบนของกะโหลกหัว, f. แนวด้านล่างของกะโหลกหัว, g. แฉกฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม




a




b




c




d




e



f




g




h




i




j




k




l




m



n




o




p




q




r




s



t



u



สกุลปลาเขยง Genus *Mystus* Scopoli, 1777

Mystus Scopoli, 1777 : 451 (type species: *Bagrus halapensis* Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1839, type by subsequent designation)

Macrones Dumeril, 1856 : 484 (type species : *Bagrus lamarii* Valenciennes, in Cuvier and Valenciennes, 1839, by original designation)

Aspidobagrus Bleeker, 1862 : a (type species : *Bagrus gulio* Hamilton-Buchanan, 1822, by original designation and monotypy)

Heterobagrus Bleeker, 1864 (type species : *Heterobagrus bocourti*)

Prajadhipokia Fowler, 1934a (type species : *Prajadhipokia rex*)


ลักษณะเด่นของสกุล

ปลาสกุล *Mystus* แตกต่างจากสกุล *Hemibagrus* โดยมีแถบฟัน vomerine teeth แถบกระดูก metapterygoid เป็นแผ่นรูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอกและเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate ไม่เชื่อมติดต่อกับกระดูก hyomandibular กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process ยาวและมีปลายแหลม ส่วนท้ายของกระดูก urohyal เป็น process สั้น

ลักษณะทั่วไปของสกุล

หัวมีรูปร่างแบนข้างหรือแบนลงเล็กน้อย ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก ตาไม่มีฉีพวงคลุม หนวดที่ขากรรไกรบนยาวเกินครึ่งบอ ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว (ยกเว้น *Mystus mysticetus*) จากขอบด้านหลังของก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จุกซี่ลง ครีบไขมันมีฐานสั้นถึงยาว เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอซ้อนทับกัน กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนหน้ามีส่วนที่ยื่นออกด้านข้าง ขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และโค้งหรือไมโค้งลงด้านล่าง ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเชื่อมติดต่อกับร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลัง ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเป็นร่องยาว ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องยาวหรือลดรูปเป็นร่องขนาดเล็ก กระดูก supraoccipital process ยาว แถบฟัน vomerine teeth แถบและโค้งยาวปานกลาง แถบฟัน mandibular teeth โค้งยาว ซึ่งรองเหงือกเรียวยาว หรือเป็นเส้นหนา ขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบออกเป็นซี่จุก ขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จุกหรือไม่เป็นซี่จุก

ขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จึก กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process ยาว และปลายแหลม กระดูก infraorbital ทุกชิ้นมีความยาวใกล้เคียงกัน (ยกเว้น *Mystus wolffi* มีกระดูกชิ้นที่ 2 ยาว) กระดูก nasal ยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นรูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอกและเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate ไม่เชื่อมติดต่อกับกระดูก hyomandibular กระดูก interopercle มีขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียว ยาว ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal เป็น process ล้วน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal ใต้ process เป็นแผ่นแบน กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างมากที่ส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารมีรูปร่างกลมมน ถ้าได้สั้นหรือยาว กระเพาะลมมีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจและมีลายเส้นกระจายบริเวณผิว ใต้ส่วนหลังมีรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย (Y) หรือสามเหลี่ยม



ภาพที่ 90 *Mystus atrifasciatus* Fowler, 1937

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Mystus atrifasciatus* Fowler, 1937 (ภาพผนวกที่ 11.14)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : แขยง แขยงข้างลาย

ชื่อสามัญ (common name) : striped catfishes

Mystus atrifasciatus Fowler, 1937 : 146 (type locality : Pitsanulok)

Mystus vittatus Smith, 1945 : 385 (in part ; specimen from Rajburi)

Mystus rhegma Bailey in Böhlke, 1984 : 25

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 47 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 55.3-127.4 mm SL

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 0933 (1 ตัวอย่าง, 127.4 mm SL) ปากน้ำโพธิ์ แม่น้ำเจ้าพระยา H.M. Smith
18 พฤศจิกายน 2466

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 2716 (1 ตัวอย่าง, 89.2 mm SL) จ.นครพนม วราวัตรและคณะ 16 ธันวาคม
2516; NIFI 02085 (2, 55.3-73.4) ลำโคมใหญ่ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี รังสันต์ ไชยบุญทัน 13
มกราคม 2530; KUMF 6576 (42, 76.8-108.2) ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ภาสกร แส่น
จันแดง 30 พฤษภาคม 2541

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 0992 (1 ตัวอย่าง, 114.2 mm SL) คลองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี H.M. Smith
9 ตุลาคม 2473

ลักษณะเด่นของชนิด

Mystus atrifasciatus แตกต่างจาก *M. rhegma* โดยมีจุดสิ้นสุดของร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังยาวไม่ถึงฐานของกระดูก supraoccipital process ซึ่งจักมีความยาวใกล้เคียงกัน และอันสุดท้ายไม่โค้งงอคล้ายตะขอ ซึ่งร่องเหงือกมีจำนวนมากกว่า (24-30 vs. 17-21 อัน)

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.ii-iii / 8-11; C.8/7; P.I 7-9; V.i5; B.R.8-10; GR24-30; VC38-39

หัวรูปร่างแบนข้าง ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัวมีผิวหนังปกคลุม เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอซ้อนทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตามีผิวหนังคลุม หนวคมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงครีบก้น หนวดบริเวณจมูกยาวถึงส่วนท้ายของหัว หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณตอนกลางครีบอก หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณโคนครีบอก ซึ่งร่องเหงือกเป็นเส้นเรียวยาว ซึ่งจักบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบกึ่งของครีบท้อง ซึ่งขอบด้านหน้าตอนปลายก้านครีบกึ่งของครีบท้องเป็นซี่จัก ซึ่งจักบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบกึ่งของครีบอกมีขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดเล็กใกล้เคียงกัน กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้าง ยาวน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาวจะงอยปาก 33.48 – 39.61 (36.61 ± 1.548) %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา 18.60 – 29.22 (24.06 ± 1.946) %HL ระยะห่างระหว่างตา 31.03 – 38.72 (35.09 ± 1.802) %HL ความลึกและความกว้างของหัวบริเวณตา 36.71 – 53.13 (47.18 ± 2.947) และ 50.48 – 64.84 (60.11 ± 3.259) %HL ความกว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process 8.70 – 16.92 (14.41 ± 1.264) และ 25.60 – 38.87 (32.31 ± 2.793) % HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ครีบท้อง ครีบท้อง รูทวาร ครีบท้องและครีบก้น 15.21 – 23.70 (20.5 ± 1.586), 29.18 – 39.48 (35.33 ± 1.527), 48.56 – 55.26 (51.26 ± 1.422), 51.81 – 63.31 (57.91 ± 1.952), 48.50 – 59.34 (51.97 ± 1.584) และ 64.81 – 79.60 (70.68 ± 2.259) %SL ความยาวฐานครีบท้อง ครีบท้อง และ ครีบก้น 14.45 – 17.44 (15.9 ± 0.639), 28.34 – 39.61 (34.76 ± 1.916) และ 11.38 – 14.56 (12.90 ± 0.806) %SL ความยาวก้านครีบกึ่งของครีบอกและครีบท้อง 17.49 – 23.04 (19.62 ± 1.123) และ 11.36 – 14.97 (13.02 ± 0.948) %SL ความยาวคอดหาง 15.64 – 19.53 (17.2 ± 0.833)

%SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบน้ำมัน ถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบน้ำง 12.36 – 16.12
(14.06 ± 0.923) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 91)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวไม่เกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเป็นร่องยาว ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องขนาดเล็ก กระดูก supraoccipital process ยาวประมาณ 3 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และโค้งลงส่วนล่าง แฉกฟัน vomerine teeth แคบและโค้งยาว แฉกฟัน mandibular teeth โค้งยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก nasal ยาว กระดูก infraorbital ทุกชิ้นมีความยาวใกล้เคียงกัน กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process ยาว และปลายแหลม กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นรูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอกและเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate ไม่เชื่อมติดต่อกับกระดูก hyomandibular กระดูก interopercle ขนาดใหญ่แบนและกว้างตอนท้าย ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal เป็น process สั้น ยาวไม่ถึง 1 เท่าของความกว้างฐาน process กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แฉกกว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process และมีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ได้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural spine สั้น ยาวไม่ถึง 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างเรียวยาว และมีปลายแหลม กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารรูปร่างกลมมน ลำไส้ยาวไม่เกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร ใต้ส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย กระเพาะลมมีหลายเส้นกระจายทั่วบริเวณผิว

ลักษณะของสี

ปลามีแถบสีดำ 3 แถบ พาดไปตามแนวยาวของลำตัวโดยแถบแรกอยู่ส่วนบนลงลำตัว และมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณฐานของกระดูก supraoccipital process ผ่านแนวของฐานครีบน้ำง ครีบน้ำง มาสิ้นสุดบริเวณแนวตอนบนของฐานครีบน้ำง แถบที่สองอยู่บริเวณแนวเส้นข้างตัว แถบที่สามอยู่ใต้แนวเส้นข้างตัวโดยมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณกระดูก cleithrum พาดยาวมาจนถึงบริเวณเหนือรูกัน บริเวณแนวด้านล่างของลำตัวและส่วนท้องมีสีขาว หนวดบริเวณจมูกและขากรรไกรบน

มีสีเทาอ่อน หนวดบริเวณขากรรไกรล่างมีสีขาว ครีบท้องและครีบกันมีสีเทาอ่อน ครีบหลังและครีบหางมีสีเทาปนน้ำตาล

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

Mystus atrifasciatus พบในกลุ่มน้ำโขงเขตประเทศกัมพูชา ในบริเวณที่เป็นแม่น้ำ ลำธาร และอ่างเก็บน้ำ อาหารที่กินได้แก่ พืชมัลลัสเตเชียน ปลาเล็กปลาน้อย สัตว์น้ำ และแมลงก้นดองสัตว์ เครื่องมือประมงที่ใช้จับคือ อวน ข่าย และแห (Rainboth, 1996) ส่วนในประเทศไทยพบในกลุ่มน้ำโขง กลุ่มน้ำเจ้าพระยา และ กลุ่มน้ำทางภาคตะวันตก (ภาพที่ 92) ปลาชนิดนี้พบชุกชุมในบริเวณแม่น้ำสงคราม (กลุ่มน้ำโขง) โดยเครื่องมือประมงที่นิยมใช้จับคือ มองกวาด (อวนพับตลิ่ง) ในตลาดพบขายในรูปปลาสดและปลาสดขยวม

ข้อสังเกต

Roberts (1992) รายงานว่าตั้งแต่มีการออกเอกสารต้นแบบของชนิดของ *Mystus atrifasciatus* ปลาชนิดนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับว่ามีอยู่จริง ถึงแม้ว่า Fowler (1935) ได้ทำการเปรียบเทียบลักษณะของปลาชนิดนี้ไว้กับ *M. vittatus* แต่ Smith (1945) ยังคงนำ *M. atrifasciatus* มาเป็นชื่อพ้องของ *M. vittatus*


ภาพที่ 91 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Mystus atrifasciatus*


91.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก


a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบลำ, d. กระดูก humero-cubital process

91.2 ลักษณะทางกายวิภาค

e. แนวด้านบนของกะโหลกหัว, f. แนวด้านล่างของกะโหลกหัว, g. แฉกฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม







ภาพที่ 93 *Mystus bocourti* (Bleeker, 1864)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Mystus bocourti* (Bleeker, 1864) (ภาพผนวกที่ 11.15)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : แขยงธง แขยงชายธง ปลาเกสูง ปลาคันธง

ชื่อสามัญ (common name) : Bocourti's river catfish

Heterobagrus bocourti Bleeker, 1864: 355 (type locality: Chao Phraya); Smith, 1945: 392.

Prajahipokia rex Fowler, 1934b: 339, figs. 3-4 (type locality: Bangkok)

Mystus bocourti, Roberts, 1989: 123-124

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 50 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 83.8-212.3 mm SL

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 0923 (1 ตัวอย่าง, 149.6 mm SL) ปากน้ำโพธิ์ H.M. Smith 6 มิถุนายน 2468; KUMF 0921 (2, 121.2-143.4) แม่น้ำป่าสัก H.M. Smith 20 สิงหาคม 2466; KUMF 6577 (8, 138.6-185.2) ตลาดหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ภาสกร แสนจันแดง 9 ตุลาคม 2540

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 6578 (4 ตัวอย่าง, 83.8-110.8 mm SL) ตลาดนครนายก ภาสกร แสนจันแดง 9 พฤศจิกายน 2540

ลุ่มน้ำแม่โขง NIFI 02026 (2 ตัวอย่าง, 184.9-212.3 mm SL) บ้านโนนกาคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ทรงพรรณ ลำเลิศเดช 13 กุมภาพันธ์ 2528; KUMF 6579 (30, 91.1-155.5) บ้านอ้วน ต.

หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ภาสกร แสนจันแดง 30 พฤษภาคม 2541; KUMF 6580 (3, 142.3-163.8) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ภาสกร แสนจันแดง 30 พฤษภาคม 2541

ลักษณะเด่นของชนิด

Mystus bocourti แตกต่างจากปลาในสกุล *Mystus* ชนิดอื่นโดยมีก้านครีบแข็งของ ครีบหลังยาว ($53.76 \pm 5.618 \%SL$) และสามารถโค้งงอได้

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.iii-v / 10-12; C.8/7; P.I 7-8; V.i5; B.R.7-9; GR11-16; VC41-42

หัวรูปร่างแบนข้าง ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัว มีผิวหนังคลุม เยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอซ้อนทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของ หัว ตามีผิวหนังคลุม หนวคมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงครีบหาง หนวดบริเวณจมูกยาวถึง ส่วนท้ายของหัว หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณตอนกลางครีบอก หนวดคู่ในที่ขา กรรไกรล่างยาวถึงบริเวณคอดคอ ซี่กรองเหงือกเป็นเส้นค่อนข้างหนา ซี่จับบริเวณขอบด้านหลัง ก้านครีบแข็งของครีบหลังมีขนาดเล็ก และซี่ลง ขอบด้านหน้าตอนปลายก้านครีบแข็งของครีบหลัง ไม่เป็นซี่จัก ซี่จับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกมีขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดไล่เลี่ยกัน กระดูก humero-cubital process มีฐานแคบ ยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของ ฐาน ความยาวจะงอยปาก $41.46 - 47.07 (44.75 \pm 1.262) \%HL$ ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา $17.97 - 25.41 (21.95 \pm 1.77) \%HL$ ระยะห่างระหว่างตา $24.40 - 32.76 (28.43 \pm 1.979) \%HL$ ความลึก และความกว้างของหัวบริเวณตา $35.94 - 50.47 (43.53 \pm 3.039)$ และ $46.85 - 64.66 (55.39 \pm 3.729) \%HL$ ความกว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process $8.85 - 15.49 (13.07 \pm 1.575)$ และ $32.14 - 41.15 (36.66 \pm 2.338) \%HL$ ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้น ของครีบอก ครีบหลัง ครีบท้อง รูทวาร ครีบไขมันและครีบกัน $16.79 - 21.71 (19.44 \pm 1.150)$, $33.57 - 37.18 (35.13 \pm 0.831)$, $43.50 - 49.27 (46.5 \pm 1.12)$, $49.81 - 55.51 (52.72 \pm 1.097)$, $45.20 - 49.66 (47.78 \pm 0.917)$ และ $66.98 - 71.97 (69.01 \pm 1.150) \%SL$ ความยาวฐานครีบหลัง ครีบไขมัน และ ครีบกัน $12.39 - 15.59 (14.09 \pm 0.572)$, $38.89 - 45.63 (41.68 \pm 1.498)$ และ $7.92 - 10.56 (9.32 \pm 0.501) \%SL$ ความยาวก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบหลัง $15.64 - 19.54 (17.2 \pm 0.85)$ และ

44.49 – 63.23 (53.76 ± 5.618) %SL ความยาวคอดหาง 20.12 – 23.95 (22.18 ± 0.84) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบอกไข่ม้วนถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบอกหาง 10.31 – 13.64 (11.95 ± 0.717) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 94)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวไม่เกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าและร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องยาว กระดูก supraoccipital process ยาวมากกว่า 4 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และไม่โค้งลงส่วนล่าง แถบฟัน vomerine teeth แคบและโค้ง แถบฟัน mandibular teeth โค้งยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก nasal ยาว กระดูก infraorbital ทุกชิ้นมีความยาวใกล้เคียงกัน กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process ยาว และปลายแหลม กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นรูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอกและเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate ไม่เชื่อมติดต่อกับกระดูก hyomandibular กระดูก interopercle ขนาดใหญ่แบนและกว้างตอนท้าย ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal เป็น process สั้น ยาวไม่ถึง 1 เท่าของความกว้างฐาน process กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แผ่กว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้นก้านสุดท้ายและร่องสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process และมีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ได้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural spine ยาว ยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างเรียวยาว และมีปลายแหลม กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารรูปร่างกลมมน ลำไส้ยาวเกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร ใต้ส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย กระเพาะลมมีหลายเส้นกระจายทั่วบริเวณผิว

ลักษณะของสี

แนวด้านหลังและแนวด้านล่างของลำตัวมีสีเทา บริเวณหลังส่วนหัวเหนือกระดูก cleithrum มีจุดสีดำขนาดเล็กที่บริเวณครึ่งด้านหลังถูกล้อมรอบด้วยแถบสีจางหรือสีขาวรูปครึ่งวงกลม อาจพบจุดสีดำบริเวณด้านหน้าจุดเริ่มต้นของครีบก้น บริเวณด้านล่างของลำตัวและส่วนท้องมีสีขาว บริเวณแนวด้านข้างลำตัวอาจมีสีบรอนซ์เงิน หรือสีตะกั่ว หรืออาจพบแถบตามยาวจางๆ ที่

บริเวณแนวด้านหลัง แนวเส้นกลางตัว และ แนวบนของครีบอกโดยแถบแรกและแถบที่สองยาวถึงบริเวณฐานครีบก้น แถบที่สามยาวถึงบริเวณเหนือครีบก้น หนดบริเวณจมูกและหนดบริเวณขากรรไกรบนมีสีขาวยปนเทา หนดบริเวณขากรรไกรล่างมีสีขาว ครีบไขมันมีสีเทาจาง ครีบอก ครีบท้องและครีบก้นมีสีเทาจาง ครีบหลังและครีบก้นมีสีเทา ในตัวอย่างที่ไม่สดอาจพบสีแดงเลือดบริเวณฐานครีบอก ครีบท้อง ครีบหลัง และครีบก้น

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

Mystus bocourti มีการกระจายพันธุ์อยู่เฉพาะในลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเท่านั้น (ภาพที่ 95) ปลาชนิดนี้สามารถพบได้ชุกชุมในบริเวณแม่น้ำสงคราม โดยเครื่องมือประมงที่ใช้จับคือ มอญกวาด (อวนทับตลิ่ง) ในตลาดพบขายในรูปปลาสดและปลาสวยงาม

Rainboth (1996) รายงานว่าปลาชนิดนี้พบมากใน Tonle Sap ของกัมพูชา อาหารที่กินได้แก่ พืชมกฐิตะเซีย และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บริเวณน้ำตื้น เครื่องมือประมงที่ใช้จับคือ แห และข่าย

ข้อสังเกต

ปลาแขวงธงเดิมใช้ชื่อสกุลคือ *Heterobagrus* ต่อมา Roberts (1994) ได้ทำการศึกษากลุ่มปลาแขวงในสกุล *Mystus* บางชนิดที่พบในแถบเอเชียและจัดให้ปลาแขวงธงอยู่ในสกุล *Mystus* โดยอาศัยเหตุผลที่ว่าปลาแขวงธงมีลักษณะโดยรวมเหมือนของโครงสร้างภายนอกและทางกายวิภาคคล้ายกับปลาที่จัดอยู่ในสกุล *Mystus* ชนิดอื่นๆ

ชื่อชนิดคือ 'bocourti' Bleeker ตั้งขึ้นเพื่อให้เกียรติ F. Bocourt ผู้เก็บตัวอย่างปลาชุดที่ Bleeker ใช้ในการศึกษาและตั้งเป็นปลาชนิดใหม่


ภาพที่ 94 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Mystus bocourti*

94.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก


a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบล้าง, d. กระดูก humero-cubital process

94.2 ลักษณะทางกายวิภาค


c. แนวด้านบนของกะโหลกหัว, f. แนวด้านล่างของกะโหลกหัว, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม




a




b




c



d




e



f




g




h




i




j




k




l




m



n




o




p



q




r




s




t



u





ภาพที่ 96 *Mystus cavasius* (Hamilton, 1822)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Mystus cavasius* (Hamilton, 1822) (ภาพผนวกที่ 11.16)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : แขนงปลายข้าวสาละวิน แขนง

ชื่อสามัญ (common name) : Gangetic mystus

Pimelodus cavasius Hamilton, 1822 : 203 (type locality : larger fresh water rivers of Gangetic Province)

Bagrus cavasius Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1840 : 409

Pimelodus seengtee Sykes, 1839 : 164 (type locality : Dukhan, presamably Beema River at Pairgaongsee) Sykes, 1841 : 375

Macrones cavasius, Day, 1877 : 447

Mystus mukherjii Ganguli & Data, 1975 : 293 (type locality : Subaraneekha River, Bihar)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 7 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 76.6-203.9 mm SL

ลุ่มน้ำสาละวิน NIFI 2938 (4 ตัวอย่าง, 76.6-96.7 mm SL) สาละวิน ขวลิค วิทยานนท์ 3-6 ธันวาคม 2537; KUMF 2558 (1, 184.2) แม่ขวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สมโภชน์ อัคระทวิวัฒน์ 21 มีนาคม 2524; KUMF 6582 (1, 133.4) แม่น้ำเมย จ.ตาก กิตติพงษ์ จารุธานินทร์ มกราคม 2532 ; KUMF 6581 (1, 203.9) ตลาดแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาสกร แสนจันแดง 30 มีนาคม 2541

ลักษณะเด่นของชนิด

Mystus cavasius แตกต่างจาก *M. singaringan* โดยบริเวณจุดเริ่มต้นของครีบท้องมีจุดสีดำขนาดใหญ่ ส่วนท้ายของกระดูก urohyal ไม่เป็น process เด่นชัด มีปลายป้าน

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.iii /7-8; C.8/7; P.I 9-10; V.i5; B.R.9-11; GR21-23; VC43

หัวรูปร่างแบนข้าง ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัวมีผิวหนังคลุม เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอซ้อนทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตามีผิวหนังคลุม หนวดมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงครีบท้อง หนวดบริเวณจมูกยาวถึงส่วนท้ายของหัว หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณโคนครีบอก หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณคอดคอ ซึ่งร่องเหงือกเป็นเส้นเรียวยาว ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบท้องของครีบท้อง ซึ่งขอบด้านหน้าตอนปลายก้านครีบท้องของครีบท้องไม่เป็นซี่จึก ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบท้องของครีบอกมีขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน กระดูก humero-cubital process มีฐานแคบ ยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาวจะงอยปาก 38.10 – 44.97 (41.13 ± 2.202) %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา 21.63 – 31.22 (27.88 ± 3.569) %HL ระยะห่างระหว่างตา 30.16 – 33.83 (31.87 ± 1.213) %HL ความลึกและความกว้างของหัวบริเวณตา 53.44 – 58.29 (55.04 ± 1.705) และ 57.39 – 61.92 (59.94 ± 1.907) %HL ความกว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process 8.99 – 12.58 (11.19 ± 1.311) และ 22.22 – 36.62 (31.00 ± 4.829) % HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ครีบท้อง ครีบท้อง รูทวาร ครีบท้องและครีบท้อง 16.64 – 19.71 (17.67 ± 1.156), 29.09 – 32.14 (30.76 ± 1.12), 40.70 – 46.36 (43.61 ± 1.727), 48.28 – 52.50 (50.61 ± 1.446), 41.51 – 45.55 (43.95 ± 1.461) และ 65.48 – 71.01 (67.04 ± 2.035) %SL ความยาวฐานครีบท้อง ครีบท้อง และ ครีบท้อง 12.82 – 14.47 (13.85 ± 0.528), 45.01 – 51.64 (46.89 ± 2.307) และ 45.01 – 51.64 (11.22 ± 0.422) %SL ความยาวก้านครีบท้องของครีบอกและครีบท้อง 14.79 – 16.34 (15.48 ± 0.549) และ 14.21 – 17.05 (15.75 ± 0.925) %SL ความยาวคอดหาง 21.06 – 24.31 (22.19 ± 1.124) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบท้อง ถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบท้อง 10.20 – 11.93 (10.85 ± 0.658) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 97)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวไม่เกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเป็นร่องยาว ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องขนาดเล็ก กระดูก supraoccipital process ยาวมากกว่า 4 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และไม่โค้งลงส่วนล่าง แถบฟัน vomerine teeth แคบและโค้งยาว แถบฟัน mandibular teeth โค้งยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก nasal ยาว กระดูก infraorbital ทุกชิ้นมีความยาวใกล้เคียงกัน กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process ยาว และปลายแหลม กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นรูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอกและเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate ไม่เชื่อมติดต่อกับกระดูก hyomandibular กระดูก interopercle ขนาดใหญ่แบนและกว้างตอนท้าย ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal เป็น process สั้น ยาวไม่ถึง 1 เท่าของความกว้างฐาน process กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แฉกกว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process และมีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ได้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural spine สั้น ยาวไม่ถึง 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างเรียวยาว และมีปลายแหลม กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารรูปร่างกลมมน ลำไส้ยาวไม่เกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร ใต้ส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย กระเพาะลมมีลายเส้นกระจายทั่วบริเวณผิว

ลักษณะของสี

แนวด้านหลังและด้านข้างของลำตัวมีสีเทาปนเงินหรือสีบรอนซ์เงิน ส่วนท้องและแนวด้านล่างของลำตัวมีสีจาง บริเวณหน้าจุดเริ่มต้นของครีบท้องมีจุดสีดำ หนวดบริเวณงมูกมีสีเทา หนวดบริเวณขากรรไกรบนของด้านนอกมีสีขาว ส่วนขอบด้านในมีสีเทา หนวดบริเวณขากรรไกรล่างมีสีขาว ครีบอก ครีบท้อง และ ครีบท้องมีสีเทา ครีบท้องและครีบก้นมีสีขาว

การกระจายพันธุ์ ถิ่นที่อยู่อาศัย ชีววิทยา และการประมง

Mystus cavasius มีการกระจายพันธุ์ในประเทศอินเดีย เนปาล ศรีลังกา พม่า และไทย (Roberts, 1994) ในไทยพบที่ ลุ่มน้ำสาละวิน (ภาพที่ 98) โดยตัวอย่างที่ศึกษาได้จาก จ.ตาก และ จ.แม่ฮ่องสอน ปลาอาศัยอยู่ในบริเวณแม่น้ำที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และมีกระแสน้ำเล็กน้อย ในตลาดพบขายในรูปของปลาสดและปลาสวยงาม Talwar และ Jhingran (1991) รายงานว่าในเขตของอินเดียนิยมนำปลานชนิดนี้มาใช้บริโภคเป็นอาหาร ปลาอาจมีความยาวถึง 40 เซนติเมตร หนักถึง 10 กิโลกรัม

ข้อสังเกต

Roberts (1994) กล่าวว่า Hamilton เป็นคนตั้งปลานชนิดนี้เป็นปลานชนิดใหม่ในปี ค.ศ. 1822 แต่ไม่มีตัวอย่างต้นแบบ ดังนั้นการจำแนกชนิดจึงต้องอาศัยรูปและข้อมูลจากเอกสารต้นแบบ Talwar และ Jhingran (1991) นำเอา *Mystus mukherjii* มาเป็นชื่อพ้องของ *M. cavasius* พร้อมกับรวมลักษณะคำบรรยายของชนิด โดยกล่าวถึงลักษณะที่สำคัญของสี คือ มีจุดสีดำบริเวณเหนือกระดูก cleithrum โดยจุดถูกเน้นให้ชัดเจนขึ้นโดยพื้นที่สีจางหรือขาวบริเวณขอบด้านข้าง และมีจุดสีดำบริเวณหน้าจุดเริ่มต้นของครีบหลัง

Roberts (1994) ให้ความเห็นเกี่ยวกับรูปและคำบรรยายลักษณะของ *Pimelodus seengtee* ว่าไม่มีอะไรแตกต่างจาก *M. cavasius* ดังนั้นจึง *P. seengtee* จึงเป็นชื่อพ้องของ *M. cavasius* และ Roberts รายงานว่าเอกสารหลายฉบับที่ระบุว่าพบ *M. cavasius* ในแม่น้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นการจำแนกชนิดที่ผิด โดยปลาที่รายงานนั้นประกอบด้วยปลาสองชนิดคือ *M. albolineatus* และ *M. singaringan*


ภาพที่ 97 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Mystus cavasius*


97.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก


a. แนวค้ำบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบลำหลัง, d. กระดูก humero-cubital process

97.2 ลักษณะทางกายวิภาค

e. แนวค้ำบนของกะโหลกหัว, f. แนวค้ำล่างของกะโหลกหัว, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวค้ำบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวค้ำล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม







ภาพที่ 99 *Mystus gulio* (Hamilton, 1822)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Mystus gulio* (Hamilton, 1822) (ภาพผนวกที่ 11.17)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : อีกรัง

ชื่อสามัญ (common name) : Long whiskered catfish

Pimelodus gulio Hamilton, 1822 (type locality : higher parts of Gangetic estuaries)

Macrones gulio Day, 1877, Day, 1889: 151

Mystus(Mystus) gulio Misra, 1976: 90

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 62 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 63.2-120.4 mm SL

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 0956 (1 ตัวอย่าง, 98.2 mm SL) บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา H.M. Smith 21 ธันวาคม 2466; KUMF 0951 (1, 104.8) คลองสำโรง H.M. Smith 12 กุมภาพันธ์ 2467; KUMF 0950 (1, 88.3) บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา H.M. Smith 8 พฤศจิกายน 2466

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 0952 (3 ตัวอย่าง, 98.3-99.2 mm SL) บริเวณชายฝั่ง จ.สมุทรสงคราม P. Prayceran 4 มิถุนายน 2479; KUMF 6586 (17, 63.2-90.6) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ สมหมาย เจนกิจการ 24 มกราคม 2542

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 0955 (1 ตัวอย่าง, 102.3 mm SL) ปากพุน จ.นครศรีธรรมราช H.M. Smith 20 ตุลาคม 2466; KUMF 6583 (16, 73.1-116.8) ตลาดหน้าศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด จ.ปัตตานี ภาสกร แสงจันทร์แดง 23 ธันวาคม 2540; KUMF 6584 (6, 82.6-120.4) อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ภาสกร แสงจันทร์แดง 27 ธันวาคม 2540

ลุ่มน้ำตะนาวศรี KUMF 6585 (16 ตัวอย่าง, 66.8-89.8 mm SL) แม่น้ำกระบุรี อ.กระบุรี จ.ระนอง
ภาสกร แสงจินแดง 6 มกราคม 2541

ลักษณะเด่นของชนิด

Mystus gulio มีลักษณะแตกต่างจากปลาในสกุล *Mystus* ที่พบในประเทศไทยชนิดอื่นโดยมีฐานครีบก้น (11.00 ± 0.981%SL)

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.iii-5 /7-8; C.8/7; P.I 7-8; V.i5; B.R.8-10; GR22-38; VC35-36

หัวรูปร่างแบนลงเล็กน้อย ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัวมีผิวหนังคลุม เยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอสันทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตามีผิวหนังคลุม หนวคมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงครีบท้อง หนวดบริเวณมุมยาวถึงด้านหลังตา หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณปลายครีบอก หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวถึงโคนครีบอก ซึ่งร่องเหงือกเป็นเส้นเรียวยาว ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบก้นของครีบท้อง ขอบด้านหน้าตอนปลายก้านครีบก้นของครีบท้องไม่ใช่ซี่จุก ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบก้นของครีบอกมีขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดเล็กต่างกัน กระดูก humero-cubital process มีฐานแคบ ยาวเป็น 2-3 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาวจะงอยปาก 32.04 – 40.29 (35.39 ± 1.966) %HL ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางตา 16.37 – 22.46 (19.16 ± 1.484) %HL ระยะห่างระหว่างตา 34.36 – 43.13 (38.98 ± 1.95) %HL ความลึกและความกว้างของหัวบริเวณตา 39.33 – 52.59 (45.72 ± 2.985) และ 55.36 – 70.14 (62.53 ± 3.012) %HL ความกว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process 7.91 – 15.17 (11.91 ± 1.706) และ 12.69 – 23.83 (17.12 ± 2.542) % HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ครีบท้อง ครีบท้อง รูทวาร ครีบก้นและครีบก้น 19.31 – 24.14 (21.2 ± 0.837), 32.23 – 38.74 (36.07 ± 1.337), 51.61 – 61.38 (54.14 ± 1.711), 59.58 – 68.28 (63.05 ± 1.596), 67.84 – 76.15 (71.76 ± 1.803) และ 65.47 – 75.30 (69.31 ± 1.715) %SL ความยาวฐานครีบท้อง ครีบก้น และ ครีบก้น 10.13 – 13.43 (12.04 ± 0.819), 8.59 – 13.30 (11.00 ± 0.981) และ 11.71 – 16.07 (13.74 ± 0.981) %SL ความยาวก้านครีบก้นของครีบอกและครีบท้อง 15.03 – 20.20 (17.62 ± 1.121) และ 10.41 –

17.14 (14.34 ± 1.586) %SL ความยาวคอดหาง 15.06 – 19.71 (17.20 ± 0.926) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบอกไข่ม้วนถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบอกหาง 16.59 – 21.07 (18.99 ± 0.905) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 100)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวไม่เกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเป็นร่องยาว ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องขนาดเล็ก กระดูก supraoccipital process ยาวประมาณ 3 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และโค้งลงส่วนล่าง แถบฟัน vomerine teeth แคบและโค้งยาว แถบฟัน mandibular teeth โค้งยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก nasal ยาว กระดูก infraorbital ทุกชิ้นมีความยาวใกล้เคียงกัน กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process ยาว และปลายแหลม กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นรูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอกและเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate ไม่เชื่อมติดต่อกับกระดูก hyomandibular กระดูก interopercle ขนาดใหญ่แบนและกว้างตอนท้าย ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal เป็น process สั้น ยาวไม่ถึง 1 เท่าของความกว้างฐาน process กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แผ่กว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process และมีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ได้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural spine สั้น ยาวไม่ถึง 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างเรียวยาว และมีปลายแหลม กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารรูปร่างกลมมน ลำไส้ยาวไม่เกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร ใต้ส่วนหลังรูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยม กระเพาะลมมีลายเส้นกระจายทั่วบริเวณผิว

ลักษณะของสี

แนวด้านหลังและแนวด้านข้างของลำตัวมีสีเทาปนเหลือง แนวด้านข้างของลำตัวและท้องมีสีขาวปนเหลือง หนวดบริเวณขากรรไกรบนมีสีเทา หนวดบริเวณจมูกและขากรรไกรล่างมีสีขาวปนเทา ครีบทูครีบทมีสีเหลืองปนเทาจางๆ

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

Mystus gulio มีการกระจายพันธุ์ในประเทศอินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ พม่าและ มาเลเซีย (Jhingran และ Talwar, 1991; Mohammad และ Ambak, 1983) ในไทยพบที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา ลุ่มน้ำทางภาคใต้ และลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก (ภาพที่ 101) โดยปลาอาศัยอยู่ในบริเวณ คลอง หรือแม่น้ำที่มีน้ำทะเลขึ้นถึง ในตลาดพบขายในรูปปลาสดและปลาสวยงาม Jhingran และ Talwar (1991) รายงานว่าปลานชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มและสามารถพบปลานชนิดนี้ได้ ในบริเวณปากแม่น้ำที่มีกระแสน้ำเล็กน้อยขึ้นไปจนถึงบริเวณที่เป็นน้ำจืด และสามารถพบปลาได้ใน บริเวณชายฝั่งทะเลที่อยู่ใกล้กับบริเวณปากแม่น้ำ ปลานชนิดนี้อาจมีความยาวถึง 40 เซนติเมตร


ภาพที่ 100 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Mystus gulio*


100.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก


a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบล้าง, d. กระดูก humero-cubital process

100.2 ลักษณะทางกายวิภาค

e. แนวด้านบนของกะโหลกหัว, f. แนวด้านล่างของกะโหลกหัว, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม







ภาพที่ 102 *Mystus micracanthus* (Bleeker, 1846)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Mystus micracanthus* (Bleeker, 1846) (ภาพผนวกที่ 11.18)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : แขนงหางจุด

ชื่อสามัญ (common name) : Bagrid catfish

Bagrus micracanthus Bleeker, 1846a : 151 (type locality : Batavia, in fluviis)

Hypselerus micracanthus Bleeker, 1862 : 59

Macrones micracanthus Günther, 1864 : 76

Mystus micracanthus Fowler, 1934b : 94

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 46 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 49.8-171.8 mm SL

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 6587 (2 ตัวอย่าง, 109.1-111.2 mm SL) อ.ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา สืบสิน สนธิรัตน์ เมษายน 2540; KUMF 6588 (3, 49.9-81.3) เขาสอยดาว อ.มะขาม จ. จันทบุรี สืบสิน สนธิรัตน์ 7 พฤษภาคม 2541

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 0951 (1 ตัวอย่าง, 97.1 mm SL) จ.นครศรีธรรมราช H.M. Smith 14 กรกฎาคม 2471; KUMF 6589 (29, 80.2-111.4) พรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส ประจิตร วงศ์รัตน์ พฤษภาคม 2531; KUMF 6590 (9, 91.8-17.8) ตลาดสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 12 กุมภาพันธ์ 2540

ลักษณะเด่นของชนิด

Mystus micracanthus มีรูปร่างลำตัวคล้ายกับ *M. atrifasciatus* แต่แตกต่างโดยมีสีโดยรวมของลำตัวเป็นสีน้ำตาลอ่อน และบริเวณฐานครีบหางมีแต้มสีดำคล้ายรูปสามเหลี่ยม ขอบด้านข้างของกระดูก lateral ethmoid ไม่โค้งลงด้านล่าง แตกต่างจาก *M. gulio* โดยมีฐานครีบไขมันยาวกว่า (34.42 ± 1.643 vs. 11.00 ± 0.981 %SL)

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.ii-iii / 8-9; C.8/7; P.I 8-9; V.i5; B.R.8-10; GR23-32; VC38-39

หัวรูปร่างแบนข้าง ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัวมีผิวหนังคลุม เยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอสันทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตามีผิวหนังคลุม หนวคมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงครีบหาง หนวดบริเวณจมูกยาวถึงส่วนท้ายของหัว หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณโคนครีบอก หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณคอดคอ ซึ่งร่องเหงือกเป็นเส้นเรียวยาว ซึ่งจักบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังซึ่ง ขอบด้านหน้าตอนปลายก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จัก ซึ่งจักบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกมีขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดไล่เลี่ยกัน กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้าง ยาวน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาวจะงอยปาก 30.09 – 42.23 (34.16 ± 3.043) %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา 18.33 – 25.55 (22.18 ± 1.979) %HL ระยะห่างระหว่างตา 30.23 – 42.20 (38.16 ± 2.35) %HL ความลึกและความกว้างของหัว บริเวณตา 42.23 – 58.24 (50.04 ± 4.211) และ 55.39 – 67.47 (62.03 ± 3.109) %HL ความกว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process 10.05 – 15.94 (13.68 ± 1.409) และ 25.48 – 38.10 (33.94 ± 2.741) % HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ครีบหลัง ครีบท้อง รูทวาร ครีบไขมันและครีบกัน 18.26 – 23.69 (20.81 ± 1.261), 33.37 – 38.61 (35.84 ± 1.151), 45.44 – 54.70 (51.38 ± 1.849), 52.03 – 61.66 (57.69 ± 1.842), 49.40 – 57.27 (53.03 ± 1.877) และ 63.96 – 74.95 (70.62 ± 2.037) %SL ความยาวฐานครีบหลัง ครีบไขมัน และ ครีบกัน 15.17 – 17.79 (16.37 ± 0.666), 31.26 – 37.40 (34.42 ± 1.643) และ 11.13 – 18.95 (13.04 ± 1.230) %SL ความยาวก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบหลัง 17.56 – 21.05 (19.24 ± 1.064) และ 9.18 –

15.40 (11.38 ± 1.376) %SL ความยาวคอดหาง 14.32 – 19.82 (17.16 ± 0.975) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบอกไข่ม้วนถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบอก 10.44 – 15.01 (12.91 ± 1.155) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 103)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวไม่เกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเป็นร่องยาว ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องขนาดเล็ก กระดูก supraoccipital process ยาวประมาณ 3 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และไม่โค้งลงส่วนล่าง แถบฟัน vomerine teeth แคบและโค้งยาว แถบฟัน mandibular teeth โค้งยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก nasal ยาว กระดูก infraorbital ทุกชิ้นมีความยาวใกล้เคียงกัน กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process ยาว และปลายแหลม กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นรูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอกและเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate ไม่เชื่อมติดต่อกับกระดูก hyomandibular กระดูก interopercle ขนาดใหญ่ แบน และกว้างตอนท้าย ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal เป็น process สั้น ยาวไม่ถึง 1 เท่าของความกว้างฐาน process กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แผ่กว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process และมีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ได้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural spine สั้น ยาวไม่ถึง 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างเรียวยาว และมีปลายแหลม กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารรูปร่างกลมมน ลำไส้ยาวไม่เกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร ใต้ส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย กระเพาะลมหมีลายเส้นกระจายทั่วบริเวณผิว

ลักษณะของสี

แนวด้านหลังและแนวด้านข้างลำตัวมีสีน้ำตาล แนวด้านล่างของลำตัวและส่วนท้องมีสีขาว บริเวณโคนครีบอกมีจุดสีดำ หนวดบริเวณขากรรไกรบนมีสีขาว ยกเว้นขอบด้านในของส่วนโคนมีสีเทา หนวดบริเวณจมูกมีสีเทาจาง หนวดบริเวณขากรรไกรล่างมีสีขาว ครีบอกมีสีน้ำตาลจาง ครีบท้องและครีบก้นมีสีขาว ครีบท้องและครีบอกมีสีน้ำตาล

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

Mystus micracanthus มีการกระจายพันธุ์ในบริเวณเกาะสุมาตรา เกาะชวาและเกาะบอร์เนียว (Roberts, 1989) ในไทยพบที่ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก และ ลุ่มน้ำทางภาคใต้ (ภาพที่ 104) ในตลาดพบขายในรูปของปลาสดและปลาสวยงาม

ข้อสังเกต

Roberts (1989) รายงานว่า Weber และ de Beaufort (1913) นำเอา *Mystus bimaculatus* Volz, 1904 มาเป็นชื่อพ้องของ *M. micracanthus* แต่จากการตรวจสอบลักษณะของสีในปลาชนิดนี้พบว่ามีความแตกต่างจาก *M. micracanthus* โดย *M. bimaculatus* มีจุดสีดำบริเวณเหนือกระดูก cleithrum และมีแถบสีดำขนาดใหญ่พาดขวางอยู่ระหว่างบริเวณตอนท้ายของคอดหางและฐานครีบทหาง ขอบด้านหน้าของจุดบริเวณเหนือกระดูก cleithrum และขอบด้านข้างของแถบสีดำบริเวณคอดหางถูกเน้นให้เด่นโดยแถบขวางสีครีมหรือขาว ปลาชนิดนี้พบเฉพาะในบริเวณเกาะสุมาตราเท่านั้น


ภาพที่ 103 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Mystus micracanthus*

103.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก


a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบลึง, d. กระดูก humero-cubital process

104.2 ลักษณะทางกายวิภาค


e. แนวด้านบนของกะโหลกหัว, f. แนวด้านล่างของกะโหลกหัว, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม




a




b




c




d




e



f




g




h




i




j




k




l




m




n




o




p



q




r




s




t



u





ภาพที่ 105 *Mystus multiradiatus* Roberts, 1992

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Mystus multiradiatus* Roberts, 1992 (ภาพผนวกที่ 11.19)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : แขยง แขยงข้างลาย

ชื่อสามัญ (common name): striped catfish

Mystus vittatus Smith, 1945 : 385 (in part), fig.85 (specimens from Paknampo)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 60 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 61.2-175.3 mm SL

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 0993 (1 ตัวอย่าง, 127.4 mm SL) ปากน้ำโพธิ์ แม่น้ำเจ้าพระยา H.M. Smith 18 พฤศจิกายน 2466; NIFI 3043 (1, 169.8) อ.บางไทร จ.อยุธยา, date unknown; KUMF 6591 (1, 109.9) ตลาดหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ภาสกร แสงจันทร์แดง 4 พฤศจิกายน 2540; KUMF 6592 (3, 82.3-109.3) ตลาดนนทบุรี จ.นนทบุรี ภาสกร แสงจันทร์แดง 6 ตุลาคม 2540; KUMF 6593 (1, 84.2) คลองบางยี่หน จ.สุพรรณบุรี กีฎา ลิ้เจริญ มกราคม 2541 ; KUMF 6594 (1, 175.3) ตลาดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ พ.ศ. 2540; KUMF 6595 (19, 90.2-123.3) ตลาดสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ภาสกร แสงจันทร์แดง 24 พฤศจิกายน 2541; KUMF 6596 (11, 103.4-125.8) ตลาดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 13 มกราคม 2540

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 6597 (4 ตัวอย่าง, 77.8-91.3 mm SL) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี กิตติพงษ์ จารุธานินทร์ 20 มกราคม 2542

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 6598 (9 ตัวอย่าง, 70.8-114.3 mm SL) ตลาดราชบุรี ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ สิงหาคม 2536; KUMF 6598 (9, 70.8-114.3) ตลาดราชบุรี ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ สิงหาคม 2536

ลักษณะเด่นของชนิด

Mystus multiradiatus แตกต่างจากปลาในสกุล *Mystus* (ยกเว้น *Mystus mysticetus*) โดยมีซี่กรองเหงือกมากกว่า 40 อัน ปลาชนิดนี้แตกต่างจาก *M. mysticetus* โดยไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ขอบด้านบนของครีบก้นโค้งนูน (convex)

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.iii-iv / 6-8; C.8/7; P.I 8-9; V.i5; B.R.9-11; GR51-61; VC 34-36

หัวแบนลงเล็กน้อย ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัวมีผิวหนังคลุม เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอสันทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตามีผิวหนังคลุม หนวคมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงครีบก้น หนวดบริเวณจมูกยาวถึงส่วนท้ายของหัว หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณปลายครีบอก หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวถึงโคนครีบอก ซี่กรองเหงือกเป็นเส้นเรียวยาว ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบก้นของครีบท้อง ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหน้าตอนปลายก้านครีบก้นของครีบท้อง ครีบท้องเป็นซี่จุก ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบก้นของครีบท้องมีขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดไล่เลี่ยกัน กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้าง ยาวน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาวจะงอยปาก 34.30 – 40.50 (37.38 ± 1.303) %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา 16.97 – 21.32 (19.25 ± 0.963) %HL ระยะห่างระหว่างตา 30.68 – 40.94 (34.63 ± 2.398) %HL ความลึกและความกว้างของหัวบริเวณตา 33.76 – 41.76 (37.21 ± 1.889) และ 49.71 – 59.93 (54.07 ± 2.408) %HL ความกว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process 6.98 – 13.22 (10.99 ± 1.236) และ 23.15 – 29.92 (26.75 ± 1.463) % HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ครีบท้อง รูทวาร ครีบท้องและครีบก้น 20.20 – 26.17 (23.57 ± 1.336), 36.98 – 41.72 (39.42 ± 1.196), 50.81 – 60.01 (54.35 ± 1.740), 57.73 – 67.48 (60.76 ± 1.777), 52.58 – 61.84 (58.11 ± 2.008) และ 69.79 – 80.89 (72.98 ± 21.853) %SL ความยาวฐานครีบท้อง ครีบท้อง และ ครีบก้น 14.01 – 17.94 (15.63 ± 0.645), 24.74 – 31.74 (28.14 ± 1.322) และ 9.06 – 12.51 (11.04 ± 0.762) %SL ความยาวก้านครีบก้นของครีบอกและครีบท้อง 18.73 – 23.80 (20.85 ± 1.105) และ 12.19 – 16.06 (13.81 ± 0.941) %SL ความยาวคอดหาง 14.43 – 18.57 (16.94 ± 0.889) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบท้องถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบท้อง 12.67 – 17.31 (15.33 ± 0.94) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 106)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวไม่เกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเป็นร่องยาว ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องขนาดเล็ก กระดูก supraoccipital process ยาวประมาณ 3 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และไม่โค้งลงส่วนล่าง แถบฟัน vomerine teeth แคบและโค้งยาว แถบฟัน mandibular teeth โค้งยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก nasal ยาว กระดูก infraorbital ทุกชิ้นมีความยาวใกล้เคียงกัน กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process ยาว และปลายแหลม กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นรูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอกและเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate ไม่เชื่อมติดต่อกับกระดูก hyomandibular กระดูก interopercle ขนาดใหญ่แบน และกว้างตอนท้าย ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal เป็น process สั้น ยาวไม่ถึง 1 เท่าของความกว้างฐาน กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แผ่กว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process และมีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ใต้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural spine สั้น ยาวไม่ถึง 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างเรียวยาว และมีปลายแหลม กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารรูปร่างกลมมน ลำไส้ยาวไม่เกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร ใต้ส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย กระเพาะลมหมีลายเส้นกระจายทั่วบริเวณผิว

ลักษณะของสี

ปลา มีแถบสีดำ 3 แถบ พาดไปตามแนวยาวของลำตัว โดยแถบแรกอยู่ตอนบนของลำตัว จุดเริ่มต้นของแถบอยู่บริเวณกระดูก supraoccipital process ผ่านฐานครีบท้องและครีบท้องมาสิ้นสุดบริเวณตอนบนของฐานครีบท้อง แถบที่สองอยู่บริเวณแนวเส้นข้างตัว แถบที่สามอยู่ตำแหน่งด้านล่างแนวเส้นข้างตัว และมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณเหนือฐานครีบท้องผ่านฐานครีบท้องและครีบท้องมาสิ้นสุดบริเวณตอนล่างของคอดหาง บริเวณเหนือกระดูก cleithrum มีจุดวงกลมสีดำขนาดเล็กโดยแนวด้านหลังและส่วนล่างของจุดวงกลมมีแถบสีขาวล้อมรอบ หนวดบริเวณจมูกและหนวดบริเวณขากรรไกรบนมีสีเทา หนวดบริเวณขากรรไกรล่างมีสีขาวปนเทา ครีบท้องครีบท้องมีสีเทา

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

Mystus multiradiatus มีการกระจายพันธุ์ในลุ่มน้ำโขงเขตประเทศกัมพูชา โดยปลาชอบอาศัยรวมอยู่กับ *M. mysticetus* อาหารที่ปลากินได้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ พืชน้ำ และพืชบางชนิดที่ถูกพัดพาโดยกระแสน้ำ เครื่องมือประมงที่ใช้จับคือ ข่าย แห และลอบ พบขายในตลาดในรูปของปลาสดและปลารมควัน (Rianboth, 1996) สำหรับประเทศไทยพบในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และ ลุ่มน้ำทางภาคตะวันตก (ภาพที่ 107) และพบขายในตลาดในรูปของปลาสดและปลาสวยงาม

ข้อสังเกต

Roberts (1992) รายงานว่าปลาชนิดนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกใน Smith (1945) โดยจำแนกชนิดเป็น *Mystus vittatus* พร้อมภาพประกอบคำบรรยายแต่ตัวอย่างที่ Smith ใช้ในการวาดรูปไม่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลขกำกับตัวอย่าง ความยาว และแหล่งที่เก็บ Roberts กล่าวถึงความแตกต่างที่สามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดระหว่าง *M. vittatus* ที่มีการกระจายพันธุ์อยู่เฉพาะเขตอบอุ่นและ *M. multiradiatus* ว่าเฉพาะ *M. vittatus* เท่านั้นที่มีแถบตามยาวสีขาวพาดผ่านแนวเส้นข้างตัว

ชื่อของชนิด ‘multiradiatus’ มาจากภาษาละตินคือ “multi” และ “radius” อ้างถึงการที่ปลามีซี่กรองเหงือกจำนวนมาก


ภาพที่ 106 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Mystus multiradiatus*

106.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก


a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบท้อง, d. กระดูก humero-cubital process

106.2 ลักษณะทางกายวิภาค


e. แนวด้านบนของกะโหลกหัว, f. แนวด้านล่างของกะโหลกหัว, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม




a




b




c




d




e



f




g




h




i



j




k




l




m




n




o




p




q




r




s




t



u





ภาพที่ 108 *Mystus mysticetus* Roberts, 1992

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Mystus mysticetus* Roberts, 1992 (ภาพผนวกที่ 11.20)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : แขยง แขยงข้างลาย

ชื่อสามัญ (common name): striped catfish

Hemibagrus tengana : Sauvage, 1881 : 168 (grands lacs du Cambodge, Me-Kong)

Mystus vittatus : Fowler, 1935 : 104, fig. 28 (Bangkok)

Mystus mysticetus Roberts, 1992 (type locality: Nakhon Phanom Market)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 75 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 60.8-182.3 mm SL

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 1000 (2 ตัวอย่าง, 71.8-83.9 mm SL) แม่น้ำสุพรรณบุรี โชติ สุวดี 19 กันยายน 2477; KUMF 0997 (2, 73.2-76.1) ปากน้ำโพธิ์ แม่น้ำเจ้าพระยา H.M. Smith 24 พฤศจิกายน 2466; KUMF 0998 (2, 80.3-93.2) บ้านโพธิ์ แม่น้ำเจ้าพระยา H.M. Smith 8 ธันวาคม 2466; KUMF 6599 (17, 60.8-118.3) ตลาดสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ภาสกร แสนจันแดง 24 พฤศจิกายน 2541; KUMF 6600 (1, 182.3) ตลาดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 2540

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก KUMF 6601 (3 ตัวอย่าง, 70.8-89.2 mm SL) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี กิตติพงษ์ จารุธานินทร์ 20 มกราคม 2541

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 2716 (1 ตัวอย่าง, 84.9 mm SL) จ.นครพนม วราวุธและคณะ 29 ธันวาคม 2516; KUMF 6602 (31, 83.2-109.8) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาสกร แสนจันแดง 17, 30 พฤษภาคม

2539; KUMF 6603 (15, 99.6-139.9) ตลาดสกนกร จ.สกนกร ภาสกร แสนจันแดง 28 พฤษภาคม 2541

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 0999 (1 ตัวอย่าง, 87.8 mm SL) คลองบางปลาสร้อย จ.ราชบุรี โชติ สุวดี 8 ธันวาคม 2475

ลักษณะเด่นของชนิด

Mystus mysticetus แตกต่างจาก *M. multiradiatus* โดยสามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ขอบด้านนอกของครีบก้นเว้าเข้า (concave)

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.iii-iv / 8-11; C.8/7; P.I 8-9; V.i5; B.R.9-11; GR54-85; VC36-37

หัวแบนลงเล็กน้อย ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัวมีผิวหนังคลุม เยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอซ้อนทับกัน สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตามีผิวหนังคลุม หนวคมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงครีบก้น หนวดบริเวณจมูกยาวถึงจุดเริ่มต้นของฐานครีบลึง หนวดคู่บนที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณครีบท้อง หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวถึงโคนครีบอก ซึ่งกรองเหงือกเป็นเส้นเรียวยาว ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบลึงซึ่ง ขอบด้านหน้าตอนปลายก้านครีบแข็งของครีบลึงเป็นซี่จัก ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกมีขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดเล็กเกินไป กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้าง ยาวน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาวจะงอยปาก 29.56 – 38.71 (33.56 ± 1.665) %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา 17.65 – 24.68 (20.86 ± 1.649) %HL ระยะห่างระหว่างตา 33.89 – 45.02 (40.33 ± 2.238) %HL ความลึกและความกว้างของหัวบริเวณตา 33.89 – 44.08 (37.59 ± 2.110) และ 48.05 – 61.99 (53.65 ± 2.997) %HL ความกว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process 7.17 – 12.27 (9.84 ± 1.339) และ 26.64 – 35.07 (30.59 ± 1.915) % HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ครีบลึง ครีบท้อง รูทวาร ครีบก้นและครีบก้น 20.41 – 26.35 (22.59 ± 1.108), 34.36 – 40.51 (38.22 ± 1.058), 48.29 – 55.02 (51.23 ± 1.696), 54.60 – 65.96 (58.62 ± 1.993), 58.91 – 71.70 (64.59 ± 2.329) และ 63.19 – 74.16 (70.40 ± 1.788) %SL ความยาวฐานครีบลึง ครีบก้น และ ครีบก้น

12.75 – 15.32 (14.12 ± 0.614), 15.17 – 25.39 (18.63 ± 2.138) และ 11.46 – 17.27 (13.98 ± 0.892) %SL ความยาวก้านครีบทึ่มของครีบอกและครีบทึ่มหลัง 17.94 – 23.77 (20.91 ± 1.114) และ 12.98 – 16.75 (14.60 ± 0.873) %SL ความยาวคอดหาง 14.07 – 21.71 (16.41 ± 1.169) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบทึ่มจนถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบทึ่มหาง 16.12 – 19.98 (18.1 ± 0.846) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 109)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวไม่เกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเป็นร่องยาว ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องขนาดเล็ก กระดูก supraoccipital process ยาวประมาณ 3 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และไม่โค้งลงส่วนล่าง แฉกฟัน vomerine teeth แคบและโค้งยาว แฉกฟัน mandibular teeth โค้งยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก nasal ยาว กระดูก infraorbital ทุกชิ้นมีความยาวใกล้เคียงกัน กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process ยาว และปลายแหลม กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นรูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอกและเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate ไม่เชื่อมติดต่อกับกระดูก hyomandibular กระดูก interopercle ขนาดใหญ่แบนและกว้างตอนท้าย ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal เป็น process สั้น ยาวไม่ถึง 1 เท่าของความกว้างฐาน process กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แผ่นกว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้นก้านสุดท้ายและร่องสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process และมีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ได้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural spine สั้น ยาวไม่ถึง 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างเรียวยาว และมีปลายแหลม กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารรูปร่างกลมมน ลำไส้ยาวไม่เกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร ใต้ส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย กระเพาะลมหมีลายเส้นกระจายทั่วบริเวณผิว

ลักษณะของสี

ปลา มีแถบสีดำ 3 แถบ พาดตามแนวยาวของลำตัว แถบแรกอยู่ตำแหน่งด้านบนของลำตัว จุดเริ่มต้นของแถบอยู่บริเวณกระดูก supraoccipital process ผ่านฐานครีบทึ่มหลังและครีบทึ่มมาสิ้นสุดบริเวณตอนบนของฐานครีบทึ่มหาง แถบที่สองอยู่บริเวณแนวเส้นข้างตัว แถบที่สามอยู่

ตำแหน่งด้านล่างลำตัวและมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณเหนือฐานครีบอกทอดยาวผ่านฐานครีบท้องและครีบก้น มาสิ้นสุดบริเวณตอนล่างของฐานครีบท่าง บริเวณเหนือกระดูก cleithrum มีจุดวงกลมขนาดเล็กสีดำ โดยแนวด้านหลังและส่วนล่างของจุดวงกลมมีแถบสีขาวล้อมรอบ หนวดบริเวณจมูกมีสีดำ หนวดบริเวณขากรรไกรบนมีสีเทา ยกเว้นบริเวณโคนหนวดมีสีดำ หนวดบริเวณขากรรไกรล่างมีสีขาวปนเทา ครีบทูครีบมีสีเทา

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยาและการประมง

Mystus mysticetus พบในแม่น้ำโขงในเขตประเทศกัมพูชา อาหารที่ปลากินได้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ แมลงน้ำ ครัสเตเชียน และโรติเฟอร์ เครื่องมือประมงที่ใช้จับคือ อวน ข่าย แห และลอบ (Rainboth, 1996) ในไทยพบ *M. mysticetus* มีการกระจายพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำทางภาคตะวันตก (ภาพที่ 110) เครื่องมือประมงที่ใช้จับคือ แห เบ็ด ข่าย และโด้ง ในตลาดพบขายในรูปปลาสดและปลาสวยงาม

ข้อสังเกต

ชื่อชนิด 'mysticetus' มาจากภาษากรีก อ้างถึงการที่ปลามีซี่กรองเหงือกลักษณะเพรียวาว เหมือนซี่กรองของปลาวาฬบาลีน


ภาพที่ 109 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Mystus mysticetus*

109.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก


a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบท้อง, d. กระดูก humero-cubital process

109.2 ลักษณะทางกายวิภาค


e. แนวด้านบนของกะโหลกหัว, f. แนวด้านล่างของกะโหลกหัว, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม




a




b




c




d




e



f




g




h




i



j




k




l




m



n




o



p




q



r




s




t



u





ภาพที่ 111 *Mystus rhegma* Fowler, 1935

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Mystus rhegma* Fowler, 1935 (ภาพผนวกที่ 11.21)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : แขนง แขนงข้างลาย แขนงทราย

ชื่อสามัญ (common name): striped catfish

Mystus rhegma Fowler, 1935 : 102 , fig.27 (type locality : Bangkok), Roberts, 1992 : 85, fig.4

(Bangkok ; Meklong)

Mystus cavasius Smith, 1945 : 389 (partim)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 9 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 61.2-107.2 mm SL

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 6604 (7 ตัวอย่าง, 61.2-85.1 mm SL) แม่น้ำเจ้าพระยา จ.อุทัยธานี ชัยวุฒิ
กรุดพันธ์ 3 กันยายน 2536; KUMF 6605 (1, 78.3) อ.พยุหี จ.นครสวรรค์ ประจิตร วงศ์รัตน์ 2539;
KUMF 6606 (1, 107.2) อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ภาณุพันธ์ พันธุ์นิตย์ 28 ธันวาคม 2541

ลักษณะเด่นของชนิด

Mystus rhegma แตกต่างจาก *M. atrifasciatus* โดยซึ่งจักปลายสุดของก้านครีบแข็งของครีบอกโค้งยาวคล้ายตะขอ และมีขนาดใหญ่กว่าซึ่งจักอื่นๆ เล็กน้อย จุดสิ้นสุดของร่องกึ่งกลางหัวตอนหลังอยู่บริเวณฐานกระดูก supraoccipital process ซึ่งร่องเหงือกมีจำนวนน้อยกว่า (17 – 21 vs. 24 – 30 อัน)

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.iii /8; C.8/7; P.I 8-9; V.i5; B.R.9-10; GR17-21; VC41

หัวรูปร่างแบนข้าง ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัว มีผิวหนังปกคลุม เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคล้องกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตามีผิวหนังคลุม หนวดมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงครีบก้น หนวดบริเวณจมูกยาวถึงส่วนท้ายของหัว หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวถึงปลายครีบอก หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวถึงโคนครีบอก ซึ่งร่องเหงือกเป็นเส้นเรียวยาว ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังซึ่ง ขอบด้านหน้าตอนปลายก้านครีบแข็งของครีบหลังไม่เป็นซี่จัก ซึ่งจับปลายสุดของก้านครีบแข็งของครีบอกโค้งยาวคล้ายตะขอ และมีขนาดใหญ่กว่าซี่จักซี่อื่นๆ เล็กน้อย กระดูก humero-cubital process มีฐานแคบ ยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาวจะงอยปาก $35.85 - 39.68$ (37.61 ± 1.241) %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา $26.23 - 32.34$ (30.09 ± 1.905) %HL ระยะห่างระหว่างตา $29.79 - 35.85$ (32.42 ± 1.657) %HL ความลึกและความกว้างของหัวบริเวณตา $44.97 - 54.10$ (49.34 ± 3.339) และ $54.65 - 64.89$ (59.69 ± 3.01) %HL ความกว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process $8.18 - 10.11$ (9.35 ± 0.696) และ $24.53 - 34.92$ (28.00 ± 3.117) % HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ครีบหลัง ครีบท้อง รูทวาร ครีบไขมันและครีบก้น $16.57 - 20.06$ (18.68 ± 1.075), $29.76 - 32.35$ (31.29 ± 0.884), $42.54 - 44.68$ (43.61 ± 0.738), $49.07 - 51.82$ (50.50 ± 1.027), $47.50 - 51.49$ (49.49 ± 1.233) และ $64.66 - 68.54$ (66.47 ± 1.392) %SL ความยาวฐานครีบหลัง ครีบไขมัน และ ครีบก้น $14.34 - 16.94$ (16.06 ± 0.917), $34.04 - 37.30$ (35.84 ± 0.915) และ $11.60 - 15.96$ (12.85 ± 1.422) %SL ความยาวก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบหลัง $17.02 - 20.36$ (18.14 ± 1.076) และ $14.69 - 19.00$ (16.86 ± 1.165) %SL ความยาวคอคอดหาง $12.69 - 21.57$ (18.81 ± 2.872) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบไขมัน ถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบหาง $14.43 - 16.20$ (15.21 ± 0.586) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 112)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวไม่เกินไปปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าและร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องยาว กระดูก supraoccipital process ยาวประมาณ 3 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral

ethmoid ไม่มี process และไม่โค้งลงส่วนล่าง แถบฟัน vomerine teeth แคบและโค้งยาว แถบฟัน mandibular teeth โค้งยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก nasal ยาว กระดูก infraorbital ทุกชิ้นมีความยาวใกล้เคียงกัน กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process ยาว และปลายแหลม กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นรูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอกและเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate ไม่เชื่อมติดต่อกับกระดูก hyomandibular กระดูก interopercle ขนาดใหญ่ แบนและกว้างตอนท้าย ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal เป็น process สั้น ยาวไม่ถึง 1 เท่าของความกว้างฐาน process กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แผ่กว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process และมีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ใต้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural spine ยาว ยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างเรียวยาว และมีปลายแหลม กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารรูปร่างกลมมน ลำไส้ยาวไม่เกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร ใต้ส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย กระเพาะลมมีลายเส้นกระจายทั่วบริเวณผิว

ลักษณะของสี

ปลาไม่มีแถบสีดำ 3 แถบ พาดไปตามแนวยาวของลำตัว โดยแถบแรกอยู่ตำแหน่งด้านหลังจุดเริ่มต้นของแถบอยู่บริเวณกระดูก supraoccipital process ผ่านฐานครีบท้องและฐานครีบท้องบน มาสิ้นสุดบริเวณตอนบนของฐานครีบท้อง แถบที่สองอยู่บริเวณแนวเส้นข้างตัว แถบที่สามมีสีจางมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณเหนือฐานครีบท้องผ่านฐานครีบท้องมาสิ้นสุดบริเวณเหนือฐานครีบท้องบน บริเวณขากรรไกรบนและเหนือบริเวณงูมมีสีเทาอ่อน บริเวณขากรรไกรล่างมีสีขาว ครีบท้อง ครีบท้อง และครีบท้องมีสีเทา ครีบท้องและครีบท้องมีสีขาว

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

Mystus rhegma มีการกระจายพันธุ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง อาหารที่ปลากินได้แก่ ลูกปลานขนาดเล็ก แมลง แมลงน้ำ และเศษซากของพืช (Roberts, 1992) และมีรายงานว่าพบในบริเวณแม่น้ำโขงตอนกลาง (Rainboth, 1996) แต่ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเท่านั้น (ภาพที่ 113) โดยตัวอย่างปลาที่ได้จาก

อ.พยุหศิริ จ.นครสวรรค์ ได้จากเครื่องมือประมงคือ อวนทับดิ่ง ในตลาดพบขายในรูปของปลาสด และปลาสวยงาม


ภาพที่ 112 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Mystus rhegma*

112.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก


a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบท้อง, d. กระดูก humero-cubital process

112.2 ลักษณะทางกายวิภาค


e. แนวด้านบนของกะโหลกหัว, f. แนวด้านล่างของกะโหลกหัว, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม




a




b




c



d




e



f




g




h




i




j




k




l




m




n




o




p




q




r




s




t



u





ภาพที่ 114 *Mystus singaringan* (Bleeker, 1846)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Mystus singaringan* (Bleeker, 1846) (ภาพผนวกที่ 11.22)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : แขนงปลายข้าว แขนงใบข้าว

ชื่อสามัญ (common name): Bagrid catfish, Long fin mystus

Mystus cavasius Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1840 : 411 (partim; Java only)

Bagrus macronemus Bleeker 1846b : 150 (type locality : Batavia, in fluviis) (junior primary homonym of *Bagrus macronemus* Ranzani, 1842 : 334)

Bagrus singaringan Bleeker, 1846b : 150 (type locality : Batavia, in fluviis)

Bagrus heterurus Bleeker, 1846b : 151 (type locality : Batavia, in fluviis)

Hypselobagrus macronema Bleeker, 1862 : 58, pl.73 (*Bagrus singaringan* and *B. heterurus* places as junior synonyms)

Macrones nigriceps Günther, 1864 : 77

Hypselopterus nigriceps Fowler, 1905 : 407

Mystus nigriceps Fowler, 1935 : 94; Roberts, 1989 : 122

Mystus cavasius Smith, 1945 : 389 (partim)

Mystus macronema Roberts, 1993 : 28

Mystus albolineatus Roberts, 1994

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 116 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 56.8-209.4 mm SL

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 2686 (1 ตัวอย่าง, 149.2 mm SL) คอยเต่า ธงชัย จ.ตาก 5 กุมภาพันธ์ 2517; KUMF 0979 (1, 107.3) อ.บางไทร จ.อยุธยา H.M. Smith 17 พฤศจิกายน 2466; KUMF 0989 (1, 139.9) แม่น้ำลพบุรี H.M. Smith 22 ตุลาคม 2469; KUMF 0981 (1, 91.2) แม่น้ำเจ้าพระยา H.M. Smith 17 พฤศจิกายน 2466; KUMF 2608 (1, 124.9) จ.อยุธยา พรชัยและคณะ 25 มกราคม 2517; KUMF 6607 (10, 111.2-160.2) ตลาดหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ภาสกร แสนจันแดง 9 ตุลาคม 2540 KUMF 6572 (2, 84.2-106.8) จ.เพชรบูรณ์ ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 27 มิถุนายน 2541; KUMF 6573 (20, 86.2-122.4) ตลาดสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ภาสกร แสนจันแดง 24 พฤศจิกายน 2541

ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออก NIFI 0985 (1 ตัวอย่าง, 90.1 mm SL) คลองบางขนาก จ.ฉะเชิงเทรา H.M. Smith date unknown; KUMF 6608 (3, 76.9-81.3) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี กิตติพงษ์ จารุวานินทร์ 20 มกราคม 2542; KUMF 6574 (14, 58.2-79.2) ตลาดปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ภาสกร แสนจันแดง 22 พฤศจิกายน 2540; KUMF 6575 (20, 68.8-134.9) ตลาดนครนายก จ.นครนายก ภาสกร แสนจันแดง 19 พฤศจิกายน 2540

ลุ่มน้ำแม่โขง KUMF 6609 (11 ตัวอย่าง, 56.8-126.3 mm SL) อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ภาสกร แสนจันแดง 18 ตุลาคม 2540; KUMF 6610 (1, 90.4) อ.ปากคาด จ.หนองคาย ภาสกร แสนจันแดง 18 ตุลาคม 2540; KUMF 6611 (1, 104.2) อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ภาสกร แสนจันแดง 20 ตุลาคม 2540; KUMF 6612 (2, 115.3-127.8) อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ภาสกร แสนจันแดง 19 ตุลาคม 2540

ลุ่มน้ำแม่กลอง KUMF 0988 (1 ตัวอย่าง, 111.6 mm SL) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี H.M. Smith 16 ธันวาคม 2468; KUMF 0983 (1, 93.2) คลองบางปลาร้อย จ.ราชบุรี H.M. Smith ธันวาคม 2466; NIFI 2415 (2, 95.3-105.2) แม่น้ำแม่กลอง T.R. Roberts date unknown; KUMF 6613 (8, 129.2-209.4) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ภาสกร แสนจันแดง 7 ธันวาคม 2540

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 0975 (1 ตัวอย่าง, 111.2 mm SL) แม่น้ำตาปี บ้านดอน H.M. Smith 30 กันยายน 2466; KUMF 0977 (1, 96.2) แม่น้ำปัตตานี จ.ปัตตานี H.M. Smith 15 ตุลาคม 2466; KUMF 0990 (1, 138.9) จ.นครศรีธรรมราช H.M. Smith 4 กรกฎาคม 2471; NIFI UNCAT. (2, 76.3-98.2) แม่น้ำตาปี ไกล่พระแสง L. Sonkphan, M. Kottelate and T.R. Roberts 3 เมษายน 2528 ; KUMF 6614 (8, 95.4-122.3) ตลาดปาลัส อ.มายอ จ.ปัตตานี ภาสกร แสนจันแดง 24 ตุลาคม 2540; KUMF 6615 (1, 132.9) อ.สุไหงโกทก จ.นราธิวาส ภาสกร แสนจันแดง 16 กุมภาพันธ์ 2540

ลักษณะเด่นของชนิด

M. singaringan แตกต่างจาก *M. cavasius* โดยไม่มีจุดสีในบริเวณจุดเริ่มต้นของครีบล้าง ส่วนหลังของกระดูก urohyal มีลักษณะเป็น process ปลายแหลม

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.ii-iii/6-8; C.8/7; P.I 7-10; V.i5; B.R.8-10; GR17-24; VC41-42

หัวรูปร่างแบนข้าง ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัวมีผิวหนังคลุม เยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอซ้อนทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตามีผิวหนังคลุม หนวดมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงครีบบาง หนวดบริเวณจมูกยาวถึงส่วนท้ายของหัว หนวดคู่บนอกที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณกลางครีบอก หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวถึงบริเวณโคนครีบอก ซึ่งกรงเหงือกเป็นเส้นเรียวยาว ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบล้างซึ่ง ขอบด้านหน้าตอนปลายก้านครีบแข็งของครีบล้างไม่เป็นซี่จึก ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกมีขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดไล่เลี่ยกัน กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้าง ยาวน้อยกว่า 3 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาวจะงอยปาก $31.80 - 44.14$ (40.43 ± 2.605) %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา $20.09 - 30.04$ (25.38 ± 1.936) %HL ระยะห่างระหว่างตา $22.35 - 34.58$ (30.45 ± 2.062) %HL ความลึกและความกว้างของหัวบริเวณตา $44.01 - 57.64$ (50.30 ± 2.85) และ $51.90 - 64.79$ (59.16 ± 2.869) %HL ความกว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process $8.02 - 13.41$ (10.85 ± 1.536) และ $31.52 - 46.62$ (37.37 ± 3.589) % HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ครีบล้าง ครีบท้อง รูทวาร ครีบไขมันและครีบก้น $15.60 - 21.20$ (17.74 ± 1.244), $28.98 - 39.78$ (32.11 ± 1.882), $42.06 - 47.79$ (45.01 ± 1.438), $47.68 - 54.97$ (51.10 ± 1.964), $42.24 - 51.76$ (45.54 ± 1.936) และ $62.99 - 75.35$ (67.40 ± 2.033) %SL ความยาวฐานครีบล้าง ครีบไขมันและ ครีบก้น $12.19 - 15.95$ (13.99 ± 0.835), $41.08 - 50.65$ (46.52 ± 2.291) และ $7.11 - 11.52$ (9.75 ± 1.026) %SL ความยาวก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบล้าง $10.74 - 17.68$ (15.58 ± 1.336) และ $12.68 - 19.42$ (16.08 ± 1.255) %SL ความยาวคอดหาง $19.71 - 33.83$ (22.97 ± 1.870) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบไขมันถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบบาง $8.49 - 11.42$ (10.05 ± 0.684) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 115)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวไม่เกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเป็นร่องยาว ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องขนาดเล็ก กระดูก supraoccipital process ยาวมากกว่า 4 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และไม่โค้งลงส่วนล่าง แฉกฟัน vomerine teeth แคบและโค้งยาว แฉกฟัน mandibular teeth โค้งยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก nasal ยาว กระดูก infraorbital ทุกชิ้นมีความยาวใกล้เคียงกัน กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process ยาว และปลายแหลม กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นรูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอกและเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate ไม่เชื่อมติดต่อกับกระดูก hyomandibular กระดูก interopercle ขนาดใหญ่แบนและกว้างตอนท้าย ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal เป็น process สั้น ยาวไม่ถึง 1 เท่าของความกว้างฐาน process กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แฉกกว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process และมีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ใต้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural spine ยาวยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างเรียวยาว และมีปลายแหลม กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารรูปร่างกลมมน ลำไส้ยาวเกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร ใต้ส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย กระเพาะลมนี้อยู่ด้านหลังกระเพาะอาหาร

ลักษณะของสี

สีโดยรวมของลำตัวมีสีเทาปนดำหรือบรอนซ์เงินหรือตะกั่ว ยกเว้นส่วนท้องมีสีขาว หนวดมีสีขาว ในตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก (ความยาวไม่เกิน 110 mm SL) อาจมีแถบสีขาวพาดผ่านแนวกลางตัว

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

Mystus singaringan มีการกระจายพันธุ์อยู่ในเกาะสุมาตรา บอร์เนียว และชาวประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย (Roberts, 1994) อาหารที่ปลากินได้แก่ ตัวอ่อนแมลง

แพลงก์ตอนสัตว์ และปลาขนาดเล็ก (Rainboth, 1996) ในไทยสามารถพบปลาชนิดนี้ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำทางภาคตะวันตก และ ลุ่มน้ำทางภาคใต้ (ภาพที่ 116) โดยปลาชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำหรือแม่น้ำขนาดใหญ่ เครื่องมือประมงที่ใช้จับคือ อวน เบ็ด โท่ง และข่าย ในตลาดพบขายในรูปปลาสดและปลาสวยงาม

ข้อสังเกต

Roberts (1994) รายงานว่า *Bagrus macronemus*, *B. singaringan* และ *B. heterurus* ถูกตั้งเป็นปลาชนิดใหม่ในเอกสารเดียวกันโดย Bleeker ในปี ค.ศ. 1846 แต่จากการตรวจสอบเอกสารและตัวอย่างโดย Roberts เองพบว่าปลาที่รายงานทั้งสามชนิดเป็นปลาชนิดเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกชื่อที่เหมาะสมที่สุดมาใช้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ จากการที่ *B. macronemus* Bleeker, 1846 จัดเป็น *junoir primary homonym* ของ *Bagrus macronemus* Ranzani, 1842 = *Bagre bagre* (Linnaeus, 1766) ที่จัดอยู่ในกลุ่ม *ariid catfish* ของเขต *neotropical* เพราะฉะนั้นชื่อที่มีสิทธิ์นำมาใช้ได้มีอยู่สองชื่อคือ *B. singaringan* และ *B. heterurus* Roberts เลือกใช้ *B. singaringan* และใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ของปลาชนิดนี้ว่า *Mystus singaringan* (Bleeker, 1846)

Roberts (1994) รายงานว่าถึงแม้ Kuhl และ van Hasselt เก็บตัวอย่าง *Mystus singaringan* ได้จากขวาในปี ค.ศ. 1820-23 แต่ตัวอย่างถูกจำแนกเป็น *M. cavasius* โดย Valenciennes และยังไม่มีการตั้งปลาชนิดนี้เป็นปลาชนิดใหม่


ภาพที่ 115 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Mystus singaringan*


115.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก


a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบท้อง, d. กระดูก humero-cubital process

115.2 ลักษณะทางกายวิภาค

e. แนวด้านบนของกะโหลกหัว, f. แนวด้านล่างของกะโหลกหัว, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม







ภาพที่ 117 *Mystus wolffi* (Bleeker, 1851)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Mystus wolffi* (Bleeker, 1851) (ภาพผนวกที่ 11.23)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : แขนงนวล

ชื่อสามัญ (common name): Bagrid catfish, Estuarine catfish

Bagrus wolffii Bleeker, 1851 : 205 (type locality : Bandjermassing, in fluviis)

Hyselobagrus wolffii Bleeker, 1862 : 58 (Bandjermassing, Pontianak, Palembang)

Macrones wolffii Günther, 1864 : 82

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 68 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 95.4-158.8 mm SL

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา KUMF 1005 (1 ตัวอย่าง, 107.9 mm SL) ลานเท แม่น้ำเจ้าพระยา H.M. Smith 7 ธันวาคม 2466; KUMF 1007 (1, 122.2) แม่น้ำเจ้าพระยา อ.บางไทร จ.อยุธยา H.M. Smith 6 กุมภาพันธ์ 2470; KUMF 1001 (1, 106.1) แม่น้ำเจ้าพระยา อ.ปากเกร็ด H.M. Smith 29 มิถุนายน 2466

ลุ่มน้ำทางภาคใต้ KUMF 1003 (1 ตัวอย่าง, 158.8 mm SL) ตลาดปัตตานี จ.ปัตตานี H.M. Smith 14 ตุลาคม 2466; KUMF 1006 (1, 140.2) แม่น้ำตาปี บ้านดอน H.M. Smith 4 มกราคม 2470; KUMF 6616 (15, 97.2-119.2) อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ภาสกร แสนจันแดง 25 ธันวาคม 2540; KUMF 6617 (7, 95.4-112.2) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 20 กันยายน 2540; KUMF 6618 (22, 97.6-133.1) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาสกร แสนจันแดง 30 มิถุนายน 2541; KUMF 6619 (7,

115.8-152.4) ตลาคนราทัศน์ จ.นราธิวาส ภาสกร แสนจันแดง 7 กรกฎาคม 2541; KUMF 6620 (12, 113.4-126.1) ตลาคนราธิวาส จ.นราธิวาส ภาสกร แสนจันแดง 14 กุมภาพันธ์ 2541

ลักษณะเด่นของชนิด

Mystus wolffi แตกต่างจาก *M. gulio* และ *M. micracanthus* โดยมีร่องกึ่งกลางหัว ตอนหลังยาวถึงฐานกระดูก supraoccipital process ขอบด้านข้างของกระดูก lateral ethmoid โค้งงอลงด้านล่าง หนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel) ยาวถึงบริเวณฐานครีบท่าง

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A.iii-iv / 8-11; C.8/7; P.I 8-9; V.i5; B.R.8-10; GR26-45; VC38-40

หัวรูปร่างแบนข้าง ปากกว้างตามขนาดของปลายจะงอยปาก บริเวณตอนบนของหัว มีผิวหนังคลุม เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอสันทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตามีผิวหนังคลุม หนวดมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงครีบก้น หนวดบริเวณจมูกยาวถึงจุดเริ่มต้นของฐานครีบท่าง หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวถึงส่วนต้นครีบท้อง หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวถึงโคนครีบอก ซึ่งกรองเหงือกเป็นเส้นเรียวยาว ซึ่งจำกัดบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบท่างของครีบท่างซี่ล่าง ขอบด้านหน้าตอนปลายก้านครีบท่างของครีบท่างไม่เป็นซี่จุก ซึ่งจำกัดบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบท่างซี่ล่างของครีบอกมีขนาดใหญ่ ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดเล็กต่างกัน กระดูก humero-cubital process มีฐานแคบ ยาวเป็น 2-3 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาวจะงอยปาก $32.70 - 40.57 (35.91 \pm 1.581) \%HL$ ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา $18.30 - 28.51 (22.27 \pm 3.115) \%HL$ ระยะห่างระหว่างตา $35.34 - 43.36 (38.62 \pm 1.756) \%HL$ ความลึกและความกว้างของหัวบริเวณตา $43.81 - 55.27 (48.91 \pm 2.928)$ และ $55.04 - 68.67 (59.97 \pm 2.679) \%HL$ ความกว้างฐานและความยาวของกระดูก supraoccipital process $10.39 - 17.84 (14.51 \pm 1.498)$ และ $29.18 - 40.46 (34.26 \pm 2.476) \%HL$ ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ครีบท่าง ครีบท้อง รูทวาร ครีบท้องและครีบก้น $17.26 - 22.04 (19.82 \pm 0.941)$, $32.72 - 40.10 (36.23 \pm 1.549)$, $46.68 - 53.63 (50.16 \pm 2.055)$, $52.47 - 61.08 (57.51 \pm 1.735)$, $60.54 - 72.62 (67.51 \pm 2.593)$ และ $61.58 - 71.45 (67.99 \pm 1.597) \%SL$ ความยาวฐานครีบท่าง ครีบท้อง และ ครีบก้น $11.44 - 15.11 (13.05 \pm 0.637)$, $11.48 - 19.21 (14.89 \pm 2.243)$ และ $13.19 - 16.77$

(14.52 ± 0.811) %SL ความยาวก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบหลัง $17.69 - 24.29$ (20.96 ± 1.466) และ $15.76 - 21.92$ (18.52 ± 1.288) %SL ความยาวคอดหาง (18.11 ± 0.961) %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบไขมัน ถึงจุดกึ่งกลางของฐานครีบหาง (19.02 ± 0.964) %SL

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 118)

กระดูก mesethmoid เป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวไม่เกินปลายกระดูก lateral ethmoid ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าและร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องยาว กระดูก supraoccipital process ยาวมากกว่า 4 เท่าของความกว้างของฐาน ขอบของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และโค้งลงส่วนล่าง แถบฟัน vomerine teeth แคบและโค้งยาว แถบฟัน mandibular teeth โค้งยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก nasal ยาว กระดูก infraorbital ขึ้นที่ 2 ยาวกว่าขึ้นอื่นๆ กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process ยาว และปลายแหลม กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นรูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอกและเชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate ไม่เชื่อมติดต่อกับกระดูก hyomandibular กระดูก interopercle ขนาดใหญ่แบนและกว้างตอนท้าย ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal เป็น process สั้น ยาวไม่ถึง 1 เท่าของความกว้างฐาน process กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง ส่วนท้ายของกระดูก ceratohyal และส่วนต้นของ epihyal แผ่กว้าง กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process และมีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ใต้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก neural spine ยาว ยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน กระดูก Müllerian process มีรูปร่างเรียวยาว และมีปลายแหลม กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารรูปร่างกลมมน ลำไส้ยาวไม่เกิน 4 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร ใต้ส่วนหลังรูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยม กระเพาะลมมีลายเส้นกระจายทั่วบริเวณผิว

ลักษณะของสี

แนวด้านหลังและแนวด้านข้างลำตัวมีสีเทาปนดำ บริเวณแนวด้านล่างลำตัวและส่วนท้องมีสีขาว หนวดบริเวณมุมมีสีเทา หนวดบริเวณขากรรไกรบนมีสีดำ หนวดบริเวณขากรรไกรล่างมีสีขาว ครีบทุกครีบมีสีเทาปนน้ำตาลอ่อน

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

Mystus wolffi มีการกระจายพันธุ์ในบริเวณมาเลเซีย เกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียว และไทย (Roberts, 1989) ปลาชอบอาศัยอยู่บริเวณใกล้ปากแม่น้ำที่เป็นน้ำกร่อยเข้ามาจนถึงบริเวณที่เป็นน้ำจืด อาหารที่ปลากินได้แก่ แมลง และพวกครัสเตเชียน เครื่องมือประมงที่ใช้จับคือ อวน ข่าย และแห (Rainboth, 1996) ในไทยพบที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำทางภาคตะวันตก ลุ่มน้ำทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ลุ่มน้ำทางภาคใต้ (ชวลิตและคณะ, 2540) สำหรับตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำทางภาคใต้ (ภาพที่ 119) ในตลาดพบขายในรูปของปลาสด และปลาสวยงาม


ภาพที่ 118 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Mystus wolffi*


118.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก

a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบท้อง, d. กระดูก humero-cubital process

118.2 ลักษณะทางกายวิภาค

e. แนวด้านบนของกะโหลกหัว, f. แนวด้านล่างของกะโหลกหัว, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม





สกุลปลาคอดหมู Genus *Rita* Bleeker, 1858


Rita Bleeker, 1858, Acta. Soc. Sc. Indo.-Neerl., 4:60 (type species: *Pimelodus rita* Hamilton-Buchanan, 1822)

ลักษณะเด่นของสกุล

ปลาในสกุลนี้มีขนาด 2 คู่ ได้แก่หนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel) 1 คู่ และหนวดที่ขากรรไกรล่าง (mandibular barbel) 1 คู่ บริเวณส่วนท้ายของหัวเป็นแผ่นกระดูกผิวขรุขระ และไม่มีหนังปกคลุม

ลักษณะทั่วไปของสกุล

หัวใหญ่และแบนลงเล็กน้อย จะงอยปากกลมมน ปากกว้าง ตามีขนาดเล็กและมีผิวหนังคลุมตา เมื่อมองจากด้านล่างของหัวไม่เห็นตา หัวไม่มีรูรับความรู้สึก หนวดมีเพียง 2 คู่ ได้แก่หนวดที่ขากรรไกรบน 1 คู่และหนวดที่ขากรรไกรล่าง 1 คู่ เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดเหงือกไม่ซ้อนทับกัน ส่วนท้ายของหัวลักษณะเป็นแผ่นกระดูกแข็งผิวขรุขระ และไม่มีผิวหนังคลุม ขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกมีซี่จึกขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดไล่เลี่ยกัน ขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบหลังไม่เป็นซี่จึก ขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังเป็นซี่จึก ก้านครีบที่แตกแขนงของครีบหลังมีจำนวน (branched ray) มีจำนวน 6 ก้าน ครีบไขมันมีฐานสั้น



ภาพที่ 120 *Rita sacerdotum* Anderson, 1879

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Rita sacerdotum* Anderson, 1879 (ภาพผนวกที่ 11.24)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : กดหมู

ชื่อสามัญ (common name) : Rita

Rita sacerdotum Anderson, 1879 Anatomical and Zoological Researches: account of two expeditions to Yunnan: 864 (type locality: Irrawaddy river, Burma)

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 1 ตัวอย่าง ความยาวมาตรฐาน 670.5 mm SL

ลุ่มน้ำสาละวิน NIFI UNCAT. (1 ตัวอย่าง: 670.5 mm SL) อ.แม่สอด จ.ตาก Kubota 15 กรกฎาคม 2543

ลักษณะเด่นของชนิด

หนวดมี 2 คู่ ได้แก่หนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel) 1 คู่ และหนวดที่ขากรรไกรล่าง (mandibular barbel) 1 คู่ แนวด้านบนส่วนท้ายของหัวมีแผ่นกระดูกแข็งผิวขรุขระ ครีบหลังมีก้านครีบที่แตกแขนง (branched ray) จำนวน 6 ก้าน

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 6; A.v /9; C.8/7; R.L 10 ; V.i6; VC37

หัวรูปร่างแบนลงเล็กน้อย จะงอยปากกลมมน ปากกว้าง บริเวณตอนบนส่วนท้ายของหัวเป็นแผ่นกระดูกผิวขรุขระและไม่มีผิวหนังคลุม แผ่นกระดูกปิดคอดคอไม่ซ้อนทับกัน เมื่อมองจากด้านล่างของหัวไม่เห็นตา ตามีผิวหนังคลุม หนวดมี 2 คู่ หนวดที่ขากรรไกรยาวถึงกึ่งกลางหัว หนวดที่ขากรรไกรล่างยาวไม่ถึงคอดคอ หัวไม่มีรูรับความรู้สึก ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังซึ่ง ขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบหลังไม่มีซี่จัก ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกมีขนาดเล็กและมีความยาวใกล้เคียงกัน ความยาวจะงอยปาก 35.47 %HL ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา 6.29 %HL ระยะห่างระหว่างตา 51.43 %HL ความกว้างและความยาวของฐานกระดูก supraoccipital process 33.93 และ 29.97 %HL ความกว้างและความลึกของหัวบริเวณตา 55.97, 42.71 %HL ความกว้างและความลึกของหัวบริเวณฐานของกระดูก supraoccipital process 82.56 และ 75.69 %HL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบหลัง ครีบไขมัน ครีบอก ครีบท้องและครีบกัน: 42.11, 66.98, 25.38, 58.06 และ 74.66 %SL ความยาวของฐานครีบหลัง ครีบไขมัน และครีบกัน: 13.34, 14.25 และ 11.83 %SL ความยาวคอดหาง 16.32 %SL ความยาวของก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบหลัง: 20.24 และ 16.32 %SL ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบไขมันถึงจุดกึ่งกลางของครีบหาง 15.86 %SL

โครงสร้างภายนอกบางลักษณะแสดงไว้ตามภาพที่ 121

ลักษณะของสี

สีโดยรวมของลำตัวมีสีดำปนเทา แนวด้านล่างของลำตัวและส่วนท้องมีสีขาว หนวดที่บริเวณขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างมีสีขาวปนเทา ครีบอก ครีบหลัง ครีบกันและครีบหาง มีสีเทาจางๆ บริเวณขอบตามีสีขาว


การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง

ปลาชนิดนี้มีการกระจายพันธุ์ในกลุ่มน้ำอืดของพม่า ขนาดใหญ่สุดมีความยาวมากกว่า 1 เมตร (Ferraris, 1998) ในไทยพบปลาชนิดนี้ในบริเวณลุ่มน้ำสาละวินเขต อ.แม่สอด จ.ตาก
ข้อสังเกต

Ferraris (1998) กล่าวว่าโดยทั่วไปคนมักเข้าใจผิดว่าปลาชนิดนี้คือ *Rita rita* ซึ่งมีการกระจายพันธุ์กว้างจากพม่าถึงอินเดีย


หมายเหตุ

เนื่องจากตัวอย่างปลาชนิดนี้หายากและมีจำนวนน้อย ตัวอย่างทั้งหมดเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของกรมประมง จึงไม่สามารถหาตัวอย่างมาศึกษาทางกายวิภาคได้



ภาพที่ 121 ลักษณะโครงสร้างภายนอกของปลาชนิด *Rita sacerdotum*

a. แนวค้ำบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบหลัง



สกุลปลาแคหัวเหลี่ยม Genus *Sperata* Holly, 1939

Macrones Dumeril, 1856:484 (type species: *Bagrus lamarrii* Valenciennes, 1840, by original designation)

Aoria Jordan, 1919:341 (replacement for *Macrones* Dumeril, 1856, and therefore taking the same type species, *Bagrus lamarrii* Valenciennes, 1840). Preoccupied in Coleoptera by *Aoria* Baly, 1863.

Sperata Holly, 1939:143 (replacement for *Macrones* Dumeril, 1856, and therefore taking the same type species. *Bagrus lamarrii* Valenciennes, 1840 [but mistakenly listed with “*Sperata vittata* (Bloch)” as type species]).

Aorichthys Wu, 1939:131 (replacement for *Aoria* Jordan, 1919, and therefore taking the same type species. *Bagrus lamarrii* Valenciennes, 1840)

Macronichthys White and Moy-Thomas, 1940:505 (replacement for *Aoria* Jordan, 1919, and therefore taking the same type species, *Bagrus lamarrii* Valenciennes, 1840).

Osteobagrus (subgenus of *Mystus*) Jayaram, 1954:529, 547 (type species: *Pimelodus aor* Hamilton, 1822, by original designation)

ลักษณะเด่นของสกุล

ปลาสกุลนี้มีลักษณะโดยรวมคล้ายกับสกุล *Hemibagrus* แต่แตกต่างกันโดยมีหัวแบนยาวคล้ายใบพาย (spatulate) กระดูก infraorbital ท่อนที่ 1 และ 5 ยาวกว่าชิ้นที่ 2, 3 และ 4 กระดูก mesethmoid มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม


ลักษณะทั่วไปของสกุล

ลำตัวยาวปานกลาง ส่วนต้นแบนลงและส่วนท้ายแบนข้าง หัวมีรูปร่างแบนยาว ยาวมากคล้ายใบพาย ปากกว้าง ตาไม่มีผิวหนังคลุม หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงครีบท้อง ขอบด้านหลังของก้านครีบท้องของครีบท้องหลังเป็นซี่จักซี่ลง ครีบท้องมีฐานยาว เยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอสันทับกัน กระดูก mesethmoid ขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม ขอบด้านบนของกระดูก lateral ethmoid ไม่มี process และไม่โค้งลงด้านล่าง ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเชื่อมติดต่อกับร่องกึ่ง

กลางหัวส่วนหลัง ร่องกึ่งกลางหัวเป็นร่องยาว กระดูก supraoccipital process ยาว ยาวประมาณ 3 เท่าของความกว้างของฐาน แฉกฟัน vomerine teeth มีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยวขนาดใหญ่และกว้าง แฉกฟัน mandibular teeth โคนยาว ซึ่งกรงเหงือกเป็นเส้นหนา ขอบด้านหลังก้านครีบกึ่งของครีบอกเป็นซี่จุกขนาดเล็ก ความยาวใกล้เคียงกัน หรือไล่เลี่ยกัน กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้นและปลายเรียวแหลม กระดูก infraorbital ชั้นที่ 1 และ 5 มีความยาวมากกว่าชั้นที่ 2, 3 และ 4 กระดูก nasal ยาว กระดูก maxilla ยาว กระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนกว้าง เชื่อมติดต่อกับกระดูก quadrate และ hyomandibular กระดูก interopercle มีขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ขกเว้นก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนท้ายตอนกลางของกระดูก urohyal เป็น process ยาว ยาวเป็น 2-2.5 เท่าของความกว้างของฐาน process ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal ได้ process เป็นแผ่นแบน กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบนกว้างมากที่ส่วนท้ายของ girdle กระเพาะอาหารมีรูปร่างคล้ายทรงกระบอก ลำไส้ยาวเกิน 3 เท่าของความยาวกระเพาะอาหาร กระเพาะลมมีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจและมีลายเส้นกระจายบริเวณผิว ใต้ส่วนหลังมีรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย (Y)

ข้อสังเกต

Ferraris และ Runge (1999) กล่าวว่าปลาในกลุ่มนี้มีรายงานภายใต้ชื่อสกุล *Sperata* และ *Aorichthys* ถูกตีพิมพ์ในปีเดียวกันคือ ค.ศ. 1939 โดยใช้ปลาต้นแบบของสกุลคือ *Bagrus larmarrii* (= *Sperata seenghala*) สกุล *Sperata* ตีพิมพ์เดือนมกราคมใน *Zoologischer Anzeiger* และสกุล *Aorichthys* ตีพิมพ์เดือนธันวาคมใน *Sinensia* ดังนั้นสกุล *Aorichthys* เป็น junior synonym ของสกุล *Sperata*



ภาพที่ 123 *Sperata acicularis* Ferraris and Runge, 1999

ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) : *Sperata acicularis* Ferraris and Runge, 1999 (ภาพผนวก
ที่ 11.25)

ชื่อท้องถิ่น (local name) : กัดหัวเสียม

ชื่อสามัญ (common name) : Long-whiskered catfish

Macrones aor (not Hamilton) Day, 1873:cclxi (in part) (Burma); 1877:444 (Burma).

Vinciguerra, 1890:217 (Burma: Mandalay). Kwaw Win, 1971:53, fig. 22-1 (Burma:

Irrawady River at Taung-tha-man 'inn')

Aoria aor (not Hamilton) Prashad and Mukerji, 1929:178 (Burma: Indawgyi Lake)

Mystus(*Aorichthys*) *aor* (not Hamilton) Misra, 1976:74 (in part) (upper Burma)

Aorichthys aor (not Hamilton) Jayaram, 1981:205 (in part, Burma) Talwar and Jhingran,
1991:547 (in part) (upper Burma)

Aorichthys seenghala : Vidthayanon et al.,(1997)

Sperata acicularis Ferraris & Runge, 1999

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา: 15 ตัวอย่าง ช่วงความยาวมาตรฐาน 103.5-570.4 mm SL

ลุ่มน้ำสาละวิน NIFI 01135 (2 ตัวอย่าง, 181.3-190.2 mm SL) น้ำยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
สมโภชน์ อัคระทวีวัฒน์ 21 มีนาคม 2524; KUMF 6621 (10 ตัวอย่าง, 225.9-570.4 mm SL) ตลาด
แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาสกร แสงจันทร์แดง 30 มี.ค 2541

ลุ่มน้ำตะนาวศรี NIFI 2560 (3 ตัวอย่าง, 103.5-260.2 mm SL) แม่น้ำตะนาวศรี บริเวณชายแดน พม่า ตรงข้ามกับ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ชวลิต วิทยานนท์ และ กิตติพงษ์ จารุธานินทร์ 12 พฤษภาคม 2537

ลักษณะเด่นของชนิด

หัวแบนยาวคล้ายใบพาย (spatulate) กระดูก infraorbital ชั้นที่ 1 และ 5 ยาวกว่าชั้นที่ 2, 3 และ 4 กระดูก mesethmoid มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม

ลักษณะทั่วไปของชนิด

D.I 7; A iii-iv /9-10; C.8/7; P.I 8-10; P i 5; B.R.12-13; GR13-14; VC53-55

หัวแบนลงมาก ยาวมากคล้ายใบพาย ปากกว้าง บริเวณตอนบนของหัวมีผิวหนังคลุม เยื่อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอซ้อนทับกัน ไม่สามารถมองเห็นตาได้จากด้านล่างของหัว ตาไม่มีผิวหนังคลุม หนวดมี 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงครีบท้อง หนวดบริเวณจมูกยาวถึงขอบด้านหน้าของตา หนวดคู่นอกที่ขากรรไกรล่างยาวถึงโคนครีบอก หนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่างยาวถึงคอดคอ ซึ่งร่องเหงือกเป็นเส้นหนา ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบล้างซี่ลง ขอบด้านหน้าก้านครีบแข็งของครีบล้างไม่เป็นซี่จก ซึ่งจับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกมีขนาดเล็ก ความยาวของซี่เท่าๆ กัน หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้าง ยาวน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างของฐาน ความยาวจะงอยปาก $35.42 - 39.26 (37.77 \pm 1.209) \%HL$ ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตา $10.30 - 16.87 (13.77 \pm 1.882) \%HL$ ระยะห่างระหว่างตา $16.91 - 21.27 (19.38 \pm 1.042) \%HL$ ความกว้างและความยาวของฐานกระดูก supraoccipital process $3.37 - 7.80 (5.82 \pm 1.195)$ และ $15.95 - 23.96 (21.99 \pm 2.261) \%HL$ ความกว้างและความลึกของหัวบริเวณตา $33.74 - 41.26 (37.30 \pm 2.385)$, $22.50 - 29.15 (25.89 \pm 2.062) \%HL$ ความกว้างและความลึกของหัวบริเวณฐานของกระดูก supraoccipital process $38.78 - 49.64 (44.86 \pm 3.062)$, $39.09 - 44.58 (41.06 \pm 2.024) \%HL$ ในตัวอย่างปลาที่มีความยาวไม่เกิน 253.8 mmSL ความยาวจากจุดปลายสุดของจะงอยปากถึงจุดเริ่มต้นของครีบล้าง ครีบไขมัน ครีบอก ครีบท้อง และครีบก้น : $40.59 - 43.81 (42.45 \pm 0.981)$, $59.33 - 67.28 (63.24 \pm 2.216)$, $24.21 - 28.17 (25.88 \pm 1.030)$, $50.53 - 55.67 (53.55 \pm 1.213)$ และ $71.66 - 79.55 (74.42 \pm 2.142) \%SL$ ความยาวของฐานครีบล้าง ครีบไขมัน และครีบก้น: $12.66 - 14.93 (13.77 \pm 0.679)$, $21.08 - 26.97 (23.94 \pm$

1.795) และ $8.84 - 14.27 (10.62 \pm 1.218) \%SL$ ความยาวคอดหาง $14.12 - 17.54 (15.85 \pm 0.965) \%SL$ ความยาวของก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบหลัง: $11.79 - 15.04 (13.80 \pm 0.869)$ และ $15.85 - 20.95 (19.23 \pm 1.471) \%SL$ ความยาวจากจุดสิ้นสุดของฐานครีบไขมันถึงจุดกึ่งกลางของครีบหาง $13.84 - 16.16 (15.05 \pm 0.690) \%SL$

ลักษณะทางกายวิภาค (ภาพที่ 124)

เหมือนกับคำบรรยายของสกุล

ลักษณะของสี

สีโดยรวมของลำตัวมีสีเทา แนวด้านล่างของลำตัวและส่วนท้องมีสีขาว หนวดที่บริเวณขากรรไกรบนและหนวดบริเวณมุมมีสีขาวปนเทา หนวดบริเวณขากรรไกรล่างมีสีขาว ครีบอก ครีบหลัง ครีบกันและครีบก้น มีสีเทาจางๆ ขอบด้านท้ายของครีบไขมันมีจุดวงกลมสีดำ

การกระจายพันธุ์ ถิ่นอาศัย ชีววิทยา และการประมง


ปลาชนิดนี้มีการกระจายพันธุ์กว้างในลุ่มน้ำของพม่า ปลามีการสืบพันธุ์วางไข่ในบริเวณลำธารที่มีพื้นเป็นหินโดยตัวผู้ทำหน้าที่ดูแลไข่จนกระทั่งไข่ฟักออกมาเป็นตัว ลูกปลาในระยะแรกอาศัยอาหารที่เป็นสารละลายน้ำนมที่หลั่งออกมาจากผนังท้องของปลาตัวผู้ พ่อปลาเล็กดูแลลูกปลาเมื่อเห็นว่าลูกปลาสามารถว่ายน้ำหลบหลีกหนีศัตรูได้ (Ferraris และ Runge, 1999) ในไทยพบปลาชนิดนี้บริเวณลุ่มน้ำสาละวินและลุ่มน้ำตะนาวศรีบริเวณชายแดนไทยพม่า (ภาพที่ 125) เครื่องมือประมงที่ใช้จับคือ อวน และเบ็ด ในตลาดพบขายในรูปปลาสดและปลาสวยงาม

ข้อสังเกต

เคยมีรายงานว่าพบปลากดหัวเสียมในแม่น้ำสาละวินของไทยภายใต้ชื่อวิทยาศาสตร์คือ *Aorichthys seenghala* (ชวลิตและคณะ, 2540 และ สมโภชน์และชวลิต, 2541) แต่จากการศึกษาโดย Ferraris และ Runge (1999) สามารถสรุปได้ว่าปลาชนิดนี้เป็นปลาชนิดใหม่และมีชื่อวิทยาศาสตร์

ศาสตร์คือ *Sperata acicularis* สำหรับตัวอย่างที่ Ferraris และ Runge รายงานว่าได้จากกลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา จ.สิงห์บุรี น่าจะได้จากร้านค้าปลาสวยงามที่รับปลาจากกลุ่มน้ำสาละวินมาขาย

ชื่อชนิด 'acicularis' มาจากภาษาละตินใช้อย่างถึงลักษณะของกระดูก supraoccipital
process ที่เพรียวยาวและปลายแหลม




ภาพที่ 124 ลักษณะโครงสร้างภายนอกและกายวิภาคของปลาชนิด *Sperata acicularis*


124.1 ลักษณะโครงสร้างภายนอก

a. แนวด้านบนและล่างของหัว, b. ซี่กรองเหงือก, c. ก้านครีบแข็งของครีบอกและครีบลำ, d. กระดูก humero-cubital process

124.2 ลักษณะทางกายวิภาค

e. แนวด้านบนของกะโหลกหัว, f. แนวด้านล่างของกะโหลกหัว, g. แถบฟัน mandibular teeth, h. กระดูก palatine และ maxilla, i. กระดูก nasal, j. กระดูก lacrymal และ infraorbital 1-5, k. ชุดกระดูก suspensorium, l. กระดูก interopercle และ opercle, m. กระดูก urohyal, n. ชุดกระดูก hyal และ กระดูก branchiostegal ray, o. แนวด้านบนของกระดูก Weberian apparatus, p. แนวด้านล่างของกระดูก Weberian apparatus, q. กระดูก pelvic girdle, r. กระดูก posttemporal, s. กระเพาะและลำไส้, t. ใต้ส่วนหน้าและส่วนหลัง, u. กระเพาะลม





วิจารณ์

จากการศึกษาครั้งนี้พบปลากระดูกปลาแขยงวงศ์ Bagridae ในไทยรวม 7 สกุล 25 ชนิด คือ *Bagrichthys macropterus*, *B. macracanthus*, *Batasio blythi*, *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp., *H. elegans* n.sp., *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus*, *L. siamensis*, *L. stenomus*, *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan*, *M. wolffi*, *Rita sacerdotum* และ *Sperata acicularis* ในสกุล *Hemibagrus* พบปลา 2 ชนิด เป็นปลาชนิดใหม่ สำหรับสกุล *Leiocassis* และ *Rita* ได้รายงานการพบ *Leiocassis micropogon* และ *Rita sacerdotum* เป็นครั้งแรกในประเทศไทย จำนวนชนิดของปลากระดูกปลาแขยงที่พบในไทยจากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีจำนวนมากกว่าที่ Smith (1945) และ Suvatti (1950) ได้รายงานไว้ โดย Smith (1945) ได้ทำการศึกษาถึงชนิดของปลาน้ำจืดที่พบในไทยพร้อมกับรายงานถึงจำนวนชนิดของกลุ่มปลากระดูกปลาแขยงไว้ในหนังสือชื่อ *The freshwater fishes of siam, or Thailand* จำนวน 4 สกุล 16 ชนิด ส่วน Suvatti (1950) ได้รวบรวมรายชื่อปลาที่พบในไทยและรายงานถึงจำนวนชนิดของปลากระดูกปลาแขยงไว้ในหนังสือ *The fauna of Thailand* จำนวน 4 สกุล 21 ชนิด นอกจากนี้ยังมีนักอนุกรมวิธานอีกหลายท่านได้แก่ Fowler (1934a, 1935, 1937, 1939), Roberts (1992, 1994) และ Ferraris และ Runge (1999) ได้ทำการสำรวจและรายงานถึงชนิดของกลุ่มปลากระดูกปลาแขยงที่พบในไทยเอาไว้ จากการสำรวจในอดีตแสดงให้เห็นว่าพบจำนวนชนิดของกลุ่มปลากระดูกปลาแขยงจำนวนค่อนข้างน้อยทั้งนี้อาจเป็นเพราะการคมนาคมในอดีตยังไม่สะดวกเหมือนในปัจจุบันจึงทำให้การเดินทางสำรวจให้กระจายไปทั่วทุกจุดในไทยนั้นกระทำได้ยาก และอีกส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากการวิเคราะห์ชนิดในอดีตอาศัยเอกสารอ้างอิงจากประเทศอินเดียเป็นหลักทำให้การวิเคราะห์ชนิดของปลาบางกลุ่มผิดพลาดไป

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกรายงานโดยนักอนุกรมวิธานหลายท่านหรือที่ถูกรายงานโดยนักวิชาการจากกรมประมง ยังมีข้อผิดพลาดและชื่อที่รายงานหลายชื่อเป็นชื่อพ้อง ดังนั้นชื่อวิทยาศาสตร์ที่มีรายงานในอดีตจำเป็นต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อสามารถใช้ในการอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับของนักอนุกรมวิธานทั่วโลก ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปรายชื่อวิทยาศาสตร์ของปลาวงศ์ปลากระดูกปลาแขยงที่มีรายงานการพบในประเทศไทยและชื่อที่สมควรนำมาใช้ซึ่งได้จากผลของการศึกษาครั้งนี้ตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 จำนวนชนิดของปลาในวงศ์ Bagridae ที่มีรายงานการพบในประเทศไทยและชื่อที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

ชื่อวิทยาศาสตร์ของปลาที่มีรายงานว่าพบในประเทศไทย (Recorded species)	ชื่อที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
<i>Aorichthys seenghala</i> จาก (สม โภชน์, 2525)	<i>Sperata acicularis</i> Ferraris and Runge, 1999
<i>Bagriodes macracanthus</i> จาก (Smith, 1945); (Suvatti, 1950)	<i>Bagrichthys macracanthus</i> (Bleeker, 1854)
<i>Bagriodes melapterus</i> จาก (Smith, 1945)	<i>Bagrichthys macropterus</i> (Bleeker, 1853)
<i>Bagriodes macropterus</i> จาก (Smith, 1945)	
<i>Batasio tengana</i> จาก (สันทนา และ ทศพล, 2537)	<i>Batasio blythi</i> (Day, 1877)
<i>Mystus havmolleri</i> จาก (Smith, 1945)	
<i>Mystus stigmaturus</i> จาก (Fowler, 1934a)	
<i>Mystus nemurus</i> จาก (สันทนาและทศพล, 2537)	<i>Hemibagrus filamentus</i> (Chaux & Fang, 1949)
<i>Mystus wyckioides</i> จาก (สันทนาและทศพล, 2537)	<i>Hemibagrus microphthalmus</i> (Day, 1877)
<i>Mystus nemurus</i> จาก (Fowler, 1934a); (Smith, 1945)	<i>Hemibagrus nemurus</i> (Val. in Cuv. & Val., 1839)
<i>Mystus wyckii</i> จาก (Fowler, 1935); (Smith, 1945)	<i>Hemibagrus wycki</i> (Bleeker, 1858)
<i>Leiocassis poecilopterus</i> จาก (Smith, 1945); (Suvatti, 1950)	<i>Leiocassis poecilopterus</i> (Val. in Cuv. & Val., 1839)
<i>Leiocassis siamensis</i> จาก (Suvatti, 1950); (Smith, 1945)	<i>Leiocassis siamensis</i> Ragan, 1913
<i>Leiocassis albicallaris</i> จาก (Fowler, 1937)	
<i>Leiocassis bicolor</i> จาก (Fowler, 1934a)	
<i>Leiocassis stenomus</i> จาก (Smith, 1945)	<i>Leiocassis stenomus</i> (Val. in Cuv. & Val., 1839)

ตารางที่ 5 ต่อ

ชื่อวิทยาศาสตร์ของปลาที่มีรายงานว่าพบใน ประเทศไทย (Recorded species)	ชื่อที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
<i>Mystus atrifasciatus</i> จาก (Fowler, 1937)	<i>Mystus atrifasciatus</i> Fowler, 1937
<i>Heterobagrus bocourti</i> จาก (Smith, 1945)	<i>Mystus bocourti</i> (Bleeker, 1864)
<i>Prajahipokia rex</i> จาก (Fowler, 1934b)	
<i>Mystus bocourti</i> จาก (Roberts, 1994)	
<i>Mystus cavasius</i> จาก (Roberts, 1994)	<i>Mystus cavasius</i> (Hamilton, 1822)
<i>Mystus gulio</i> จาก (Fowler, 1934a); (Smith, 1945)	<i>Mystus gulio</i> (Hamilton, 1882)
<i>Mystus multiradiatus</i> จาก (Roberts, 1992)	<i>Mystus multiradiatus</i> Roberts, 1992
<i>Mystus micracanthus</i> จาก (Fowler, 1934a); (Smith, 1945)	<i>Mystus micracanthus</i> (Bleeker, 1846)
<i>Mystus pulcher</i> จาก (สันทนา และ ทศพล, 2537)	
<i>Mystus vittatus</i> จาก (Fowler, 1935)	<i>Mystus mysticetus</i> Roberts, 1992
<i>Mystus mysticetus</i> จาก (Roberts, 1992)	
<i>Mystus nigriceps</i> จาก (Fowler, 1935)	<i>Mystus singaringan</i> (Bleeker, 1846)
<i>Mystus singaringan</i> จาก (Roberts, 1994)	
<i>Mystus cavasius</i> จาก (Smith, 1945)	
<i>Mystus nigriceps</i> จาก (Fowler, 1934a; 1937)	
<i>Mystus albolineatus</i> จาก (Roberts, 1994)	
<i>Mystus rhegma</i> จาก (Fowler, 1935); (Roberts, 1992)	<i>Mystus rhegma</i> Fowler, 1935
<i>Mystus vittatus</i> จาก (Smith, 1945)	<i>Mystus multiradiatus</i> Roberts, 1992
	<i>Mystus mysticetus</i> Roberts, 1992
<i>Mystus wolffii</i> จาก (Fowler, 1934a); (Smith, 1945)	<i>Mystus wolffii</i> (Bleeker, 1851)
<i>Mystus planiceps</i> จาก (Fowler, 1935)	

ลักษณะของปลากดปลาแขยงในวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย

ปลากดปลาแขยงเป็นปลาไม่มีเกล็ด ชาวบ้านเรียกว่าปลาหนัง ปลาในวงศ์นี้มีลำตัวค่อนข้างยาว ส่วนใหญ่ลำตัวส่วนหน้าแบนลง ลำตัวส่วนหลังแบนข้าง (ยกเว้นในสกุล *Bagrichthys* และ *Batasio* มีลำตัวแบนข้าง) จะงอยปากแคบถึงกว้างมีรูปร่างคล้ายใบพายหรือรูปกรวย หนวดมี 4 คู่ ได้แก่ หนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel) หนวดบริเวณจมูก (nasal barbel) หนวดคู่นอก ที่ขากรรไกรล่าง (outer mandibular barbel) และหนวดคู่ในที่ขากรรไกรล่าง (inner mandibular barbel) (ยกเว้นสกุล *Rita* มีหนวดเพียง 2 คู่ ได้แก่ หนวดที่ขากรรไกรบน 1 คู่ และหนวดที่กรรไกรล่าง 1 คู่) หนวดที่ขากรรไกรบนมีความยาวมากกว่าหนวดคู่อื่น รูจมูกมี 2 คู่ รูจมูกคู่หน้าอยู่บริเวณปลายจะงอยปาก รูจมูกคู่หลังอยู่ด้านหลังหนวดบริเวณจมูก มีแถบฟันที่ขากรรไกรบน (maxillary teeth) ขากรรไกรล่าง (mandibular teeth) และเพดานปาก (vomerine teeth) ฟันที่ขากรรไกรส่วนมากขนาดเล็ก (villiform) ตาอาจมีหรือไม่มีผิวหนังคลุม ปลากดปลาแขยงมีครีบคู่ได้แก่ ครีบอก (pectoral fin) และครีบท้อง (pelvic fin) ครีบเดี่ยวได้แก่ ครีบหลัง (dorsal fin) ครีบไขมัน (adipose fin) ครีบก้น (anal fin) และครีบหาง (caudal fin) ครีบอกและครีบหลังมีก้านครีบแข็ง ครีบอกและครีบท้องตั้งอยู่ในแนวระนาบ ครีบหางเว้าลึกมีลักษณะคล้ายรูปส้อม (forked) เชื้อหุ้มแผ่นกระดูกปิดคอดคอซ้อนหรือไม่ซ้อนทับกัน ช่องเปิดเหงือก (gill opening) ยาวลงไปถึงส่วนบนของฐานครีบทู มีเส้นข้างตัวที่สมบูรณ์บริเวณแนวกลางลำตัว

กะโหลกศีรษะของปลาวงศ์นี้โดยทั่วไปค่อนข้างกว้าง (ยกเว้นในสกุล *Bagrichthys* และ *Batasio*) กระดูก mesethmoid รูปร่างเป็นแผ่นกระดูกแคบๆ ความกว้างของกระดูกใกล้เคียงกัน หรือเป็นรูปสามเหลี่ยม ตอนหน้ามีส่วนที่ยื่นออกด้านข้างขนาดแตกต่างกัน ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้า (anterior fontanelle) แยกหรือไม่แยกออกจากร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลัง (posterior fontanelle) ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าเป็นร่องยาว ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลังเป็นร่องยาวหรือเป็นร่องขนาดเล็ก กระดูก supraoccipital process สั้นหรือยาว ขอบด้านนอกของกระดูก lateral ethmoid มีหรือไม่มี process และโค้งหรือไม่โค้งลงด้านล่าง แถบฟัน vomerine teeth สั้นหรือยาว และ แถบหรือกว้าง แถบฟัน mandibular teeth รูปร่างคล้ายกระดูกสวหรือโค้งยาว (ยกเว้นใน *Bagrichthys macropterus* ไม่มีแถบฟันนี้) กระดูกซึ่งรองรับเหงือกเป็นเส้นหนาหรือเรียวยาว กระดูก nasal สั้นหรือยาว กระดูก maxilla สั้นหรือยาว กระดูก lacrymal ด้านหน้าตอนล่างมี process สั้นหรือยาวและมีปลายเรียวยาวแหลม กระดูก infraorbital มี 5 ชิ้น ความยาวแตกต่างหรือใกล้เคียงกัน กระดูก metapterygoid รูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอกขนาดเล็ก หรือเป็นแผ่นแบนกว้าง กระดูก interopercle มีขนาดเล็กหรือ

ขนาดใหญ่ กระดูก branchiostegal ray เป็นเส้นเรียวยาวทั้งหมดทุกก้านหรือเป็นเส้นยาวเรียวยกเว้น ก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน กระดูก urohyal เป็น process สั้นหรือยาว ส่วนท้ายของกระดูก posttemporal เป็น process มีหรือไม่มีส่วนแผ่เป็นแผ่นแบนอยู่ได้ process กระดูก Weberian apparatus มีกระดูก Müllerian process รูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอก มีปลายทู่หรือเรียวยาวมีปลายแหลม กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้างหรือแคบ ขอบด้านหลังก้านครีบกึ่งของครีบอกเป็นซี่จึก ขอบด้านหน้าก้านครีบกึ่งของครีบอกหลังเป็นหรือไม่เป็นซี่จึก ขอบด้านหลังก้านครีบกึ่งของครีบอกหลังเป็นซี่จึก หรือเรียบ กระดูก pelvic girdle เป็นแผ่นแบน กว้างเฉพาะส่วนท้ายของ girdle หรือแผ่กว้างไปถึงส่วนหน้า กระเพาะอาหารมีรูปร่างคล้ายรูปทรงกระบอกหรือกลมมนหรือยาวรี ถ้าไส้สั้นหรือยาว กระเพาะลมมีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจและมีหรือไม่มีลายเส้นกระจายในบริเวณผิว ใต้ส่วนหลังรูปร่างคล้ายอักษรตัววาย (Y) หรือสามเหลี่ยม ผลการศึกษาระบบโครงสร้างในครั้งนี้สอดคล้องกับ Mo (1991) สำหรับผลการศึกษาทางกายวิภาคในเรื่องรูปร่างของกระเพาะลมพบว่า กระเพาะลมของปลากดปลาแขยงมีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับของ ประไพศิริ (2511) นอกจากนี้ยังพบข้อมูลเพิ่มเติมว่ากระเพาะลมของกลุ่มปลากดปลาแขยงมีหรือไม่มีลายเส้นกระจายในบริเวณผิว ในด้านข้อมูลเปรียบเทียบทางกายวิภาคเรื่องอื่นๆ ในกลุ่มของปลากดปลาแขยงของไทยที่ยังไม่เคยมีนักอนุกรมวิธานทำการศึกษาเปรียบเทียบไว้ได้แก่ข้อมูลเรื่อง รูปร่างของกระเพาะอาหาร ลักษณะของลำไส้ และรูปร่างของไตนั่น ผู้เขียนได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะดังกล่าวนี้ในกลุ่มปลากดปลาแขยงที่พบในประเทศไทยและพบว่า รูปร่างของกระเพาะอาหารมีลักษณะคล้ายรูปตัวยู ลักษณะสั้นหรือเรียวยาว ลำไส้มีขนาดสั้นถึงยาวและส่วนมากมีการม้วนขดบริเวณตอนล่างของกระเพาะอาหาร ใต้ส่วนหลังมีขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายตัววาย หรือสามเหลี่ยม นอกจากนี้ Mo (1991) ยังได้ศึกษาถึงลักษณะทางกายวิภาคอื่นๆ ของปลาวงศ์ Bagridae และได้ให้คำบรรยายไว้ดังนี้คือ กล้ามเนื้อ retractor posttemporalis เจริญดีและยื่นเข้าไประหว่างกะโหลกศีรษะและกระดูก posttemporal แนว dorsomedium ของกระดูก posttemporal หนาและผิวด้านหลังยึดติดอยู่กับมัดกล้ามเนื้อ epaxial muscle แนวด้านหลังของกระดูก posttemporal มี ร่อง posttemporal fossa เจริญดี สำหรับลักษณะร่วมของปลาวงศ์ Bagridae ที่มีเหมือนกับกลุ่ม Siluroid คือ มีหนวดที่ขากรรไกรบนเป็นอิสระจากริมฝีปากบน ตอนปลายของกระดูก palatine ตัดตรง กระดูก palatine ยึดติดอย่างหลวมๆ กับกระดูก lateral ethmoid ขูดกระดูก infraorbital มีทั้งหมด 6 ชิ้น กระดูก 5th ceratobranchial มีฟัน ขั้วกระดูกสันหลัง 6 ขั้ว เชื่อมติดต่อกันเป็น complex vertebra

ลักษณะเด่นที่ใช้จำแนกสกุลและชนิดของปลาในวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย

1. สกุลปลาตุ๊กมุล Genus *Bagrichthys* Blecker, 1858

ผลจากการศึกษาพบว่าปลาสกุลนี้มีลักษณะเด่นคือ บริเวณขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบหลังมีซี่จักซี่ขึ้น กอดหางแบนข้างและยาว ผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับ Rainboth (1996), Weber และ de Beaufort (1913), Roberts (1989) และ Mo (1991) นอกจากนี้ Mo (1991) ได้บรรยายลักษณะเด่นของปลาสกุล *Bagrichthys* เพิ่มเติมคือ ครีบไขมันยาวและมีขอบส่วนท้ายไม่แยกเป็นอิสระ เส้นแนวด้านหลังของลำตัวยกเป็นสันสูง (keel-like) จากการศึกษาครั้งนี้พบปลาสกุล *Bagrichthys* ในไทยจำนวนทั้งหมด 2 ชนิด ได้แก่ *Bagrichthys macracanthus* และ *B. macropterus*

Bagrichthys macracanthus มีลักษณะคล้ายกับ *Bagrichthys macropterus* แต่แตกต่างกันโดยมีความยาวก้านครีบแข็งของครีบหลังยาวกว่า (24.62 ± 2.182 vs. 15.45 ± 1.552 %SL) แถบฟัน mandibulary teeth ขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายกระสวย กระดูก ceratohyal และ epihyal เป็นแผ่นกว้าง กระดูก brachioistegal ray เป็นเส้นเรียวยาว ยกเว้น ก้านสุดท้ายและรองสุดท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ผลที่ได้จากการศึกษาลักษณะภายนอกสอดคล้องกับ Roberts (1989) และ Rainboth (1996)

Bagrichthys macropterus มีลักษณะคล้ายกับ *Bagrichthys macracanthus* แต่แตกต่างกันโดยมีความยาวก้านครีบแข็งของครีบหลัง 15.45 ± 1.552 %SL ไม่มีแถบฟัน mandibulary teeth กระดูก ceratohyal และ epihyal ขนาดเล็ก กระดูก branchioistegal ray เป็นเส้นเรียวยาวทุกก้าน ผลที่ได้จากการศึกษาลักษณะภายนอกสอดคล้องกับ Roberts (1989) และ Rainboth (1996)

2. สกุลปลาแขยงเขา Genus *Batasio* Blyth, 1860

ผลการศึกษาพบว่าปลาในสกุล *Batasio* มีลักษณะคล้ายกับปลาในสกุล *Leiocassis* แต่แตกต่างกันโดยมีกระดูก metapterygoid เชื่อมติดต่อกับเฉพาะกระดูก quadrate ไม่เชื่อมติดต่อกับกระดูก hyomandibular ผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับ Mo (1991) แต่แตกต่างกันเล็กน้อยโดยผลจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าลักษณะการมีรูรับความรู้สึกบริเวณหัวไม่สามารถนำมาใช้เป็นลักษณะเด่นของสกุลได้เพราะพบว่าในปลาสกุล *Leiocassis* บางชนิดก็มีรูรับความรู้สึกบริเวณส่วนหัว

เหมือนกัน นอกจากนี้ยังพบว่าปลาในสกุลนี้มีลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ กระดูก interopercle แบน และมีความกว้างใกล้เคียงกันทั้งชิ้น จากการศึกษาพบปลาสกุล *Batasio* ในไทยทั้งหมดเพียง 1 ชนิด คือ *Batasio blythi* ซึ่งปลาชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับ *Leiocassis poecilopterus* แต่แตกต่างโดยมี หนวดบริเวณจมูกสั้น ยาวไม่ถึงบริเวณขอบด้านหน้าของตา แพนหางไม่มีแถบหรือจุด

3. สกุลปลาคดเหลือง กดกึ่ง Genus *Hemibagrus* Blecker, 1862

ผลการศึกษาพบว่าปลาในสกุล *Hemibagrus* แตกต่างจากสกุล *Mystus* โดยมีกระดูก metapterygoid เป็นแผ่นแบนกว้าง (plate-like) แนวด้านล่างของกระดูก lacrymal มี process สั้น แถบฟัน vomerine teeth กว้าง ส่วนท้ายของกระดูก urohyal ลักษณะเป็น process ยาว ผลการศึกษา ลักษณะภายนอกและทางกายวิภาคสอดคล้องกับ Mo (1991) นอกจากนี้ยังพบว่าปลาในสกุล *Hemibagrus* มีลักษณะแตกต่างจากสกุล *Sperata* โดยมีกระดูก infraorbital ชิ้นที่ 2 และ 5 ยาวกว่า ชิ้นที่ 1, 3 และ 4 และส่วนหัวแบนกว้าง จากการศึกษาพบปลาสกุล *Hemibagrus* ทั้งหมดจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ *Hemibagrus filamentus*, *H. nemurus*, *H. microphthalmus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp. และ *H. elegans* n.sp.

Hemibagrus filamentus แตกต่างกับ *H. nemurus* ในเรื่องตำแหน่งจุดสิ้นสุดของ ปลาครีบหลังขณะที่พับลงให้ครีบบนในแนวระนาบ โดย *H. filamentus* มีจุดสิ้นสุดของปลาครีบ หลังอยู่บริเวณส่วนต้นครีบอก ขณะที่ *H. nemurus* มีจุดสิ้นสุดไม่ถึงจุดเริ่มต้นของครีบอก ผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับ Rainboth (1996)

Hemibagrus microphthalmus แตกต่างจากปลาในสกุล *Hemibagrus* ที่พบในประเทศไทยชนิดอื่นโดยมีก้านครีบแข็งของครีบหลังที่อ่อนสามารถโค้งงอได้และขอบด้านหลัง ก้านครีบแข็งเรียบ ผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับ Rainboth (1996) (โดย Rainboth รายงานปลา ชนิดนี้โดยใช้ชื่อวิทยาศาสตร์คือ *Mystus wyckioides*) แต่การศึกษานี้ยังพบลักษณะเด่นอื่นๆ อีก คือ ขอบด้านหลังก้านครีบแข็งของครีบอกมีซี่จักขนาดใหญ่ ซี่จักอันสุดท้ายที่อยู่ปลายสุดของก้าน ครีบแข็งมีลักษณะโค้งงอคล้ายตะขอ ผลจากการศึกษานี้พบว่านักอนุกรมวิธานหลายท่านในอดีตได้รายงานการพบปลาชนิดนี้โดยใช้ชื่อวิทยาศาสตร์คือ *Hemibagrus wyckioides* แต่ผลจากการ สืบสวนและศึกษาของผู้เขียนพบว่าตัวอย่างปลากัง *Hemibagrus microphthalmus* ที่เก็บตัวอย่างได้ จากลุ่มน้ำสาละวินของไทยมีลักษณะภายนอกเหมือนกับปลาคดกึ่ง หรือปลาเลิง *H. wyckioides* ที่

มีรายงานการพบในลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำตาปี แต่เนื่องจาก *Hemibagrus microphthalmus* มีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ก่อน *H. wyckoides* ดังนั้นชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องของปลาชนิดนี้จึงควรใช้ *Hemibagrus microphthalmus* (Day, 1877)

Hemibagrus nemurus แตกต่างจาก *H. filamentus* โดยเมื่อพับครีบล้างลงตามแนวระนาบ จุดสิ้นสุดของปลายครีบล้างไม่ถึงจุดเริ่มต้นของครีบอกไขมัน ผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับ Rainboth (1996) นอกจากนี้ยังพบว่า *H. nemurus* แตกต่างจาก *H. mekongensis* n.sp. โดยมีร่องกึ่งกลางหัวกว้าง จะงอยปากกว้าง ส่วนที่กว้างที่สุดของกระดูก lateral ethmoid กว้างเท่ากับกระดูก frontal ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวเลยปลายของกระดูก lateral ethmoid

Hemibagrus wycki แตกต่างจากปลา *Hemibagrus microphthalmus* โดยกระดูก supraoccipital process สั้น ยาวไม่ถึงกระดูกฐานครีบล้าง ซึ่งกับบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบอกของครีบอกมีขนาดเล็กและยาวใกล้เคียงกับซี่งักด้านใน ก้านครีบอกของครีบล้างแข็งแรงและไม่สามารถโค้งงอได้ ขอบด้านหลังก้านครีบอกของครีบล้างเป็นซี่งัก หนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel) ยาวไม่ถึงครีบท้อง ผลการศึกษาแตกต่างจาก Rainboth (1996) โดย Rainboth บรรยายลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้ว่ามีกระดูก supraoccipital process ยาว ยาวถึงกระดูกฐานครีบล้าง ซึ่งเป็นการอธิบายที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง

Hemibagrus mekongensis n.sp. แตกต่างจาก *Hemibagrus nemurus* โดยมีร่องกึ่งกลางหัวแคบ จะงอยปากแคบ ส่วนที่กว้างที่สุดของกระดูก lateral ethmoid กว้างน้อยกว่ากระดูก frontal ตอนท้ายของกระดูก mesethmoid ยาวไม่เลยส่วนปลายของกระดูก lateral ethmoid ปลาชนิดนี้แตกต่างจาก *H. filamentus* โดยมีครีบอกไขมันสั้นกว่า และจุดสิ้นสุดของครีบล้างลงในแนวระนาบยาวไม่ถึงจุดเริ่มต้นของครีบอกไขมัน

Hemibagrus elegans n.sp. แตกต่างจากปลา *Hemibagrus microphthalmus* โดยมีซี่กรองเหงือกเรียวยาวและมีจำนวนมากว่า (17-24 vs. 9-14 อัน) และมีจุด

4. สกุลปลาแขยงหิน Genus *Leiocassis* Bleeker, 1858

ผลการศึกษาพบว่าปลาในสกุล *Leiocassis* มีลักษณะคล้ายกับสกุล *Batasio* แตกต่างโดยกระดูก metapterygoid เชื่อมติดต่อกับทั้งกระดูก quadrate และ hyomandibular ส่วนของกระดูก interopercle ขนาดใหญ่แบนและกว้างกว่าทางตอนท้าย สอดคล้องกับการศึกษาของ Mo (1991) นอกจากนี้ Mo ยังบรรยายลักษณะเด่นของปลาในสกุล *Leiocassis* ไว้ดังนี้ คือ จะงอยปากยื่นยาว หั้วแคบ และยาว (elongate) แขนงของ cranial sensory canal ยื่นไปถึงกระดูก infraorbital ระบายด้านหลังของกระดูก cleithrum ขยายใหญ่ กล้ามเนื้อขากรรไกรต่อไปถึงส่วนของกะโหลกหัว จากการศึกษาครั้งนี้พบปลาสกุล *Leiocassis* ในไทยทั้งหมดจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus*, *L. siamensis* และ *L. stenomus*

Leiocassis micropogon แตกต่างจากปลาชนิดอื่นในสกุล *Leiocassis* ที่พบในประเทศไทยโดยมีความกว้างของหัวบริเวณตาน้อย (46 – 50 vs. > 52 %HL) ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ Roberts (1989) นอกจากนี้ยังพบว่า *L. micropogon* มีปลายของจะงอยปากเป็นมุมแหลมเมื่อมองจากด้านล่างของหัว

Leiocassis poecilopterus แตกต่างจาก *L. stenomus* โดยมีปลายเพนบนและล่างของครีบท่างกลมมน ซี่กรองเหงือกมีจำนวน 8-9 อัน กระดูก humero-cubital process มีฐานกว้าง ยาวน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างของฐาน Mo (1991) รายงานว่าปลาชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่มีกระดูก humero-cubital process ขนาดใหญ่

Leiocassis siamensis แตกต่างจาก *L. poecilopterus* และ *L. stenomus* โดยมี แถบฟัน mandibular teeth สั้น รูปร่างคล้ายกระดูก ร่องกึ่งกลางหัวส่วนหน้าและส่วนหลังมีลักษณะเป็นร่องยาวเชื่อมติดต่อกัน ขอบของกระดูก lateral ethmoid มี process 2 อัน กระดูก supraoccipital process ยาวประมาณ 3 เท่าของความกว้างของฐาน นอกจากนี้ Rainboth (1996) รายงานว่าปลาชนิดนี้แตกต่างจาก *L. stenomus* โดยมีหนวดที่ขากรรไกรบนยาวไม่ถึงบริเวณช่องเปิดเหงือก แต่จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าหนวดที่ขากรรไกรบนของปลาทั้งสองชนิดนี้มีความยาวใกล้เคียงกัน จึงไม่ควรนำมาใช้ในการจำแนกชนิด

Leiocassis stenomus แตกต่างจาก *Leiocassis poecilopterus* โดยมีปลายเพนบน และล่างของครีบทงแหลม ซึ่งร่องเหงือกมีจำนวน 10-12 อัน กระดูก humero-cubital process มีฐานแคบ ยาวเกิน 3 เท่าของความกว้างของฐาน Rainboth (1996) รายงานว่าปลาชนิดนี้แตกต่างจาก *L. siamensis* โดยมีหนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงฐานครีบอก แต่จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าหนวดที่ขากรรไกรบนของปลาทั้งสองชนิดนี้มีความยาวใกล้เคียงกัน จึงไม่สมควรนำมาใช้ในการจำแนกชนิด

5. สกุลปลาแขยง Genus *Mystus* Scopoli, 1777

ปลาสกุล *Mystus* แตกต่างจากสกุล *Hemibagrus* โดยกระดูก metapterygoid เป็นแผ่นรูปร่างคล้ายแท่งทรงกระบอกและยึดติดกับกระดูก quadrate และไม่ยึดติดกับกระดูก hyomandibular ด้านล่างของกระดูก lacrymal มี process ยาวและมีปลายแหลม ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ Mo (1991) นอกจากนี้ยังได้พบลักษณะเด่นอื่นๆ ของสกุล *Mystus* ที่แตกต่างจากสกุล *Hemibagrus* เพิ่มเติม คือ แถบฟัน vomerine teeth แคบ ตอนท้ายของกระดูก urohyal มี process สั้น การศึกษาครั้งนี้พบปลาสกุล *Mystus* ทั้งหมดในประเทศไทยจำนวน 10 ชนิด ได้แก่ *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan* และ *M. wolffi*

Mystus atrifasciatus แตกต่างจาก *M. rhegma* โดยมีซี่จึกที่ปลายสุดของก้านครีบทงของครีบทงหลังไม่โค้งยาวคล้ายตะขอ และซี่จึกทุกซี่ก่อนข้างสั้น จุดสิ้นสุดของร่องกึ่งกลางหัวส่วนหลัง (posterior fontanalle) ไม่ถึงฐานกระดูก supraoccipital process ซึ่งร่องเหงือกมีจำนวนมากกว่า (24-30 vs. 17-21 อัน) ผลการศึกษาของผู้เขียนสอดคล้องกับ Roberts (1992) แต่แตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของจำนวนซี่กรงเหงือก โดย Roberts รายงานว่า *Mystus atrifasciatus* มีจำนวนซี่กรงเหงือก 23-30 อัน และ *M. rhegma* มีจำนวนซี่กรงเหงือก 19-21 อัน

Mystus bocourti แตกต่างจากปลาในสกุล *Mystus* ชนิดอื่นโดยมีก้านครีบทงของครีบทงหลังยาว (53.76 ± 5.618 %SL) และสามารถโค้งงอได้ ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ Roberts (1994) และ Rainboth (1996)

Mystus mysticetus แตกต่างจาก *M. multiradiatus* โดยสามารถมองเห็นตาได้จากทางด้านล่างของส่วนหัว ขอบด้านบนของครีบกันเว้าเข้า ผลการศึกษาลักษณะภายนอกสอดคล้องกับ Roberts (1992)

Mystus rhegma แตกต่างจาก *M. atrifasciatus* โดยจุดสิ้นสุดของร่องกึ่งกลางหัวตอนหลังอยู่บริเวณฐานกระดูก supraoccipital process ซึ่งร่องเหงือกมีจำนวนน้อยกว่า (17 – 21 vs. 24 – 30 อัน) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Roberts (1992) ผลจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า *M. rhegma* มีลักษณะเด่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งสามารถใช้ในการแยกออกจากกลุ่มของปลาแขยงข้างลายชนิดอื่นที่พบในไทยได้ คือ ซี่จักสุดท้ายที่อยู่ปลายสุดของก้านครีบแข็งของครีบอกโค้งยาวคล้ายตะขอ

M. singaringan แตกต่างจาก *M. cavasius* โดยไม่มีจุดสีดำขนาดใหญ่ในบริเวณจุดเริ่มต้นของครีบหลัง ส่วนท้ายของกระดูก urohyal เป็น process เค่นชัด และมีปลายแหลม ข้อกระดูกสันหลังมีจำนวนน้อยกว่า (41-42 vs. 43 อัน) ผลการศึกษาลักษณะภายนอกของ *M. cavasius* ในครั้งนี้สอดคล้องกับ Roberts (1994) สำหรับปลาแขยงชนิด *Mystus albolineatus* ที่ Roberts (1994) รายงานว่าเป็นปลาชนิดใหม่ของไทย และบรรยายลักษณะเด่นว่าแตกต่างจาก *M. singaringan* โดยมีแถบสีขาวพาดผ่านแนวกลางตัวนั้น ผลจากการศึกษาลักษณะภายนอกอื่นๆ และลักษณะทางกายวิภาคพบว่าลักษณะดังกล่าวมานี้ใน *M. albolineatus* มีลักษณะเหมือนกับ *M. singaringan* สำหรับลักษณะของสีที่ Roberts ใช้ในการจำแนกเป็นลักษณะที่สามารถแปรผันได้ตามสภาพของแหล่งน้ำ จากการตรวจเอกสารพบว่า *M. singaringan* เป็นชื่อที่นำมาใช้ก่อน *M. albolineatus* ดังนั้น *M. albolineatus* ควรเป็นชื่อพ้องของ *M. singaringan*

Mystus wolffi แตกต่างจาก *M. gulio* โดยมีร่องกึ่งกลางหัวตอนหลังยาวถึงฐานกระดูก supraoccipital process ขอบของกระดูก lateral ethmoid โค้งลงด้านล่าง หนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel) ยาวถึงบริเวณฐานครีบหาง ผลการศึกษาเกี่ยวกับความยาวของหนวด สอดคล้องกับ Rainboth (1996) ที่บรรยายลักษณะเด่นของ *M. wolffi* ว่ามีหนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงบริเวณครีบหาง

6.สกุลปลาคอดหมู Genus *Rita* Bleeker, 1858

ปลาในสกุลนี้มีหนวด 2 คู่ ได้แก่หนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbel) 1 คู่ และหนวดที่ขากรรไกรล่าง (mandibular barbel) 1 คู่ บริเวณส่วนท้ายของหัวเป็นแผ่นกระดูกผิวขรุขระ และไม่มีผิวหนังคลุม แผ่นกระดูก humero-cubital process เป็นแผ่นแบนกว้าง ผลการศึกษาลักษณะภายนอกในครั้งนี้สอดคล้องกับ Ferraris (1997) และ Mo (1991) นอกจากนี้ Mo (1991) ยังให้คำบรรยายลักษณะเด่นของปลาในสกุล *Rita* ไว้ดังนี้ คือ กระดูก complex vertebra ยึดติดแน่นกับกระดูก basioccipital แนวด้านข้างแผ่นกระดูก parapophysis ของ complex vertebra เว้าลึก complex centrum ยาว บริเวณกระดูก posttemporal มี sensory canal สอดเข้าไปในชิ้นกระดูก กล้ามเนื้อขากรรไกรยื่นยาวไปยึดจับกับกะโหลกศีรษะ จากการศึกษาครั้งนี้พบปลาสกุล *Rita* ในไทยเพียงชนิดเดียว คือ *Rita sacerdotum* ซึ่งลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้คือเหมือนกับลักษณะของสกุลที่กล่าวมาข้างต้น ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ Ferraris (1997)

7.สกุลปลาคอดหัวเสียม Genus *Sperata* Holly, 1939

ปลาสกุล *Sperata* มีลักษณะโดยรวมคล้ายกับสกุล *Hemibagrus* แต่แตกต่างกันโดยมีหัวแบนยาว ยาวมากคล้ายใบพาย (spatulate) กระดูก infraorbital ท่อนที่ 1 และ 5 ยาวกว่าชิ้นที่ 2, 3 และ 4 กระดูก mesethmoid ขนาดใหญ่ มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม ผลการศึกษาลักษณะภายนอกในครั้งนี้สอดคล้องกับ Mo (1991) และ Ferraris (1999) สำหรับลักษณะเด่นทางกายวิภาค Mo (1991) ได้ให้คำบรรยายของปลาในสกุล *Sperata* นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นดังนี้ คือ กระดูก interneural เปรี้ยวยาว และยึดติดอย่างหลวมๆ กับกระดูก nuchal plate แนวด้านหลังของกระดูก posttemporal มีร่องลึกและมีระยางค์จากกระดูกเพาละมกระจายบนผิวกระดูก กระดูก maxilla บางและยาว Ferraris (1999) บรรยายลักษณะเด่นทางกายวิภาค คือ กระดูก interneural shield ไม่ยึดติดกับกระดูก 1st pterygiophore ของครีบท้อง ส่วนเว้าบริเวณแนวผิวด้านหลังของกระดูก posttemporal ยึดติดกับแนวด้านหน้าของกระดูกเพาละม และกระดูก maxilla ยาว

จากการศึกษาครั้งนี้พบปลาสกุล *Sperata* ในไทยเพียง 1 ชนิด คือ *Sperata acicularis* ซึ่งมีลักษณะเด่นเหมือนกับลักษณะเด่นของสกุลที่กล่าวมาข้างต้น ผลการศึกษาของ Ferraris (1999) ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการจำแนกชนิดปลาในสกุล *Sperata* ได้รายงานถึงลักษณะของ *Sperata acicularis* ว่ามีลักษณะเด่นแตกต่างจากปลาชนิดอื่นในสกุลซึ่งได้แก่ *Sperata aor*, *S. seenghala*

และ *S. aorella* โดยมีกระดูก supraoccipital process ยาวและเรียวสอบไปยังส่วนท้าย กระดูก interneural shield สั้นกว่ากระดูก supraoccipital process และ ไม่กว้างมากกว่าส่วนที่กว้างที่สุดของ กระดูก supraoccipital process ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าลักษณะต่างๆ ที่กล่าวมาไม่สามารถนำมาใช้ในการแยก *Sperata acicularis* ออกจากปลาในสกุล *Hemibagrus* ที่พบในไทยได้ ดังนั้นผลที่ได้จากการศึกษาของ Ferraris ใช้ได้เฉพาะกับการจำแนกชนิดในสกุลเดียวกันเท่านั้น

การกระจายพันธุ์และแหล่งอาศัยของปลาในวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย

ปลากดปลาแขยงมีการกระจายพันธุ์ทุกกลุ่มน้ำของไทย โดยส่วนใหญ่พบในบริเวณที่เป็นน้ำจืด ยกเว้นปลาสองชนิดคือ *Mystus gulio* และ *M. wolffi* สามารถพบในบริเวณใกล้ปากแม่น้ำที่มีน้ำทะเลขึ้นถึง ปลาที่มีการกระจายพันธุ์เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำบางปะกง และลุ่มน้ำแม่โขง ได้แก่ *Bagrichthys macracanthus*, *B. macropterus* และ *Mystus bocourti* ปลาที่พบได้เฉพาะที่ได้แก่ *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus*, *H. mekongensis* n.sp., *H. elegans* n.sp., *M. cavasius*, *Rita sacerdotum* และ *Sperata acicularis* ปลาที่มีการกระจายพันธุ์กว้างได้แก่ *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wyckii*, *Leiocassis siamensis* และ *Mystus singaringan*

Roberts (1992) รายงานว่าเก็บตัวอย่างปลาแขยงข้างลายชนิด *Mystus multiradiatus* ได้จากลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง แต่ผลจากการออกเก็บตัวอย่างไม่พบปลาชนิดนี้ในลุ่มน้ำแม่โขง โดยปลาแขยงข้างลายชนิดที่พบมากได้แก่ *Mystus atrifasciatus* และ *M. mysticetus*

ปลากดแขยงส่วนใหญ่ชอบอาศัยอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ และลำคลองขนาดใหญ่ ยกเว้นใน *Batasio blythi* ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเก็บรวบรวมได้จากบริเวณลำธารบนภูเขาที่มีพื้นเป็นกรวดหินและมีกระแสน้ำน้อยๆ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Smith (1945) สำหรับแขยงหินชนิด *Leiocassis micropogon* พบบนลำธารบนภูเขาโดยปลาจะอาศัยอยู่ในโพรงหินที่มีความลึกประมาณ 1.5-2.0 เมตร *Leiocassis poecilopterus* อาศัยอยู่ในบริเวณป่าพรุที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำค่อนข้างต่ำ

สรุป

สรุปผลการศึกษา

1. ปลากระดี่วงศ์ Bagridae ในไทยพบทั้งหมด 7 สกุล 25 ชนิด คือ
 - 1.1 สกุล *Bagrichthys* พบ 2 ชนิด ได้แก่ *Bagrichthys macracanthus* และ *B. macropterus*
 - 1.2 สกุล *Batasio* พบ 1 ชนิด ได้แก่ *Batasio blythi*
 - 1.3 สกุล *Hemibagrus* พบ 6 ชนิด ได้แก่ *Hemibagrus filamentus*, *H. microphthalmus*, *H. nemurus*, *H. wycki*, *H. mekongensis* n.sp. และ *H. elegans* n.sp.
 - 1.4 สกุล *Leiocassis* พบ 4 ชนิด ได้แก่ *Leiocassis micropogon*, *L. poecilopterus*, *L. siamensis* และ *L. stenomus*
 - 1.5 สกุล *Mystus* พบ 10 ชนิด ได้แก่ *Mystus atrifasciatus*, *M. bocourti*, *M. cavasius*, *M. gulio*, *M. micracanthus*, *M. multiradiatus*, *M. mysticetus*, *M. rhegma*, *M. singaringan* และ *M. wolffi*
 - 1.6 สกุล *Rita* พบ 1 ชนิด ได้แก่ *Rita sacerdotum*
 - 1.7 สกุล *Sperata* พบ 1 ชนิด ได้แก่ *Sperata acicularis*
2. ชนิดที่มีรายงานการพบครั้งแรกของประเทศไทยคือ *Leiocassis micropogon* และ *Rita sacerdotum*
3. จากผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาโดย Mo (1991) สรุปได้ว่ากลุ่มปลากดที่มีขนาดใหญ่ของไทยควรจัดให้อยู่ในสกุล *Hemibagrus*
4. กลุ่มปลากดเหลือที่พบในประเทศไทยมีทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ *Hemibagrus filamentus*, *H. nemurus* และ *H. mekongensis* n.sp. โดย *H. filamentus* เป็นปลากดเหลือชนิดที่เมื่อโตเต็มวัยมีลำตัวขนาดใหญ่เกิน 300 mmSL. ส่วนปลากดเหลือขี้ลิง *H. nemurus* เป็นชนิดมีขนาดเล็กโดยเมื่อโตเต็มวัยมีลำตัวยาวไม่เกิน 300 mmSL. ส่วนปลากดขาว *H. mekongensis* n.sp. เป็นปลาชนิดใหม่ที่พบเฉพาะในบริเวณลุ่มน้ำโขง
5. ตัวอย่างปลาชนิด *Hemibagrus elegans* n.sp. มีครีบไขมันยาว และจุดกระจายทั่ว

บริเวณลำตัว พบในกลุ่มน้ำตะนาวศรีเป็นปลาชนิดใหม่

6. ปลาเกตุ ปลาดัง ปลากัง และปลากิ่ง ซึ่งเป็นปลาคู่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของปลา วงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ *Hemibagrus microphthalmus*

7. ลักษณะทางกายวิภาคที่ใช้ในการจำแนกอันดับสกุลของปลาคู่ปลาแขวงวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย คือ กระดูก nasal กระดูก metapterygoid กระดูก interopercle ชุดกระดูก infraorbital และกระดูก lacrymal กระดูก urohyal กระดูก mesethmoid และแถบฟัน vomerine teeth ส่วนลักษณะโครงสร้างภายนอกที่ใช้ในการจำแนกอันดับสกุลคือ รูปร่างของหัว จำนวนหนวด จำนวนก้านครีบล้างที่แตกแขนง ลักษณะของแผ่นกระดูกบริเวณตอนบนส่วนท้ายของหัว ผิวหนังคลุมตา ความยาวฐานครีบอกไข่ม้วน ลักษณะรูปร่างของครีบอก การมีหรือไม่มีแถบสีบริเวณครีบอก

8. ลักษณะทางกายวิภาคที่ใช้ในการจำแนกอันดับชนิดของปลาคู่ปลาแขวงวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย คือ กระดูก supraoccipital process กระดูก lateral ethmoid กระดูก branchiostegal ray กระดูก urohyal แถบฟัน mandibular teeth แถบฟัน vomerine teeth ส่วนลักษณะโครงสร้างภายนอกที่ใช้ในการจำแนกอันดับชนิดคือ รูปร่างของหัว ตำแหน่งของตา ลักษณะขอบด้านหลังและความยาวก้านครีบอกไข่ม้วนของครีบอก ลักษณะของซี่จักบริเวณขอบด้านหลังก้านครีบอกไข่ม้วนของครีบอก จุดสิ้นสุดของปลายครีบอกไข่ม้วนของครีบอกไข่ม้วนในแนวระนาบ ความยาวครีบอกไข่ม้วน ซี่กรงเหงือก กระดูก humero-cubital process และลักษณะของร่องกึ่งกลางหัว

ข้อเสนอแนะ

1. สำหรับตัวอย่างปลาที่เมื่อนำมาศึกษาข้อมูลการวัดนับ และข้อมูลทางกายวิภาค มีลักษณะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยควรนำไปตรวจสอบโดยใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์เพื่อนำข้อมูลมาใช้ยืนยันในการจำแนกชนิดให้ถูกต้อง

2. การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ศึกษาข้อมูลด้านชีววิทยาของปลาในวงศ์อย่างละเอียด ดังนั้นควรมีการศึกษาข้อมูลด้านนี้ให้ครบวงจรเพื่อนำข้อมูลที่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงต่อไปในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

- ครรชิต เบญจมปริญญากุล และ สุรศักดิ์ กุลกลาย. 2538. ชลชีววิทยาบางประการและทรัพยากรประมงในแม่น้ำสายบุรี. เอกสารวิชาการฉบับที่ 48. ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี กองประมงน้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 72 น.
- จินตนา ดำรงไทรภพ และ สมศักดิ์ เจนศิริศักดิ์. 2539. การสำรวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรปี 2536. เอกสารวิชาการฉบับที่ 17. ศูนย์พัฒนาน้ำจืด จังหวัดอุบลราชธานี กองประมงน้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 67 น.
- ชวลิต วิทยานนท์, จรัสธาดา กรรณสูต และ จารุจินต์ นภิตะภัก. 2540. ความหลากหลายของปลา น้ำจืดในประเทศไทย. สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ. 102 น.
- นิพนธ์ ประพฤติธรรม. 2534. เทคนิคและวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างทางสัตววิทยา. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเก็บตัวอย่างสัตว์. ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 396 น.
- นิพนธ์ ศิริพันธ์, บุญช่วย แววงาม, สันทนา สังขกุล, ณรงค์ สุโกมล, สันชัย สุจริตวงศานนท์, รังสรรค์ ทรวงชมพูพันธุ์, สมภพ เจริญพงษ์ และ ไพโรจน์ วิวัฒน์การ. 2521. การสำรวจชีวประมงและการทำการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูน จ. สกลนคร. เอกสารวิชาการฉบับที่ 2. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 42 น.
- ถวัลย์ ขูขจร, บุญรัตน์ จันทร์สว่าง และ สำรวย เสริมกิจ. 2527. การสำรวจประชากรปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จ. กาญจนบุรี. เอกสารวิชาการฉบับที่ 35. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 19 น.

ถวัลย์ ชูขจร, ณรงค์ สุโกมล, เรวัติ ศรีประเสริฐ และ กำชัย ลาวัณยวุฒิ. 2525. การทำการประมงในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง. เอกสารวิชาการฉบับที่ 10. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 13 น.

ถวัลย์ ชูขจร, นิพนธ์ ศิริพันธุ์, เรวัติ ศรีประเสริฐ และ สันห์ชัย สุจริตวงสานนท์. 2523. สภาพทาง การประมงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง. เอกสารวิชาการฉบับที่ 10. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 10 น.

ถวัลย์ ชูขจร, บุญรัตน์ จันทร์สว่าง, สุริยา ทานสุทัศน์ และ เพียงใจ แก้วจรรยา. 2534. การสำรวจทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำบางพระ จ. ชลบุรี. เอกสารวิชาการฉบับที่ 120. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 22 น.

ถวัลย์ ชูขจร, สันทนา ดวงสวัสดิ์, จารุวรรณ สมศิริ และ อรุณช องค์กรธรรม. 2537. การสำรวจสภาพสภาพสิ่งแวดล้อมและการประมงในแม่น้ำหनुมาน. เอกสารวิชาการฉบับที่ 1. กองสิ่งแวดล้อมประมง กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 37 น.

ถวัลย์ ชูขจร, สันทนา ดวงสวัสดิ์, บุญรัตน์ จันทร์สว่าง และ พนม สอดสุข. 2531. การสำรวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร. เอกสารวิชาการฉบับที่ 97. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 48 น.

ถวัลย์ ชูขจร, สันทนา ดวงสวัสดิ์, บุญรัตน์ จันทร์สว่าง, ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และ พนม สอดสุข. 2531. การสำรวจสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา จ. สุราษฎร์ธานี. เอกสารวิชาการฉบับที่ 96. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 44 น.

ถวัลย์ ชูขจร, บุญรัตน์ จันทร์สว่าง, รัชฎาภรณ์ กิตติวรเชษฐ์, จารุวรรณ สมศิริ, ทรงพรรณ ลำเลิศเดชา และ สมเดช ศรีโกมุท. 2525. การสำรวจสภาพนิเวศวิทยาและการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง จ. ยะลา. เอกสารวิชาการฉบับที่ 56. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 47 น.

ถวัลย์ ขุขจร, สันทนา ดวงสวัสดิ์, บุญรัตน์ จันทร์สว่าง, จรัสธาดา กรรณสูต, จารุวรรณ สมศิริ, ทรงพรรณ ลำเลิศเดชา และ สุปราณี ชินบุตร. 2528. การสำรวจสภาพแวดล้อมและการประมงในแม่น้ำแควน้อยบริเวณที่จะเป็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม. เอกสารวิชาการฉบับที่ 48. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 42 น.

ถวัลย์ ขุขจร, บุญรัตน์ จันทร์สว่าง, สุปราณี ชินบุตร, จารุวรรณ สมศิริ, จรัสธาดา กรรณสูต, ทรงพรรณ สุนทรสถิต, โยธิน ลีลานนท์ และ ชลอ ลีมสุวรรณ. 2527. การสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมและการประมงในแม่น้ำตาปี. เอกสารวิชาการฉบับที่ 27. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 19 น.

ถวัลย์ ขุขจร, สันทนา ดวงสวัสดิ์, โยธิน ลีลานนท์, บุญรัตน์ จันทร์สว่าง, รัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏ, ทศน์ ภูมิพัฒน์, ทรงพรรณ ลำเลิศเดชา และ สุปราณี ชินบุตร. 2530. การสำรวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำปรางบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์. เอกสารวิชาการฉบับที่ 71. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 48 น.

ทัศนีย์ ภูมิพัฒน์, รัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏ, ชัยชนะ ชมเชย, รังสิต แยมเอิบสิน, วิสูตร ศศิวิมล, อนุสิน อินทร์คา และ รังสรรค์ ไชยบุญทัน. 2532. การสำรวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ. เชียงใหม่. เอกสารวิชาการฉบับที่ 107. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 35 น.

ธีรพันธ์ ภูคาสวรรค์. 2511. ปลาบางชนิดในแม่น้ำโขง. เอกสารวิชาการฉบับที่ 2. กองบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 70 น.

ธีรพันธ์ ภูคาสวรรค์, ถัมภ์ชัย สุจิตดวงสานนท์, จารุวรรณ สมศิริ, สมภพ เจริญพงษ์ และ นิพนธ์ ศิริพันธ์. 2523. ประชากรปลาและการประมงในบึงจำรัส จังหวัดชัยนาท. งานประชากรปลา สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 11 น.

บุญรัตน์ จันทร์สว่าง, ฎีกา รัตนชำนาญ, เพียงใจ แก้วจรรณู และ พิสิฐ ภูมิคง. 2538. การศึกษาชนิดและการเปลี่ยนแปลงประชากรปลาในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนรัชชประภา จ. สุราษฎร์ธานี. เอกสารวิชาการฉบับที่ 163. สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 65 น.

บุญรัตน์ จันทร์สว่าง, ถวัลย์ ชูขจร, ทศนีย์ ภูมิพัฒน์, พนม สอดสุข, สุริยา ทานสุทัศน์ และ เพียงใจ แก้วจรรณู. 2536. การสำรวจทรัพยากรกรมประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว จ. สุพรรณบุรี. เอกสารวิชาการฉบับที่ 140. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 36 น.

บุญรัตน์ จันทร์สว่าง, ถวัลย์ ชูขจร, สันทนา ดวงสวัสดิ์ และ พนม สอดสุข. 2532. การสำรวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน. เอกสารวิชาการฉบับที่ 108. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 30 น.

บุญรัตน์ จันทร์สว่าง, ทศนีย์ ภูมิพัฒน์, พนม สอดสุข, สุริยา ทานสุทัศน์ และ เพียงใจ แก้วจรรณู. 2534. การสำรวจประชากรปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ จ. ชัยภูมิ. เอกสารวิชาการฉบับที่ 122. สถาบันประมงน้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 34 น.

บุญรัตน์ จันทร์สว่าง, ทศนีย์ ภูมิพัฒน์, สุริยา ทานสุทัศน์, รังสรรค์ ไชยบุญทัน และ เพียงใจ แก้วจรรณู. 2537. การสำรวจประชากรปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนก๊วลม จ. ลำปาง. เอกสารวิชาการฉบับที่ 153. สถาบันประมงน้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 34 น.

บุญรัตน์ จันทร์สว่าง, วิสูตร ศศิวิมล, รังสิต แยมเอิบสิน, สุริยา ทานสุทัศน์, สุปรานี ชินบุตร, สุพรรณิ สัมมาวรรณ และ รังสรรค์ ไชยบุญทัน. 2529. การสำรวจสภาพนิเวศและการประมงในบริเวณพื้นที่โครงการเขื่อนน้ำโจน. เอกสารวิชาการฉบับที่ 60. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 23 น.

ประไพศิริ สิริกาญจน์. 2511. ลักษณะและหน้าที่ของกระเพาะลมในปลาพวกแคชฟิช. วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 126 น.

ไพโรจน์ สิริมนตาภรณ์, ไกษย์ แซ่อู, สิริ ทุกษ์วินาศ และ เพิ่มศักดิ์ เพิ่มมาก. 2528. การสำรวจผลเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำและคุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลา. เอกสารวิชาการฉบับที่ 34. สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 10 น.

ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และ สันทนา ดวงสวัสดิ์. 2535. ทรัพยากรประมงและสภาวะการประมงในแม่น้ำมูล. เอกสารวิชาการฉบับที่ 136. สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 53 น.

โยธิน ลีตานนท์ และ รังสิต แยมเอิบสิน. 2524. ชีววิทยาของปลากดเหลืองในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 32 น.

โยธิน ลีตานนท์, โชติ วนโกสม, ชัยชนะ ชมเชย และ สุริยา ทานสุทัศน์. 2528. การสำรวจสถิติปลาและสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จ. กาญจนบุรี. เอกสารวิชาการฉบับที่ 47. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 17 น.

โยธิน ลีตานนท์, รัชฎาภรณ์ กิตติวรเชษฐ์ และ บุญส่ง ศรีเจริญธรรม. 2536. สภาวะการประมงและผลจับสัตว์น้ำในแม่น้ำน่าน เขตจังหวัดนครสวรรค์. เอกสารวิชาการฉบับที่ 142. สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 25 น.

โยธิน ลีตานนท์, รัชฎาภรณ์ กิตติวรเชษฐ์, รังสิต แยมเอิบสิน, สุริยา ทานสุทัศน์ และ เพ็ญใจ แก้วจรรยา. 2531. การสำรวจสภาวะการประมงและผลผลิตของสัตว์น้ำในบริเวณแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 59 น.

รักสัง สุขเกษม, บุษราคัม ส่องสุข และ มุจรินทร์ โอภาโส. 2536. การสำรวจสถิติปลาที่ทำปลาและสถานะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง จ. ยะลา ปี 2533. เอกสารวิชาการฉบับที่ 45. กองประมงน้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 22 น.

ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ สันต์. 2539. ชีวประวัติบางประการของปลากดเหลือง *Mystus nemurus* (Valenciennes, 1839). วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 80 น.

สมโภชน์ อัคระทวีวัฒน์ และ ชวลิต วิทยานนท์. 2541. พรรณปลาในระบบแม่น้ำสาละวินของประเทศไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 2. สถาบันพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาสัตว์น้ำ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 89 น.

สมปอง หิรัญวัฒน์, ณรงค์ สุโกมล และ กำชัย ลาวัลย์วุฒิ. 2525. การสำรวจสภาพทางการประมงเพื่อปรับปรุงผลผลิตปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน จ. เพชรบุรี. เอกสารวิชาการฉบับที่ 9 สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 19 น.

สุภาพ มงคลประสิทธิ์. 2532. มินวิทยา (บทปฏิบัติการ). คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 119 น.

สุรศักดิ์ กุลลาบ, แวอสุมาน แวดาแก และ ดวงแข อังสุภานิช. 2538. ชลชีววิทยาบางประการและทรัพยากรประมงในแม่น้ำปัตตานี. เอกสารวิชาการฉบับที่ 4. ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี กองประมงน้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 38 น.

สุรศักดิ์ กุลลาบ, สุขาวดี กสิสุวรรณ, รักสัง สุขเกษม, แวอสุมาน แวดาแก และ ดวงแข อังสุภานิช. 2538. การสำรวจชีวประมงในคลองป่าบอน จ. พัทลุง ก่อนสร้างอ่างเก็บน้ำ. เอกสารวิชาการฉบับที่ 8. ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี กองประมงน้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 32 น.

สุรินทร์ ฤทธิ์จรัส. 2537. การสำรวจประชากรปลาในบึงบอระเพ็ด. กองประมงน้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 58 น.

สุรินทร์ ฤทธิ์จรัส และ กาญจนบุรี พงษ์ฉวี. 2538. การสำรวจผลชีววิทยาบางประการและทรัพยากรประมงในบึงบอระเพ็ดหลังการบูรณะปรับปรุง. ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด นครสวรรค์ กองประมงน้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 89 น.

สันทนา ดวงสวัสดิ์, พนม สอดสุข, ชัยชนะ ชมเชย, บุญเลิศ เกิดโกมุติ และ โสภณ นิยะโต. 2532. การศึกษาชนิดการแพร่กระจายและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาในแม่น้ำท่าจีน. เอกสารวิชาการฉบับที่ 110. สถาบันประมงน้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 25 น.

สันทนา ดวงสวัสดิ์, โยธิน ลีตานนท์, ชัยชนะ ชมเชย และ บุญเลิศ เกิดโกมุติ. 2526. สภาพการประมง ชนิด และการแพร่กระจายของสัตว์น้ำในแม่น้ำบางปะกง. เอกสารวิชาการฉบับที่ 30. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 31 น.

สันทนา ดวงสวัสดิ์, ถวัลย์ชูขจร, จรัสธาดา กรรณสูต, บุญรัตน์ จันทร์สว่าง, โยธิน ลีตานนท์ และ บุญส่ง ศรีเจริญธรรม. 2536. การสำรวจชนิดและปริมาณปลาในบริเวณที่จะก่อสร้างเขื่อนปากมูล. สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 52 น.

สันทนา ดวงสวัสดิ์, ชัยชนะ ชมเชย, บุญเลิศ เกิดโกมุติ และ โสภณ นิยะโต. 2532. การศึกษาชนิดการแพร่กระจายและฤดูวางไข่ของปลาในแม่น้ำแม่กลอง. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 29 น.

สันทนา ดวงสวัสดิ์ และ ถวัลย์ชูขจร. 2534. สภาพการประมง ชนิด และการแพร่กระจายของปลาในแม่น้ำมูล. สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 12 น.

สันทนา ดวงสวัสดิ์ และ ทศพล กระจำนงคารา. 2537. ความหลากหลายของชนิดและชีววิทยาของปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา จ. สุราษฎร์ธานี. เอกสารวิชาการฉบับที่ 162. สถาบันประมงน้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 100 น.

สันทชัย สุจิตตวงสานนท์, นิพนธ์ ศิริพันธ์, จารุวรรณ สมศิริ, สุนันท์ สิริมาयाกุล และ ปรีชา ยามา. 2519. รายงานการสำรวจประชากรปลาในลำน้ำปิงตอนบน. รายงานฉบับที่ 4. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 27 น.

สุวีณา บานเย็น, บุญส่ง ศรีเจริญธรรม, บุญเลิศ เกิดโกมุดิ, สุริยา ทานสุทัศน์, รังสรรค์ ไชยบุญทัน, เพียงใจ แก้วจัญญและ ฐาปกรณ์ แซ่ลิ้ม. 2536. การสำรวจประชากรปลาในลำน้ำพอง ชี มูล ในระหว่างวันที่ 27 เม.ย.-4 พ.ค. 2535. กลุ่มทรัพยากรประมง สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 38 น.

อารีย์ สิทธิมั่งค์, อุปถัมภ์ ภวภูตานนท์ และ ชีรพันธ์ ภูคาสุวรรณค์. 2511. การสำรวจชีวประมงในอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ ระหว่างปี พ.ศ. 2508-2509. เอกสารวิชาการฉบับที่ 6. กองบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 40 น.

อุปถัมภ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม และ อรุณ หนูเกื้อ. 2528. การสำรวจปลาไว้อ่อนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์. รายงานฉบับที่ 3. งานพัฒนาประมงแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (เขื่อนอุบลรัตน์) กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 40 น.

อำนวย แท่นทอง และ วสันต์ ศรีวัฒนะ. 2525. การเพาะพันธุ์ปลากดเหลืองโดยวิธีผสมเทียม. สถานีประมง จ. ชัยนาท กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 9 น.

Bailey, R.M. and D.J. Stewart. 1984. Bagrid Catfishes from Lake Tanganyika, with a Key and Description of New Taxa. Misc. Publ. Mu. Zool., Michigan. 41 p.

Baly, J.S. 1863. An attempt at a classification of the Eumolpidae. The Journal of Entomology. 2(9): 143-163

Berg, L.S. 1947. Classification of Fishes, Both Recent and Fossil. J.W. Edwards Co., Michigan.
345 p.

Berra, T.M. 1981. An atlas of Distribution of the Freshwater Fish Families of the World.
University of Nebraska Press, Lincoln and London. 197 p.

Bleeker, P. 1845. Bijdragen tot de geneeskundige Topographie van Batavia. Generisch overzicht
der Fauna. Visschen. Nat. Geneesk. Arch. Ned. Ind. (2): 505-528.

———. 1846a. Siluroideorum bataviensium species nuperrime detectae. Nat. Geneesk. Arch.
Ned. Ind. 3(2): 284-293.

———. 1846b. Overzicht der Siluroiden welke te Batavia voorkomen. Nat. Geneesk. Arch.
Ned. Ind. 3(2): 135-184.

———. 1851. Over drie nieuwe soorten van *Tetrodon* van den Indischen Archipel. Nat.
Tijds. Ned. Ind. (1): 96-97.

———. 1852. Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Blitong (Billiton),
met beschrijving van eenige nieuwe soorten van zoetwatervisschen. Nat. Tijds.
Ned. Ind. (3): 87-100.

———. 1853. Nieuwe tientallen diagnostische beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende
veschsoorten van Sumatra. Nat. Tijds. Ind. (5): 495-534.

———. 1854. Overzicht der ichthyologische fauna van sumatra met beschrijving van eenige
nieuwe soorten. Nat. Tijds. Ned. Ind. (7): 49-108.

———. 1858. Ichthyologiae Archipelagi Indic Prodomus, I. Siluri. Lange & Co., Batavia.
189 p.

Bleeker, P. 1862. Atlas Ichthyologique des Indes Orientales Neerlandaises. Tome II. Siluroides. Chacoids et Heterobanchoides, Amsterdam. 112 p.

———. 1863. Description de Trois Espèces Nouvelles de Siluroides de Le Inde archipelagique. Versl. Meded. Akad. Wet. Amsterdam. 102 p.

———. 1864. Notice sur la faune ichthyologique siam. Versl. Akad. Amst. (16): 352-358.

Blyth, E. 1860. Report on some fishes recived chiefly from the sitang river and its tribulary streams. J. Asiat. Soc. Calcutta. (29): 138-174.

Böhlke, E. 1984. Catalog of type specimens in the ichthyological collection of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Acad. Nat. Sci. Philadephia Spec. Publ. (14): 1-246.

Bornbusch, A.H. 1995. Phylogenetic relationships within the eurasian catfish family siluridae (Pisces: Siluriformes) with comment on genetic validities and biogeography. Zool. J. Linn. Soc. (115) : 1-46.

Boulenger, G.A. 1904. Description of new West African freshwater fishes. Ann. Mag. Nat. Hist. 7(14):16-20

———. 1909. Catalogue of the Freshwater Fishes of African in the Brishtish Museum. Brit. Mu. (Nat. Hist.), London. 529 p.

Burgess, W.E. 1989. An Atlas of Freshwater and Marine Catfishes. T.F.H. Publ., U.S.A. 784 p.

Burgess, W.E. and L. Finley. 1996. An Atlas of Freshwater and Marine Catfish: UPDATE, pp. 163-174. In R. Hunziker (ed.). Tropical Fish Hobbyist. 2(488).

Chaudhuri, B.L. 1913. Zoological results of the Abor Expedition, 1911-12. Fish. Rec. Ind. Mus. (8): 243-257.

Chaux, J. and P.W. Fang. 1949. Catalogue des Siluroidei d'Indochine dans la collection du laboratoire des peches coloniales au museum, avec a description de six especes nouvelles. Bull. Mus. Natn. Hist. Nat. Paris. 2 (21): 194-201.

Cuvier, G. and A. Valenciennes. 1839. Histoire Naturelle des Poissons. Tome 13. Pitois Levrault, Paris. 505 p.

Cuvier, G. and A. Valenciennes. 1840. Histoire Naturelle des Poissons. Tome 14. Pitois Levrault, Paris. 464 p.

Day, F. 1873. Report on the Fresh Water Fish and Fisheries of India and Burma. Office of the Superintendent of Government Printing, Calcutta. 118 p.

———. 1877. The Fishes of India: Being a Natural History Waters of India, Burma, and Ceylon, Part. 3. London. 552 p.

———. 1888. Supplement to the fishes of India. William Dawson. London. 816 p.

———. 1889. Fishes in the fauna British India, including Ceylon and Burma. Taylor and Francis. London. 509 p.

de Beaufort, L.F. 1933. On some new or rare species of Ostariophysi from the Malay Peninsula and a new Betta from Borneo. Bull. Raffles Mus. (8): 31-36.

Dumeril, A.M.C. 1856. Ichthyologie and Analytique ou Essai d'une Classification Naturelle des Poissons, a l'aide de Tableaux Synoptique. Didot Freres, Fils, etc., Paris. 507 p.

- Eschmeyer, W.N. 1998. Catalog of Fish. California Academy of Sciences. San Francisco. 2905 p.
- Ferraris, C., Jr. 1997. Identification guide to the commercial inland fishes of Myanmar. Food and Agriculture Organization of the United Nation, Rome. 59 p.
- Ferraris, C., Jr. and K. E. Runge. 1999. Revision of the South Asian bagrid catfish genus *Sperata*, with the description of a new species from Myanmar. California Academy of Sciences, San Francisco. (51) : 397-424.
- Fowler, H.W. 1905. Some fishes from Borneo. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia. (57): 455-523.
- Fowler, H.W. 1934a. Zoological result of the third de Schauensee Siamese expedition, part I: fish. Proc. Acad. Nat. Sci., Philadelphia. (86) : 67-163.
- Fowler, H.W. 1934b. Zoological result of the third de Schauensee Siamese expedition, part V: fish. Proc. Acad. Nat. Sci., Philadelphia. (86) : 335-352.
- . 1935. Zoological result of the third de Schauensee Siamese expedition, part VI: fish obtain in 1934. Proc. Acad. Nat. Sci., Philadelphia. (87) : 89-163.
- . 1937. Zoological result of the third de Schauensee Siamese expedition, part VII: fish obtain in 1963. Proc. Acad. Nat. Sci., Philadelphia. (89) : 125-264.
- . 1939. Zoological results of the third de Schauensee Siamese Expedition. Part 8. Fishes obtained in 1936. Proc. Acad. Nat. Sci, Philadelphia. (91) : 39-76.
- Ganguli, D.N. and N.C. Dalta. 1975. A new catfish of the genus *Mystus* Scopoli (family: Bagridae) from the vicinity of the Hundru Falls, Bihar, India, with comment on the genus *Mystus*. Dr. B.S. Chauhan Comn., India. 298 p.

- Günther, A. 1863. Freshwater Fishes of the World. Longacre Press, London. 878 p.
- Günther, A. 1864. Catalogue of the fishes of the British Museum. Brit. Mu. (Nat. Hist.), London. 455 p.
- Hamilton, F. 1822. An account of the fishes found in the river Ganges and its branches. Edinburgh and London. 405 p.
- Herre, A.W. 1940a. New species of fishes from the Malay Peninsula and Borneo. Bull. Raffles Mus. (16): 5-26.
- Holly, M. 1939. Zur Nomenklatur der Siluridengattung *Macrones* C. Dumeril. Zoologischer Anzeiger. 125(510): 143.
- Hora, S.L. 1921. Notes on fishes in Indian museum. I. On a new genus of fish closely Resembling *Psilorhynchus*, McClelland. Rec. Ind. Mus. 22(9): 13-17.
- Hora, S.L. and J.C. Gupta. 1941. Notes on Malayan fishes in the collection of the Raffles Museum, Singapore. I. Catfishes of the families Siluridae, Bagridae, Amblycepidae, Akysidae, Sisoridae, Chacidae, Schilbeidae and Clariidae. Bull. Raffles Mus. (17): 12-43.
- Hora, S.L. and N.C. Law. 1941. Silurid fishes of India Burma and Ceylon. Rec. Indian Mu., India. (18) : 9-42.
- Jayaram, K.C. 1954. Silurid Fishes of India Burma and Ceylon. Rec. In. Mu. 51(4) : 527-558
- . 1966a. Contribution to the study of the fishes of the family Bagridae
2. systematic account of the African genera with a new classification of the family.
Bull. I.F.A.N. (3) : 1064-1139

- Jayaram, K.C. 1966b. Contributions to the study of the bagrid fishes. 1. A systematic account of the genera *Rita* Bleeker, *Rama* Bleeker, *Mystus* Scopoli and *Horabagrus* Jayaram. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie. 51(3): 433-450.
- . 1968. Contributions to the study of bagrid fishes (Siluridae: Bagridae). 3. Systematic account of the Japanese, Chinese, Malayan and Indonesian genera. Treubia 27(2-3): 287-386.
- . 1973. Contribution to the study of the barged catfishes. 10. Sytematic position of *Pimelodus chandramara* Hamilton with description of new genus. Internationale Revue Gesamten Hydrobiologie. 57(5): 815-820.
- . 1976. Interrelationships of Indo-African catfishes of the family Bagridae. Revue des Travaux de l'Institut des Peches Maritimes, Paris. 40(3-4): 619-620.
- . 1981. The Freshwater Fishes of India Pakistan Banglades Burma and Sri lanka. Zool. Surv. India, Calcutta. 475 p.
- Jayaram, K.C. and R. Singh. 1982. Contributions to the study of bagrid fishes. 15. A comparative account of the cranial musculature in four bagrid genera with a note on their phylogeny. Records of Zoological Survey, India. 80(1-2): 231-250.
- Jordan, D.S. 1919. New genera of fishes. Proceeding of the Academy of Natural Sciences of Philadephia. (70): 341-344.
- Jordan, D.S., S. Tanaka and J.O. Snyder. 1974. A Catalogue of the Fish of Japan. Linnaeus Press. Tokyo. 497 p.
- Kottelat, M. 1984. A review of the species of Indochinese freshwater fishes described by H.E. Sauvage. Bull. Mus. Natn. Hist. Nat. Paris. (6): 791-822.

- Kottelat, M. 1998. Fishes of the Nam Theun and Xe Bangfai basins, Laos, with diagnose of Twenty -two new species. *Ichthyol. Explor. Fresh.* 9(1): 1-128.
- Kwaw, W. 1971. A taxonomy of Taung-tha-man 'inn upper Burma. *Union of Burma Journal of Life Sciences.* (4): 39-63.
- Menon, A.G.K. 1974. A Check-list of the Fishes of the Himalayan and Indo-Gangetic plain. Inland Fisheries Society of India. Calcutta. 102 p.
- Misra, K.S. 1976. The Fauna of India and the Adjacent Contries. Government of India Press. Delhi. 387 p.
- Mo, T. 1991. Anatomy relationship and systematic of the Bagridae (Teleostei: Siluridei) with a hypothesis of siluroid phylogeny. Koenigstein, Germany. 216 p.
- Ng, P.K.L and H.H. Ng. 1995. *Hemibagrus gracilis*, A new species of large riverine catfish (teleostei: Bagridae) from Peninsular Malaysia. *Raff. Bull. Zool.* 43(1) : 133-142.
- Nelson, J.S. 1994. Fishes of the World. 3ed. John Wiley and Son, U.S.A. 600 p.
- Nichol, J.T. and C.H. Pope. 1927. The Fishes of Hainan. *Bull. Amer. Mu. Nat. Hist.*, New York. 394 p.
- Peter, W. 1869. Uber eine neue Nagergattung, *Chiropodomys penicillatus*, so wie uber einige neue oder weniger bekannte Amphibien und Fische. *Monatsber. Akad. Wiss.* Berlin. 460 p.
- Prashad, B. and D.D. Mukerji. 1929. The fish of the Indawgyi Lake and the streams of the Myitkyina District (Upper Burma). *Records of the India Museum.* 31(30): 161-223.

- Rainboth, W.J. 1991. Cyprinids of South East Asia, pp. 154-210. In I.J. Winfield and J.S. Nelson (eds.). *Cyprinids Fishes : Systematic biology and exploitation*. Chapman and Hall, London.
- . 1996. *Fish of Cambodian Mekong*. Food and Agriculture Organization of the United Nation, Rome. 265 p.
- Regan, C.T. 1906. Descriptions of five new freshwater fishes from Sarawak, Borneo, collected by Dr. C. Hose. *Ann. Mag. Nat. Hist.* 18(7): 66-68.
- . 1911. The classification of teleostean fishes of order Ostariophysi. II. Siluridea. *Annals and Magazine of Natural History.* 8(53): 553-577.
- . 1913. A synopsis of the silurid fishes of the genus *Leiocassis*, with descriptions of new species. *Ann. Mag. Nat. Hist.* 11(8): 547-554.
- Roberts, T.R. 1989. The freshwater fishes of western Borneo (Kalimantan Barat, Indonesia). *Mem. Calif. Acad. Sci.* (14): 1-210.
- . 1992. Revision of the striped catfish of Thailand misidentified as *Mystus vittatus*, with description of two new species (Pisces:Bagridae). *Ichthyol. Expolr. Freshwater.* (1):77-88.
- . 1993. The freshwater fishes of Java, as observed by Kuhl and van Hasselt in 1820-23. *Zool. Verh.* 285: 1-94.
- . 1994. Systematic revision of Asian Bagrid catfishes of the genus *Mystus* sensu stricto with a new species (Pisces:Bagridae). *Ichthyol. Expolr. Freshwater.* 5(3): 241-256.

- Rojo, A.L. 1991. Dictionary of Evolutionary : Fish Osteology. CRC Press, London. 273 p.
- Sauvage, H.E. 1881. Recherches sur la faune ichthyologique de l' Asie et description d'espèces nouvelles de l' Indo-Chine. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., Paris. (4): 123-194.
- Scopoli, G.A. 1777. Introduction ad Historiam Naturalem etc. Pragae. 506 p.
- Sexena, D.B., S.K, Moitra and S. Kumer. 1963. Osteology of some catfishes of India, part I- Osteocranium and vertebral column of *Mystus (Osteobagrus) seenghala*, pp. 61-75. In S.M.Das (ed.). Ichthyologica. D.A.V. Collage, India.
- Smith, H.M. 1929. Note on Siamese fishes. J. Siam Soc., Nat. Hist. Suppl. (8):11-14.
- . 1934. Status of the catfishes *Mystus tengara* and *Mystus vittatus* in the siamese fauna. J. Siam Soc., Nat. Hist. Suppl. (9): 294-295.
- . 1945. The Fresh-Water Fishes of Siam or Thailand. State Government Office, Washington. 622 p.
- Sontirat, S., Y. Musig, W. Chuapoehek and J. Boonsom. 1995. Study of Fish Species Diversity and Migration in Affected by the Kaengsua Ten. Faculty of Fisheries, Kasetsart University and Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperative. Bangkok. 74 p.
- Suvatti, C. 1950. Fauna of Thailand. Department of Fisheries, Kasetsert University, Bangkok. 379 p.
- Sykes, W.H. 1839. On the fishes of the Decan. Proc. Zool. Soc. London. (6): 157-165.
- . 1841. The fishes of Dukhun. Trans. Zool. Soc. London (2): 349-378.

- Taki, Y. 1974. Fishes of the Laos Mekong basin. USAID Mission to Laos. Agric. Div. 232 p.
- Talwar, P.K. and A.G. Jhingran. 1991. Inland Fishes of India and Adjacent Countries. Oxford and IBH Publ. Co., New Delhi. 1,158 p.
- Tilak, R. 1963. The Osteocranium and the Weberian Apparatus of the Fishes of Family Bagridae. Department of Zoology. Birla Collage, India. 320 p.
- . 1965. The osteocranium and Weberian apparatus of the fishes of the family Bagridae. Gegenbaurs Morphologisches Jahrbuch, Leipzig. 107(4): 415-443.
- Tweedie, M.W.F. 1936. A list of fishes in the collection of the raffie museum. Bull. Raff. Mu. 9(12):16-28.
- Vasisht, H.S. and I.B.S. Uberoi. 1965. Anatomy of *Mystus seenghala* (Sykes). V. endoskeleton. Research Bulletin of the Panjab University, Hoshiarpur, New Series Science. 16(1-2): 87-127.
- Vidhayanon, C. 1993. Taxonomic Revision of the Catfish Family Pangasiidae. Thesis in Fisheries Science, Tokyo University, Tokyo. 203 p.
- Vinciguerra, D. 1890. Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e regioni vicine. Pesci. Annali del Mus. Civico de Storia Nationle de Genova. (9): 129-362.
- Volz, W. 1907. Catalogue of Fishes of Sumatra. Nat. Tijds. Ned. Ind. (66): 35-250.
- Weber, M. and L.F. de Beaufort. 1913. The Fishes of the Indo-Australian Archipelago. Vol. II. E.J. Brill, Leiden. 404 p.

- White, E.I. and J.A. Moythomas. 1940. Notes on the nomenclature of fossil fishes. Part I:
Homonyms A-C. *Annals and Magazine of Natural History* (ser.11). 7 (30): 502-507.
- Wu, H.W. 1939. On the fishes of Li-Kiang. *Sinensia*. 10(1-6): 92-142.

ภาคผนวก

ตารางผนวกที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลการนับของปลาวังที่ Bagridae ที่พบในประเทศไทย


รายชื่อชนิด	จำนวนเครื่องเรือ	จำนวนข้อกระดูกสันหลัง	จำนวนแท่งกระดูกปิดคอคอ	จำนวนกันคียบอก	จำนวนกันคียบั้น	จำนวนกันคียบัง
1. <i>Bagrichthys macracanthus</i>	10-12 (n=10)	44-45 (n=5)	7-8 (n=10)	1/7-9 (n=33)	3-4/7-10 (n=32)	1/7 (n=32)
2. <i>Bagrichthys macropterus</i>	7-10 (n=38)	43-44 (n=5)	7 (n=38)	1/8-9 (n=47)	3-4/9-11 (n=47)	1/7 (n=47)
3. <i>Batasio blythi</i>	5-8 (n=54)	37 (n=6)	5-6 (n=48)	1/7-9 (n=57)	3-4/7-10 (n=57)	1/7 (n=57)
4. <i>Hemibagrus flamentus</i>	12-16 (n=88)	45 (n=11)	11-13 (n=88)	1/8-9 (n=88)	3-4/7-9 (n=87)	1/7 (n=87)
5. <i>Hemibagrus microphthalmus</i>	9-4 (n=49)	52-53 (n=11)	10-12 (n=49)	1/8-9 (n=49)	3-4/8-11 (n=49)	1/7 (n=49)
6. <i>Hemibagrus nemurus</i>	12-17 (n=196)	43-44 (n=14)	10-13 (n=196)	1/8-9 (n=196)	3-4/7-10 (n=194)	1/7 (n=194)
7. <i>Hemibagrus wycki</i>	12-15 (n=24)	49-50 (n=2)	10-11 (n=24)	1/9-11 (n=28)	3-5/8-9 (n=28)	1/7 (n=28)
8. <i>Hemibagrus mekongensis</i> n.sp.	12-15 (n=55)	42-44 (n=5)	11-14 (n=55)	1/8-9 (n=55)	3-4/7-9 (n=55)	1/7 (n=55)
9. <i>Hemibagrus elegans</i> n.sp.	17-24 (n=14)	48-49 (n=6)	12 (n=14)	1/8-10 (n=3)	3-4/7-9 (n=14)	1/7 (n=14)
10. <i>Leiocassis micropogon</i>	15-16 (n=3)	39 (n=2)	10 (n=1)	1/8 (n=3)	3-4/11-13 (n=3)	1/7 (n=3)
11. <i>Leiocassis puccinopterus</i>	8-9 (n=6)	36 (n=2)	7-8 (n=6)	1/6-7 (10)	3-4/10-11 (n=10)	1/7 (n=10)
12. <i>Leiocassis slumensis</i>	11-16 (n=39)	37-39 (n=9)	7-9 (n=39)	1/7-8 (n=68)	3-5/10-12 (n=68)	1/7 (n=68)
13. <i>Leiocassis stenotomus</i>	10-12 (n=9)	39-40 (n=6)	8-10 (n=9)	1/6-7 (n=48)	3-5/10-12 (n=48)	1/7 (n=48)
14. <i>Mystus atrifasciatus</i>	24-30 (n=43)	38-39 (n=12)	8-10 (n=43)	1/7-9 (n=47)	2-3/8-11 (n=47)	1/7 (n=47)
15. <i>Mystus bocourti</i>	14-17 (n=45)	41-42 (n=9)	7-9 (n=45)	1/9-11 (n=51)	3-4/7-8 (n=51)	1/7 (n=51)
16. <i>Mystus cavasius</i>	21-23 (n=5)	43 (n=1)	9-11 (n=4)	1/9-10 (n=)	3/7-8 (n=7)	1/7 (n=7)
17. <i>Mystus gulo</i>	32-38 (n=45)	35-36 (n=5)	8-10 (n=45)	1/7-8 (n=62)	3-5/8-10 (n=62)	1/7 (n=62)
18. <i>Mystus micracanthus</i>	23-32 (n=40)	38-39 (n=4)	8-10 (n=40)	1/8-9 (n=47)	2-3/8-9 (n=47)	1/7 (n=47)
19. <i>Mystus multiradiatus</i>	51-61 (n=35)	34-36 (n=4)	9-11 (n=36)	1/8-9 (n=51)	3-4/6-8 (n=51)	1/7 (n=51)
20. <i>Mystus mysticetus</i>	54-85 (n=46)	36-37 (n=13)	9-11 (n=64)	1/8-9 (n=74)	3-4/8-11 (n=73)	1/7 (n=73)
21. <i>Mystus rhegma</i>	17-21 (n=8)	41 (n=8)	9-10 (n=7)	1/8-9 (n=9)	3/8 (n=5)	1/7 (n=5)
22. <i>Mystus singurungun</i>	17-24 (n=51)	41-42 (n=3)	8-10 (n=51)	1/7-10 (n=62)	2-3/6-8 (n=60)	1/7 (n=60)
23. <i>Mystus wolffi</i>	26-45 (n=63)	38-40 (n=4)	8-10 (n=63)	1/8-9 (n=68)	3-4/8-11 (n=68)	1/7 (n=68)
24. <i>Rita sacerdotum</i>	-	37 (n=1)	-	1/10 (n=1)	5/9 (n=1)	1/6 (n=1)
25. <i>Sperata acicularis</i>	13-14 (n=10)	53-54 (n=2)	12-13 (n=10)	1/8-10 (n=15)	3-4/8-10 (n=15)	1/7 (n=15)

ตารางผนวกที่ 2 ความถี่ของจำนวนข้อกระดูกสันหลังของปลาในวงศ์ Bagridae ที่พบในประเทศไทย

รายชื่อชนิด	จำนวนข้อกระดูกสันหลัง																				N
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
1. <i>Bagrichthys macracanthus</i>											3	2									5
2. <i>Bagrichthys macropterus</i>										1	4										5
3. <i>Batasio blythi</i>			6																		6
4. <i>Hemibagrus filamentus</i>												11									11
5. <i>Hemibagrus microphthalmus</i>																		7	4		11
6. <i>Hemibagrus nemurus</i>										7	7										14
7. <i>Hemibagrus wycki</i>															1	1					2
8. <i>Hemibagrus mekongensis</i> n.sp.									1	3	1										5
9. <i>Hemibagrus elegans</i> n.sp.														2	4						6
10. <i>Leiocassis micropogon</i>						2															2
11. <i>Leiocassis poecilopterus</i>			2																		2
12. <i>Leiocassis siamensis</i>				2	4	3															9
13. <i>Leiocassis stenomus</i>						4	2														6
14. <i>Mystus atrifasciatus</i>					2	10															12
15. <i>Mystus bocourti</i>								3	6												9
16. <i>Mystus cavasius</i>										1											1
17. <i>Mystus gulio</i>		3	2																		5
18. <i>Mystus micracanthus</i>							1	3													4
19. <i>Mystus multiradiatus</i>	1	2	1																		4
20. <i>Mystus mysticetus</i>			8	5																	13
21. <i>Mystus rhegma</i>								8													8
22. <i>Mystus singurugan</i>									1	2											3
23. <i>Mystus wolffi</i>							2	1	1												4
24. <i>Rita sacerdotum</i>																					1
25. <i>Sperna acicularis</i>																			1	1	2


ตารางผนวกที่ 3 ความถี่ของจำนวนซี่กรรงของปลาวัง Bagridae ที่พบในประเทศไทย

ชนิดปลา	จำนวนซี่กรงเฉลี่ย																				N																
	51°	52°	53°	54°	55°	56°	57°	58°	59°	60°	61°	62°	63°	64°	65°	66°	67°	68°	69°	70°		71°	72°	73°	74°	75°	76°	77°	78°	79°	80°	81°	82°	83°	84°	85°	
1. <i>Bagridius macracanthus</i>						2	7	4																													13
2. <i>Bagridius macropterus</i>																																					38
3. <i>Braconio Myxini</i>	5	14	33	2																																54	
4. <i>Hemibagrus filamentus</i>										1	16	28	30	13																					88		
5. <i>Hemibagrus microphthalmus</i>					2	12	25	11	8	1																									59		
6. <i>Hemibagrus nemurus</i>										4	23	56	86	25	22																				216		
7. <i>Hemibagrus boylii</i>										11	10	3	3																						27		
8. <i>Hemibagrus mclougheri</i> n.sp										1	18	28	10																						55		
9. <i>Hemibagrus elegans</i> n.sp.										1	2	3	6	1																					14		
10. <i>Labeoensis micropogon</i>											1	2																								3	
11. <i>Labeoensis poecilopterus</i>					2	4																														6	
12. <i>Labeoensis siamensis</i>									9	14	8	3	3	2																					39		
13. <i>Labeoensis stenopus</i>							1	7	1																											9	
14. <i>Myxus atrofasciatus</i>																																					42
15. <i>Myxus beccarii</i>										9	14	20	2																							45	
16. <i>Myxus cewainus</i>																																					5
17. <i>Myxus galio</i>																																					45
18. <i>Myxus micracanthus</i>																																					40
19. <i>Myxus multiradiatus</i>																																					35
20. <i>Myxus myxterus</i>																																					48
21. <i>Myxus rhegma</i>				1°																																	8
22. <i>Myxus singarigan</i>																																					51
23. <i>Myxus wolffi</i>																																					2
24. <i>Speretta aciculata</i>																																					10




ภาพผนวกที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวมาตรฐาน (standard length) กับเปอร์เซ็นต์ความยาวฐานครีบไขมัน (% adipose fin base length/SL)

ในปลาสกุล *Hemibagrus*




ภาพผนวกที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวมาตรฐาน (standard length) กับเปอร์เซ็นต์ความยาวฐานครีบก้น (% adipose fin base length/ SL) ในปลาสกุล *Mysus* (ยกเว้นกลุ่มปลาเข่งช้างลาย)




ภาพผนวกที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวมาตรฐาน (standard length) กับเปอร์เซ็นต์ความยาวฐานครีบอก (% adipose fin base length/ SL)


ในกลุ่มแขวงช้างลายสกุล *Mysis*




ภาพผนวกที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวมาตรฐาน (standard length) กับเปอร์เซ็นต์ความยาวก้านครีบแข็งของครีบหลัง (% dorsal spine length/ SL) ในปลาสกุล *Mystus* (ยกเว้นกลุ่มแยงซังลาย)




ภาพผนวกที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวมาตรฐาน (standard length) กับเปอร์เซ็นต์ความยาวก้านครีบแข็งของครีบหลัง (% dorsal spine length/ SL) ในกลุ่มแมงกิ้งก่าปลาสกุล *Mystus*




ภาพผนวกที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวมาตรฐาน (standard length) กับจำนวนซี่กรองเหงือกบนซี่เหงือกขว้านแรก (first right gill arch) ในปลาสกุล *Hemibagrus*




ภาพผนวกที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวมาตรฐาน (standard length) กับจำนวนซี่กรองเหงือกบนซี่เหงือกขวาอันแรก (first right gill arch) ในปลาสกุล *Leiocassis*



ภาพผนวกที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวมาตรฐาน (standard length) กับจำนวนซี่กรองเหงือกบนซี่เหงือกขวานแรก (first right gill arch) ในปลาสกุล *Mysus* (ยกเว้นกลุ่มแยงซีงลาย)



ภาพผนวกที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวมาตรฐาน (standard length) กับจำนวนซี่กรองเหงือกบนซี่เหงือกขวาอันแรก (first right gill arch) ในกลุ่มเขย่งข้างลายสกุล *Mysus*



ภาพผนวกที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวหัว (head length) กับเปอร์เซ็นต์ความกว้างของหัวบริเวณตา (% head width at eye/HL) ในปลาสกุล *Leiocassis*



1. *Bagrichthys macracanthus*



2. *Bagrichthys macropterus*



3. *Batasio blythi*



4. *Hemibagrus filamentus*



5. *Hemibagrus microphthalmus*



6. *Hemibagrus nemurus*



7. *Hemibagrus wycki*



8. *Hemibagrus mekongensis* n.sp.



9. *Hemibagrus elegans* n.sp.



10. *Leiocassis micropogon*



11. *Leiocassis poecilopterus*



12. *Leiocassis siamensis*



13. *Leiocassis stenomus*




14. *Mystus atrifasciatus*



15. *Mystus bocourti*



16. *Mystus cavasius*



25. *Sperata acicularis*